OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

FRANCE RELANCE

AGGLO DU BEAUVAISIS
NOTRE TERRE



Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis

Financé par l'Union européenne
NextGenerationEU

Juin 2025

(article L. 132-3 du code de l'environnement)

Table des matières

Préface 7

Remerciements 7

Avant-propos 8

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) par M. Christian Frémeaux 11

Plateau Picard Nord 12

Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées sur le plateau picard nord 15

Auchy-la-Montagne 19

Oiseaux 19

Amphibiens et mammifères 20

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 21

Habitats naturels et semi-naturels 22

Crèvecœur-le-Grand 23

Oiseaux 23

Autres espèces patrimoniales 25

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 26

Habitats naturels et semi-naturels 27

Fontaine-Saint-Lucien 28

Oiseaux 28

Flore, mammifères et papillons 29

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 30

Habitats naturels et semi-naturels 31

Francastel 32

Oiseaux 32

Amphibiens 33

Mammifères 34

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 35

Habitats naturels et semi-naturels 36

Guignecourt 37

Oiseaux 37

Flore et mammifères 38

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 39

Habitats naturels et semi-naturels 40

Juvignies 41

Oiseaux 41

Flore et insectes 42

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 43

Habitats naturels et semi-naturels 44

Lachaussée-du-Bois-d'Écu 45

Oiseaux 45

Amphibiens 46

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 47

Habitats naturels et semi-naturels 48

Le Saulchoy 49

Oiseaux 49

Papillons 50

Criquets, grillons et sauterelles 51

Flore 52

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 53

Habitats naturels et semi-naturels 54

Luchy 55

Oiseaux 55

Mammifères et amphibiens 56

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 57

Habitats naturels et semi-naturels 58

Maisoncelle-Saint-Pierre 59

Faune 59

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 60

Habitats naturels et semi-naturels 61

Maulers 62

Faune et flore 62

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 63

Habitats naturels et semi-naturels 64

Muidorge 65

Oiseaux 65

Amphibiens 66

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 67

Habitats naturels et semi-naturels 67

Rotangy 69

Faune et flore 69

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 70

Habitats naturels et semi-naturels 71

Verderel-lès-Sauqueuse 72

Oiseaux 72

Flore 73

Mammifères 74
Amphibiens, reptiles et insectes 75
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 76
Habitats naturels et semi-naturels 77
Richesse spécifique du plateau picard nord ***78***
Trame verte et bleue – Plateau picard nord ***79***
Réservoirs secondaires de biodiversité - Plateau picard nord ***80***
Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique du plateau picard nord ***82***
Misumena vatia (Clerck, 1758) par Mme Gaëlle Billette ***83***
Plateau Picard Sud **83**
Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées sur le plateau picard sud ***87***
Bonlier ***95***
Faune et flore 95
Habitats naturels et semi-naturels 96
Bresles ***97***
Oiseaux 97
Flore 99
Serpents et lézards 100
Papillons, criquets, grillons et sauterelles 101
Amphibiens, poissons, libellules et demoiselles 102
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 103
Habitats naturels et semi-naturels 104
Fouquerolles ***105***
Oiseaux 105
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 106
Habitats naturels et semi-naturels 107
Haudivillers ***108***
Oiseaux 108
Amphibiens et insectes 109
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 110
Habitats naturels et semi-naturels 111
Lafraye ***112***
Oiseaux 112
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 113
Habitats naturels et semi-naturels 114
La Rue-Saint-Pierre ***115***
Oiseaux 115
Autres espèces patrimoniales 117
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 118
Habitats naturels et semi-naturels 119
La Neuville-en-Hez ***120***
Contribution de la classe de Mme Marie Garzoni pour l'ABC du Beauvaisis 120
Oiseaux 121
Flore 123
Chauves-souris 127
Autres espèces patrimoniales 128
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 129
Habitats naturels et semi-naturels 130
Laversines ***131***
Oiseaux 131
Autres espèces patrimoniales 132
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 133
Habitats naturels et semi-naturels 134
Le Fay-Saint-Quentin ***135***
Oiseaux 135
Flore et amphibiens 136
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 137
Habitats naturels et semi-naturels 138
Litz ***139***
Oiseaux 139
Autres espèces patrimoniales 141
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 142
Habitats naturels et semi-naturels 143
Nivillers ***144***
Espèces patrimoniales 144
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 145
Habitats naturels et semi-naturels 146
Rémérangles ***147***
Oiseaux 147
Habitats naturels et semi-naturels 148
Tillé ***149***
Oiseaux 149
Flore 151
Habitats naturels et semi-naturels 152
Velennes ***153***
Oiseaux 153

Flore et mammifères 154
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 155
Habitats naturels et semi-naturels 156
Richesse spécifique du plateau picard sud ***157***
Trame verte et bleue – Plateau picard sud ***158***
Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique du plateau picard sud ***159***
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) par M. Philippe Sergeur ***160***
Thérain - Avelon **161**
Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans le secteur Thérain-Avelon ***163***
Fouquenies ***172***
Oiseaux 172
Flore 175
Mammifères 176
Amphibiens, insectes et reptiles 177
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 178
Habitats naturels et semi-naturels 179
Herchies ***180***
Oiseaux 180
Flore 182
Mammifères et insectes 183
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 184
Habitats naturels et semi-naturels 185
Le Mont-Saint-Adrien ***186***
Oiseaux 186
Mammifères 188
Flore et insectes 189
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 190
Habitats naturels et semi-naturels 191
Milly-sur-Thérain ***192***
Oiseaux 192
Poissons 193
Papillons, zygènes et criquets 194
Libellules et demoiselles 195
Flore 197
Mammifères 198
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 199
Habitats naturels et semi-naturels 200
Pierrefitte-en-Beauvaisis ***201***
Oiseaux 201
Amphibiens 203
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 204
Habitats naturels et semi-naturels 205
Rainvillers ***206***
Oiseaux 206
Flore 209
Mammifères 210
Amphibiens et reptiles 211
Insectes 212
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 213
Habitats naturels et semi-naturels 214
Saint-Germain-la-Poterie ***215***
Oiseaux 215
Mammifères 217
Flore, amphibiens et insectes 218
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 219
Habitats naturels et semi-naturels 220
Saint-Paul ***221***
Oiseaux 221
Flore 225
Mammifères 226
Reptiles et insectes 227
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 228
Habitats naturels et semi-naturels 229
Savignies ***230***
Oiseaux 230
Flore 231
Mammifères 232
Amphibiens 233
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 234
Habitats naturels et semi-naturels 235
Troissereux ***236***
Oiseaux 236
Flore 238
Mammifères 239
Amphibiens et insectes 240
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales 241

Habitats naturels et semi-naturels....242
Richesse spécifique du secteur Thérain-Avelon ... ***243***
Réservoirs secondaires de biodiversité - Thérain-Avelon ... ***244***
Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique du Thérain-Avelon ... ***246***
Xylocopa valga ♀ (Gerstäcker, 1872) par M. David Aubert ... ***247***
Beauvais ... **248**
Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans le secteur Beauvais ... ***251***
Beauvais ... **258**
Flore ... 258
Amphibiens ... 260
Insectes ... 261
Mammifères ... 262
Reptiles et poissons ... 263
Oiseaux ... 264
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 275
Habitats naturels et semi-naturels ... 276
Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique de Beauvais ... ***277***
Papaver rhoeas (Linnaeus, 1753) par Mme Véronique Boyault ... ***278***
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) par M. Yves Lacoutière ... ***278***
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) par M. Florentin Morel ... ***278***
Vallée du Thérain aval ... **279**
Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans la vallée du Thérain aval ... ***282***
Allonne ... ***290***
Mammifères ... 290
Flore ... 291
Insectes ... 292
Oiseaux ... 293
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 296
Habitats naturels et semi-naturels ... 297
Bailleul-sur-Thérain ... ***298***
Oiseaux ... 298
Reptiles, libellules et demoiselles ... 301
Autres insectes ... 302
Flore ... 303
Mammifères ... 306
Amphibiens ... 307
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 308
Habitats naturels et semi-naturels ... 309
Hermes ... ***310***
Oiseaux ... 310
Reptiles et amphibiens ... 312
Papillons et criquets ... 313
Libellules, demoiselles et « papillons de nuit » ... 314
Flore ... 315
Mammifères ... 318
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 319
Habitats naturels et semi-naturels ... 320
Rochy-Condé ... ***321***
Oiseaux ... 321
Autres espèces patrimoniales ... 323
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 324
Habitats naturels et semi-naturels ... 325
Therdonne ... ***326***
Oiseaux ... 326
Flore ... 329
Autres espèces patrimoniales ... 330
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 331
Habitats naturels et semi-naturels ... 332
Warluis ... ***333***
Oiseaux ... 333
Papillons, criquets et grillons ... 336
Amphibiens, libellules et demoiselles ... 337
Reptiles et mammifères ... 338
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales ... 339
Habitats naturels et semi-naturels ... 340
Richesse spécifique du secteur Thérain aval ... ***341***
Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique de la vallée du Thérain aval ... ***342***
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) par M. Yves Lacoutière ... ***343***
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) par M. Loïck Sosten ... ***343***
Boutonnière du Bray ... **344**
Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans le secteur « boutonnière du Bray » ... ***347***
Auneuil ... ***354***
Oiseaux ... 354
Flore ... 357
Amphibiens ... 358
Mammifères ... 359

Reptiles et insectes....360
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....361
Habitats naturels et semi-naturels....362
Auteuil....363
Amphibiens et reptiles....363
Flore....364
Insectes....365
Mammifères....366
Oiseaux....367
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....369
Habitats naturels et semi-naturels....370
Aux Marais....371
Oiseaux....371
Mammifères....375
Flore....376
Amphibiens....377
Reptiles et insectes....378
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....379
Habitats naturels et semi-naturels....380
Berneuil-en-Bray....381
Amphibiens....381
Mammifères....382
Flore....383
Oiseaux....384
Insectes....386
Reptiles....387
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....388
Habitats naturels et semi-naturels....389
Frocourt....390
Amphibiens....390
Mammifères....391
Mammifères....392
Reptiles et insectes....393
Oiseaux....394
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....396
Habitats naturels et semi-naturels....397
Goincourt....398
Oiseaux....398
Mammifères....401
Flore....402
Amphibiens, reptiles et insectes....403
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....404
Habitats naturels et semi-naturels....405
Saint-Léger-en-Bray....406
Amphibiens....406
Reptiles, insectes et mammifères....407
Oiseaux....408
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....410
Habitats naturels et semi-naturels....411
Saint-Martin-le-Nœud....412
Amphibiens....412
Mammifères....413
Flore....414
Oiseaux....415
Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales....417
Habitats naturels et semi-naturels....418
Richesse spécifique de la boutonnière du Bray....419
Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique de la boutonnière du Bray....420
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) par M. Stéphane Peineau....421

Préface

« Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. » Proverbe chinois

Dix mille deux cent quatre-vingt-dix : c'est le nombre d'espèces de faune, de flore et de fonge inventoriées dans les Hauts-de-France en 2019 dans plus de 20 groupes taxonomiques différents selon les chiffres de l'Observatoire de la biodiversité régional.

Mais pourtant, le constat est sans appel. L'érosion de la biodiversité va en s'accélérant et n'épargne aucune partie du monde. En 2009, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que 36 % des espèces évaluées dans le monde sont en danger d'extinction. Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), 68 % des populations de vertébrés a disparu en moins de 50 ans. La biomasse des insectes décline années après années de manière alarmante et va en s'aggravant. Près de la moitié des espèces d'oiseaux sont en déclin dans le monde…

La réalisation d'un Atlas de la biodiversité communal (ABC) s'inscrit dans une démarche de conservation des espèces et des habitats naturels d'un territoire. Plus qu'un outil de connaissances destiné en partie au grand public, il s'agit avant tout d'un véritable outil d'aide à la décision afin de porter des actions concrètes de protection et de conservation en faveur de ces derniers. L'échelle communale ou intercommunale semble être la meilleure façon d'appréhender les richesses du patrimoine naturel – sous toutes ses formes – pour mieux les connaître et donc mieux les protéger. Si beaucoup d'espaces naturels remarquables font déjà l'objet d'une reconnaissance et d'une gestion en leur faveur (réseau de sites Natura 2000, arrêtés de protection biotope, réserves biologiques intégrales, aires marines protégées, etc.), un ABC vise justement à mettre en valeur des parties du territoire comportant des enjeux de conservation pour les habitats et les espèces associées qui seraient tout simplement passés « sous les radars ». Il vise également à mieux impliquer la population locale dans l'adoption de geste en faveur de la biodiversité. Un ABC permet également de mesurer l'érosion de la biodiversité d'un territoire en permettant d'identifier ce qui a été perdu ou au contraire, ce qui peut être gagné. Les atteintes envers la biodiversité ne sont pas inéluctables. La Nature, comme elle nous l'a déjà maintes fois prouvé par le passé, est capable d'une résilience exceptionnelle lorsque les pressions anthropiques cessent ou diminuent fortement. Le développement d'outils tels que les ABC ne peut donc que contribuer en ce sens.

Il ne s'agit pas de protéger la biodiversité uniquement pour protéger la biodiversité, même si cela se justifie en premier lieu par sa valeur intrinsèque. Il s'agit avant tout de conserver la biodiversité pour continuer à bénéficier des services écosystémiques et des aménités qu'elle nous procure tous les jours.

Quante o s'plaint, ch'est qu'o sint coér sin mau !

Remerciements

L'équipe de l'Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis tient en tout premier lieu à remercier ses partenaires qui l'ont accompagné et conseillé tout au long de ce projet, et ils sont nombreux !

Tout d'abord, merci aux élus de la Communauté d'agglomération du Beauvaisis pour leur intérêt en premier lieu mais aussi pour le partage de leurs connaissances du territoire, leurs autorisations de prospecter les parcelles communales ainsi que leur rôle d'appui et de relais auprès d'autres acteurs, indispensable pour mener à bien un ABC. Sans eux, la tâche aurait été simplement impossible.

Merci à l'Office français de la biodiversité pour leur soutien constant et le financement cet ABC.

Merci à l'association Picardie Nature et au Conservatoire Botanique National de Bailleul pour leur transmission de nombreuses données naturalistes, leurs conseils avisés et leurs analyses précieuses. Sans eux, cet ABC n'aurait jamais pu voir le jour également. Je ne pourrai malheureusement pas citer tous les noms car ils sont nombreux !

Merci à l'association PRODFONDHIS – Bibliothèque Patrick Ansar pour sa collaboration constante et son implication active dans les problématiques de conservation de la biodiversité. Merci à Stéphane, Clément et Marie ainsi que tous les membres qu'on salue chaleureusement. De beaux projets ont vu le jour et ne font que commencer !

Merci au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de l'Oise pour sa coopération lors d'inventaires communs réalisés autour des amphibiens et des reptiles, leurs conseils et l'apport technique sur la création de mares. Merci Romain !

Merci à tout le personnel de l'Écospace, merci à Michel, Audrey, Jolan, les jeunes du chantier d'insertion pour leur coopération et leur aide précieuse pour l'organisation et l'accueil du concours photo de l'ABC (et aussi la transmission de pelotes de réjection de la Chouette effraie qui cohabite avec vous, avec une belle observation de micromammifère semi-aquatique peu commun à la clef !).

Merci à tous les membres de l'association AFODHEZ présidée par Mme Laurence Galli, son ancien Président M. Robert Tétart pour la transmission de ses précieuses observations de flore et le partage de ses connaissances. Merci à Michèle pour son rôle de relais auprès des autres membres de l'association et merci à tous les membres que je ne connais pas encore tous.

Merci également à Mme Mathilde Castro de la Fédération de pêche pour la transmission de données de pêches électriques qui permettront de mettre à jour des données sur des espèces à enjeux du territoire et à la Fédération des chasseurs pour la transmission de données également.

Merci à l'association Aérobiodiversité pour la transmission des données naturalistes de leurs suivis au sein de l'aéroport de Beauvais-Tillé et au personnel de l'aéroport MM. François Cochez et Cédric Évrard pour leur accompagnement sur le site lors d'inventaires de squamates et le partage de leurs connaissances naturalistes.

Merci à M. Chouvet pour avoir gracieusement donné des tapis de carrière pour les inventaires des squamates (et des campagnols et musaraignes qui les adorent).

Et n'oublions pas de remercier les formidables stagiaires qui ont activement contribué à ce projet, même lorsqu'ils étaient concernés par d'autres missions conduites sur le patrimoine naturel du territoire : Lucie, Lilou, Carlotta, Sacha, Vivien, Louis et Quentin.

Merci à tous les citoyens qui ont participé à nos animations, qui ont participé au concours photo, qui ont échangé avec nous sur des stands ou des événements particuliers et transmis des données naturalistes. Cet Atlas est avant tout le vôtre !

Enfin, merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin, ils se reconnaîtront !

Avant-propos

C'est quoi un Atlas de la biodiversité communale et à quoi ça sert ?

Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est avant toute chose un recueil de cartes délivrant des informations sur la distribution spatiale de la biodiversité dans un territoire donné. Le terme de biodiversité renvoie à l'ensemble des formes vivantes présentes sur Terre ainsi qu'aux milieux – pas toujours « naturels » - dans lesquels elles évoluent. La biodiversité décrit donc la variété des écosystèmes à différentes échelles spatiales. Un écosystème est l'association d'une biocénose - soit l'ensemble des communautés animales, végétales, fongiques et tout autre espèce difficilement classable - et d'un biotope – soit le support inerte du système fournissant l'énergie aux être vivant qui y vivent (notre biocénose en somme). Les interrelations entre biocénose et biotope sont aussi constitutifs d'un écosystème.

La biodiversité s'appréhende à différents niveaux :

- **1) La biodiversité génétique** : elle correspond tout simplement à la diversité des gènes au sein d'une même espèce. La perte de diversité génétique, induite en grande partie par l'isolement des populations à cause de la destruction et de la fragmentation des habitats, tend à rendre les espèces moins résilientes aux changements globaux ou aux zoonoses ;
- **2) La biodiversité spécifique** : elle concerne le nombre d'espèces différentes dans un espace donné ;
- **3) La biodiversité des écosystèmes** : C'est la richesse des différents milieux naturels de notre planète. Une mangrove martiniquaise, une lande bretonne ou une calanque méditerranéenne accueillent des cortèges d'espèces qui leurs sont bien spécifiques et parfois même inféodés : on ne les retrouvera nulle part ailleurs. La banalisation ou disparition des écosystèmes induit également une perte biodiversité souvent irrémédiable.

L'ABC du Beauvaisis est donc un outil de connaissance qui vise à rendre compte de la distribution des espèces et des milieux naturels et semi-naturels de son territoire.

Mais il est en réalité bien plus que cela : il s'agit véritablement d'un outil d'aide à la décision dans les problématiques d'aménagement du territoire. On pense notamment à l'amélioration de la prise en compte des enjeux de conservation de la biodiversité locale dans les plans locaux d'urbanismes (reconnaissances et protection des réservoirs de biodiversité face à l'urbanisation et l'artificialisation des sols) ou des problématiques de continuité écologique dans les grands schémas d'aménagements régionaux. Ces continuités écologiques visent à permettre la dispersion des espèces à travers les corridors écologiques, éléments constitutifs de la Trame verte et bleue, et donc à favoriser leur conservation.

Est-ce que toutes les espèces du territoire de la communauté d'agglomération du Beauvaisis sont cartographiées ?

Non car il serait d'une part impossible de cartographier de manière exhaustive toutes les espèces dans le temps imparti du projet et cela commence dès l'infiniment petit ! Oui, il y a bien une biodiversité des bactéries par exemple.

Les données faune-flore de cet atlas couvrent la période 2020 – 2025 et sont issues d'inventaires complémentaires menés dans le cadre de l'ABC, de bureau d'études ou d'associations suite à des travaux d'inventaire ainsi que des données dites opportunistes, c'est-à-dire produites dans un cadre récréatif ou hors de tout cadre ou projet professionnel.

Autre élément très important à considérer dans cet atlas : certaines données naturalistes, dans leur géolocalisation, utilisent ce que l'on appelle le « centroïde » d'un territoire. Cela signifie que l'espèce renseignée n'a pas de localisation précise : elle est bel et bien présente au sein du territoire concerné mais est placée au centre de la carte. Plusieurs raisons à cela : il peut s'agir d'une donnée sensible à propos d'une espèce très menacée (pour vivre heureux, vivons cachés ?) ou convoitée par des collectionneurs et des braconniers ou encore, tout simplement, l'espèce a été observée et validée mais l'observateur n'a tout simplement pas renseigné sa géolocalisation. Par exemple, pour le secteur de Beauvais, de nombreuses espèces patrimoniales sont concentrées sur un même point, au franc marché, en plein cœur de la ville ! Le premier qui trouve un Gazé ou un Cuivré des marais ou un Orme lisse au numéro 3 du boulevard Lamotte a gagné. C'est pour cela que des tableaux d'espèces récapitulatifs et exhaustifs pour chacun des secteurs abordés sont proposés, avec des indices de conservation ou de rareté le cas échéant. Il est également important de s'en référer.

D'autres atlas visant une exhaustivité existent - ou sont en cours de constitution - pour pallier ce manque. On pense notamment à l'Atlas régional des coccinelles ou des araignées, entre autres, pilotés par des structures naturalistes référentes comme l'association Picardie Nature. Dans cet atlas, seules les espèces patrimoniales du Beauvaisis ont été traitées. Le terme de taxon, souvent employé dans cet ouvrage, renvoie selon l'Institut national de la statistique et des études économiques à « une unité quelconque (genre, famille, espèce, sous-espèce, etc.) des classifications hiérarchiques des êtres vivants. Généralement, le terme est employé aux rangs spécifique (l'espèce) et subspécifique (la sous-espèce). » À l'échelle d'un groupe d'espèce, les oiseaux sont un taxon par exemple, parmi les amphibiens, les reptiles, les plantes ou les mammifères. Mais au sein même des oiseaux, la Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (Linnaeus, 1758) est un taxon parmi toutes les autres espèces aviaires.

Voici les taxons abordés dans cet atlas :

- Les amphibiens ;
- Les oiseaux diurnes et nocturnes, aussi bien nicheurs qu'hivernants ou de passage ;
- Les insectes de l'ordre des :
  - Lépidoptères (papillons et zygènes) ;
  - Odonates (libellules et demoiselles) ;
  - Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) ;
  - Quelques coléoptères.
- Les mammifères (dont les micromammifères) ;
- Les reptiles et plus précisément les squamates qui regroupent :
  - Les serpents ;
  - Les lézards.
- L'ichtyofaune, autrement dit, les poissons ;
- La flore vasculaire, les bryophytes et ainsi que les fougères, lycopodes et autres ptéridophytes.

C'est quoi une espèce dite « patrimoniale » ?

Le terme d'« espèce patrimoniale » est un terme subjectif, au contour parfois flou. Chacun pourrait avoir sa propre définition si tant qu'elle soit justifiée ! Mais d'une manière générale, on entend par « patrimoniale » une espèce qui peut avoir un intérêt scientifique de par sa rareté, son degré de menaces et d'enjeu de conservation ou bien de par ses statuts de protection. Il peut également s'agir d'une espèce ayant un intérêt symbolique et culturel comme l'emblème d'une ville ou d'une localité par exemple : on pense notamment aux plaques rondes à l'effigie de la Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) qui jalonnent les rues de Beauvais ou bien la Truite commune *Salmo trutta* (Linnaeus, 1758) prisée des pêcheurs de rivière du Beauvaisis. Une espèce considérée patrimoniale ne rime pas forcément avec « menacée ». Voici les différents critères qui ont motivé nos choix pour définir une espèce patrimoniale du Beauvaisis :

- Une espèce déterminante Zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de Type I et II au niveau local ;
- Une espèce d'intérêt communautaire : espèce inscrite à l'annexe I de la Directive oiseaux ou certaines annexes de la Directive habitat-faune-flore ;
- Une espèce protégée au niveau local ou métropolitain ou présentant un statut de conservation peu satisfaisant : à partir du critère « quasi-menacé » des listes rouge régionales des espèces faune/flore menacées, quand bien même une espèce est considérée menacée à partir du critère « vulnérable ») ;

- Une espèce de cohérence nationale ou régionale de la Trame Verte et Bleue : par exemple, le Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) ou la fauvette babillarde *Curruca curruca* (Linnaeus, 1758)**.**


Il ne s'agit en aucun cas d'une véritable hiérarchisation : ce n'est pas parce qu'une espèce commune et largement répandue n'est pas considérée comme patrimoniale qu'elle n'en est pas moins un élément clef d'un écosystème, participant à son équilibre ! Cette approche vise également à « simplifier » les cartes en ne mettant en avant que les espèces qui peuvent justifier des actions de conservation… tout en bénéficiant à toutes les autres.

Le territoire en question

L'ABC du Beauvaisis est un atlas intercommunal : l'ensemble des 53 communes constituant la communauté d'agglomération du Beauvaisis (CAB) ont été traitées. Située à moins de 100 km au nord du bassin parisien, dans la région des Hauts-de-France et au sein du département de l'Oise, la CAB compte 103 890 habitants en 2021 et s'étend sur 541 km² (INSEE, 2023). La densité de la population est, en 2021, de 192,8 habitants au kilomètre carré. La plus grande agglomération du territoire est la ville de Beauvais, chef-lieu du département de l'Oise, qui occupe une place quasi-centrale. Le territoire de la CAB a évolué ces dernières années en incluant d'abord 13 nouvelles communes à l'est du territoire en 2017 puis 9 nouvelles communes au nord à partir de 2018. La CAB présente une situation de carrefour entre diverses entités paysagères correspondant à autant de spécificité du point de vue des habitats naturels que des modes d'occupations du sol.

Le territoire est traversé d'ouest en est par un axe hydrographique majeur et structurant qu'est le Thérain, rivière du bassin versant de la Seine et affluent de rive droite de l'Oise. Il distingue 3 grandes entités paysagères du territoire :

- Au nord, il délimite grossièrement le plateau picard, un vaste plateau crayeux où les paysages agricoles de grandes cultures prédominent parmi quelques bosquets et coteaux boisés ou ouverts. C'est la plus grande entité paysagère de la CAB et recouvre un peu plus de la moitié de sa superficie ;
- Au sud du Thérain, les paysages semi-bocagers sont beaucoup plus importants avec davantage de pratiques agropastorales tournées vers l'élevage. C'est surtout vrai au sud-ouest de la rivière qui correspond à l'entité paysagère de la boutonnière du Bray, une vaste échancrure large d'environ 10 km et s'étendant sur 80 km dans les départements de l'Oise et de Seine-Maritime. Séparée du plateau picard au nord et du plateau de Thelle au sud par des versants abrupts formant des cuestas, cette partie du territoire se caractérise par une topographie plus complexe. La partie sud-est, de Beauvais à la Neuville-en-Hez, correspond à l'entité paysagère du Clermontois caractérisé par la présence de milieux forestiers importants. La part des milieux humides au sud du Thérain est sans commune mesure par rapport au plateau picard qui présente un réseau hydrographique nettement plus réduit.



Pourquoi ce ne sont pas les mêmes cartes d'une commune à l'autre ?

Bonne question ! Durant la consultation de cet atlas, vous vous apercevrez certainement que les cartes ne traitent pas toujours des mêmes espèces et qu'elles portent des noms différents. Plusieurs raisons à cela : tout d'abord, les communes ne présentent pas les mêmes types de milieux naturels et semi-naturels en fonction de leur localisation sur le plateau picard, le pays de Bray ou le Valois. Et qui dit milieux différents dit forcément espèces différentes ! Par exemple, certaines communes ne présentent que peu ou pas de point d'eau favorables aux espèces de zones humides. Ces dernières en sont parfois absentes et donc difficiles à cartographier ! À l'inverse, certaines communes sont concernées par une plus grande richesse spécifique en raison de la présence d'une mosaïque d'habitats naturels propices au développement de cortèges d'espèces qui y sont plus ou moins inféodés. Cette différence en termes de présence/absence d'espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation explique donc en partie que chaque carte est propre à sa commune en fonction des espèces qu'on y retrouve. Il est parfois plus simple de regrouper certains groupes d'espèces quand le nombre de données le permet pour condenser l'information et, à l'inverse, chaque taxon peut se voir décliner en une carte si le nombre d'espèces et le nombre de données le justifie.

Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique

Les zonages réglementaires correspondent à des délimitations du territoire dans laquelle s'applique un droit ou une politique spécifique. Il peut avoir des incidences directes ou indirectes sur l'activité des propriétaires de parcelles situées dans la zone : recommandations, déclaration obligatoire, demande d'autorisation obligatoire, interdiction de certains travaux ou actions. Dans la CAB, il s'agit notamment des 5 sites Natura 2000 du territoire qui sont tous des « Zones spéciales de conservation » reconnues pour leurs habitats naturels présentant de forts enjeux de conservation pour des espèces patrimoniales et d'intérêt communautaire.

Les Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne sont pas des zones réglementaires et n'ont aucune valeur juridique. Il s'agit de zonages d'inventaires destinés à l'amélioration des connaissances du patrimoine naturel dans des secteurs présentant un fort potentiel. Elles permettent également d'identifier des secteurs d'intérêt écologique du territoire. Deux types de ZNIEFF existent, à savoir :

- Les ZNIEFF de type I : elles concernent des superficies limitées qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, caractérisé par un intérêt biologique remarquable ;
- Les ZNIEFF de type II : elles correspondent à des grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou présentant des potentialités biologiques ou écologiques importantes.

Les Espaces naturels sensibles sont des outils mis à disposition des conseils départementaux afin d'organiser la préservation d'un réseau de sites d'intérêt écologique sur leur département. La gestion peut être dévolue à différentes structures.

Enfin, les sites gérés par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France (CEN-HdF) apparaissent également sur les cartes car, si la majorité sont localisés au sein de zonages d'intérêt écologique, ils font l'objet d'une gestion par cette même structure et rendent compte également de sites à forts enjeux de conservation pour les habitats et les espèces associées.

Les Limites de l'atlas

Les cartes ne biodiversité ne témoignent pas des effectifs réels des populations d'espèces représentées mais bien de leur présence avérée dans les territoires communaux pour la période 2020 - 2025. Certaines espèces font l'objet d'un grand nombre d'observations car elles sont communes et abondantes sur le territoire. Il n'a pas été toujours possible de rendre compte de l'intégralité de ces observations sur une carte pour des questions de lisibilité. En effet, un trop grand nombre d'observations d'une seule espèce peut générer un nuage de points qui occulterait tous les autres. Mais cela ne concerne qu'un nombre très peu significatif de cas et n'enlève en rien à la connaissance des espèces dans les communes.

Une autre limite concerne les cartes de richesse spécifique présentant la densité d'espèces patrimoniales dans une commune. Un gradient de couleur permet de rendre compte d'une densité plus ou moins importante à partir de mailles carrées de 250 mètres de côté. C'est simple, plus il y a d'espèces patrimoniales observées dans un carré, plus celui-ci devient foncé et permet d'identifier des points chauds de biodiversité. Mais certaines espèces sont très mobiles comme chez les oiseaux par exemple ! L'observateur a très bien pu se retrouver sur le passage d'un oiseau regagnant ses quartiers d'hiver ou d'été qui ne sont pas forcément dans le Beauvaisis. Certaines données n'ont pas de géolocalisation précise et sont regroupées sur le point central d'une commune. C'est notamment le cas pour certaines données de flore ou pour les chauves-souris par exemple : leur localisation résulte de l'utilisation de détecteurs spéciaux et n'indique pas la présence d'un gîte par exemple. Elles ont été « prises au passage ». Cela a tendance à gonfler certaines mailles de manière artificielle mais n'enlève rien à la teneur de l'ABC : l'essentiel reste là et les espèces concernées ont bel et bien été observées dans la commune.

L'ABC du Beauvaisis repose également sur de nombreuses données dites opportunistes ! Beaucoup de communes n'ont pas fait l'objet d'inventaires naturalistes complémentaires au vu des contraintes budgétaires et spatio-temporelles liées à la taille du territoire et à la durée de réalisation du projet. D'autres belles surprises attendent encore les habitants de l'intercommunalité et ne demandent qu'à être dévoilées ! N'hésitez pas à continuer de transmettre vos observations de faune, de flore ou de fonge aux associations du territoire comme le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, Picardie Nature ou l'antenne locale du Conservatoire botanique des Hauts-de-France.

Pour toute demande de renseignements complémentaires ou pour faire part de toute observation au sujet de cet ABC ou de la biodiversité du territoire, merci de contacter : atlas.biodiversite@beauvaisis.fr. La consultation du rapport technique est disponible sur la page dédiée du projet du site Nature France : *https://abc.naturefrance.fr*.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) par M. Christian Frémeaux





Plateau Picard Nord


Le secteur du plateau picard nord compte 14 communes et 8 948 habitants pour une superficie d'environ 114,4 km². Il est situé sur le haut-plateau picard, à environ 180 m d'altitude. Les communes concernées par ce découpage territorial repris du plan local d'urbanisme intercommunal sont les suivantes :


- Auchy-la-Montagne ;
- Crèvecœur-le-Grand ;
- Fontaine-Saint-Lucien ;
- Francastel ;
- Guignecourt ;
- Juvignies ;
- Lachaussée-du-Bois-d'Écu ;
- Le Saulchoy ;
- Luchy ;
- Maisoncelle-Saint-Pierre ;
- Maulers ;
- Muidorge ;
- Rotangy ;
- Verderel-lès-Sauqueuse.



Le secteur du plateau picard nord correspond à presque un quart du territoire de la communauté d'agglomération du Beauvaisis soit 21 % de la surface totale de cette dernière. Les habitats cultivés sont prédominants dans le mode d'occupation du sol de ce secteur puisqu'ils recouvrent à eux seuls 81 % de son territoire avec environ 93 km². Ces habitats cultivés concernent essentiellement une agriculture annuelle intensive. Les paysages agricoles d'openfield dominent donc dans cette partie du territoire intercommunal où subsistent çà et là quelques bosquets, prairies et pelouses calcicoles parmi les cultures intensives.

Les habitats forestiers recouvrent environ 7 % du plateau picard nord avec 8,4 km². Il s'agit aussi bien de bosquets privés que publiques – dont la plupart sont exploités - peuplés en majorité de feuillus et, dans une moindre mesure, de conifères. Les milieux ouverts représentent un peu plus de 5 % du territoire avec 6,4 km² au total. Enfin, les zones bâties et artificialisées recouvrent un peu plus de 4 % du territoire du secteur avec 4,9 km² environ. Le reste de l'occupation du sol concerne des zones humides ponctuelles telles que les mares et un secteur au sud correspondant à la Liovette, cours d'eau prenant ses sources dans la partie communale d'un boisement située à Fontaine-Saint-Lucien, ou bien à d'autres modes d'occupation du sol beaucoup plus négligeables. 30 mares ont été recensées dans ce secteur en 2024.





Cette prédominance des cultures annuelles intensives, au sens d'habitat, influe en grande partie sur les cortèges faunistiques et floristiques retrouvés dans le plateau picard nord, moins riches en termes de diversité d'espèces – mais non sans enjeux ! - comparé à d'autres parties du territoire intercommunal présentant des habitats naturels ou semi-naturels plus diversifiés.

Dans ce secteur, 47 espèces d'oiseaux patrimoniaux y ont été recensés entre 2020 et 2025 parmi les 93 espèces inventoriées à cette même période, aussi bien nicheuses que non nicheuses. La totalité des espèces de rapaces nocturnes présentent dans le Beauvaisis y est retrouvé dont le Hibou des marais *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) avec ses populations nicheuses des Hauts-de-France classées « en danger critique d'extinction ». 5 espèces au total sont présentes dans le Beauvaisis contre 6 ou 7 en Picardie si l'on prend en compte le très rare Petit-duc Scops *Otus scops* (Linnaeus, 1758), non observé depuis plus de 10 ans et qui trouve ici sa limite septentrionale de distribution. Le Hibou grand-duc *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) est présent en Picardie de manière exceptionnelle (on le croisera davantage dans l'Aisne) mais pas dans le Beauvaisis à l'heure actuelle. Les autres oiseaux correspondent à diverses espèces de rapaces, de pics, de canards, etc. ou encore de passereaux qui représentent l'essentielle des espèces et des effectifs du secteur – et du Beauvaisis dans une plus large mesure.

À propos des orthoptères, qui regroupent sauterelles, grillons et criquets, 6 espèces et sous-espèces d'intérêt patrimonial sont présentent dans ce secteur du Beauvaisis parmi les 20 espèces recensées au total. Ces espèces se concentrent essentiellement au sein des milieux ouverts et thermophiles du secteur, comme des pelouses calcaires par exemple, offrant des conditions xériques et une végétation plus ou moins rase. Les orthoptères adaptés aux zones humides ne semblent pas présents au vu de la surface très peu significative occupée par ces dernières. On retrouve dans ce secteur un peu moins d'un tiers des espèces d'orthoptères présentes actuellement en Picardie, qui seraient au nombre de 77[1].

29 espèces de lépidoptères – ordre d'insectes qui regroupe notamment les papillons - ont été recensées entre 2020 et 2025 dans ce secteur et parmi elles 9 espèces d'intérêt patrimonial dont 2 classées « en danger » au niveau local. Des inventaires complémentaires de lépidoptères et d'orthoptères ont été réalisés dans ce secteur pendant la conduite de l'ABC.

8 espèces de reptiles sont présentes dans le Beauvaisis : 3 serpents et 5 lézards. Aucune espèce de tortue n'est présente dans le Beauvaisis hormis l'introduite Tortue de Floride *Trachemys scripta* (Schoepff, 1792). La Cistude d'Europe *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758), tortue qui comme son nom l'indique est originaire du continent, trouve au nord de la Loire sa limite septentrionale de répartition et ne semble pas se trouver à l'état sauvage dans le Beauvaisis. Sur le plateau picard nord, seules deux espèces patrimoniales de lézards ont été recensées ces 5 dernières années mais cette biodiversité paraît sous-estimée malgré la conduite d'inventaires complémentaires dans ce secteur en 2024.

Si la flore n'a pas fait l'objet d'inventaires complémentaires dans ce secteur, les données récoltées renseignent 66 espèces de plantes vasculaires dont un peu moins de la moitié considérée comme d'intérêt patrimonial.

Pour les mammifères, 14 espèces de chauves-souris ont été recensées dans le secteur parmi les 21 espèces présentes en Picardie[2]. Toutes protégées, ces espèces sont considérées comme patrimoniales. La Martre *Martes martes* (Linnaeus, 1758) est également présente dans ce secteur, au moins dans le boisement à Francastel. Aucune espèce patrimoniale de micromammifères n'a été recensée dans ce secteur : les musaraignes et campagnols patrimoniaux du Beauvaisis concernent uniquement deux espèces semi-aquatiques et les milieux humides du secteur ne semblent pas offrir de conditions favorables pour attester de leur présence. Dernier point important à propos des mammifères : si certaines espèces communes comme le Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus* (Linnaeus, 1758) ou l'Écureuil roux *Sciurus vulgaris* (Linnaeus, 1758*)* ne sont actuellement pas clairement considérées comme menacées dans le Beauvaisis, ces deux espèces sont protégées et présentes sur tout le territoire. Elles n'ont pas intégré les espèces patrimoniales de cet atlas mais un point de vigilance est requis à leur égard. Le Hérisson d'Europe a perdu 70 % de ses effectifs en 20 ans mais reste classé « en préoccupation mineure » à différentes échelles territoriales, à l'instar de l'Écureuil roux.

[1] Liste rouge des orthoptères et espèces associées de Picardie – Picardie Nature (2017)
[2] Liste rouge des chiroptères en Picardie – Picardie Nature (2017)

4 espèces d'odonates ont été recensées ces 5 dernières années dans ce secteur mais aucune ne correspond à une espèce patrimoniale.

Enfin, 6 espèces d'amphibiens sont signalées dans ce secteur sur les 13 répertoriées dans le Beauvaisis, ce qui est très loin d'être négligeable pour un secteur fort dépourvu en zones humides. La présence des mares susmentionnées permet donc le développement d'espèces aquatiques pour tout ou partie de leur cycle de vie. Elles constituent plus que jamais un enjeu de conservation dans ce secteur. On retrouve notamment deux espèces communes de crapauds que sont l'Alyte accoucheur *Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768) et le Crapaud commun *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758), espèces ubiquistes fréquentant divers milieux aquatiques - même fortement anthropisés - pendant leur phase de reproduction. On les retrouve presque dans toutes les communes du secteur. La commune de Verderel-lès-Sauqueuse est la seule à accueillir une population de tritons avec la présence de *Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768) et *Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789). Cette commune possède donc une certaine responsabilité pour le maintien d'une biodiversité des amphibiens du secteur. 4 espèces d'odonates – ordre d'insectes qui regroupent libellules et demoiselles – sont localisées dans 3 communes du secteur mais aucune ne correspond à une espèce patrimoniale.

En dépit d'un mode d'occupation du sol tourné en très grande partie vers une agriculture productiviste intensive, de milieux et de paysages fragmentés, l'on observe encore un nombre intéressant d'espèces patrimoniales à enjeux de conservation plus ou moins importants qui justifient des mesures de conservation en leur faveur. Les cartes et tableaux suivantes rendent comptent des espèces recensées ces 5 dernières années à l'échelle du secteur et des territoires communaux « concernés ».



Pic noir ♀ *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) photographiée à Fontaine-Saint-Lucien, espèce classée « quasi menacée » à l'échelle des Hauts-de-France dans la catégorie « nicheurs »

Vous avez dit Trame verte et bleue ?

Au sein du secteur « plateau picard nord », un corridor écologique a été identifié et proposé pour être assimilé à la Trame verte et bleue du territoire (cf. carte p. 78). Ce corridor et ses éléments constitutifs concernent les communes de Maisoncelle-Saint-Pierre, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Tillé et Beauvais. Il s'agit d'un corridor multi-trames puisqu'il est concerné d'une part par le cours d'eau de la Liovette – du moins, dans sa partie non souterraine – et, d'autre part, par des patchs de milieux boisés. Des problématiques de connectivité existent entre les différents réservoirs secondaires de biodiversité avérés et potentiels de ce corridor. Des actions d'amélioration de la connectivité, via la plantation de haies par exemple, semblent pertinentes et sont proposées dans le programme d'actions. Certaines espèces des guildes analysées dans le cadre du Schéma régional de cohérence écologique de Picardie sont présentes et dont certaines sont définies de cohérence nationale. La reconnaissance de corridor multi-trames s'avère être un excellent levier pour améliorer la conservation de la biodiversité en garantissant une zone de dispersion et de refuge sur un territoire fragmenté où la prédominance des grandes cultures intensives ne permet pas l'expression optimale de cette dernière.



Sources de la Liovette, dans la partie communale du boisement à Fontaine-Saint-Lucien, l'une des rares zones humides du secteur

Des pelouses calcaires qui font de la résistance ! Mais pour encore combien de temps ?

Plusieurs communes du plateau picard nord sont concernées par la présence de pelouses calcaires soit un habitat qui peut être considéré comme patrimonial de par les communautés animales et végétales qu'on y retrouve, avec de nombreuses espèces plus ou moins rares et à l'état de conservation peu ou pas satisfaisant, et également en tant que témoins de pratiques agropastorales anciennes du territoire qui ont disparu. Le terme picard « *larris* » désigne d'ailleurs ces milieux pelousaires autrefois souvent pâturés et figure parfois dans la toponymie locale. Les pelouses calcaires peuvent également être d'origine naturelle.

Les pelouses calcicoles correspondent à des milieux secs (xérique) sur sol calcaire, définie par la présence d'une strate de végétation herbacée rase. Elles offrent des conditions idéales pour les espèces dites « thermophiles » et plus ou moins sensibles à la hauteur de végétation. C'est-à-dire qu'à partir d'une hauteur de végétation trop importante, certaines espèces ne trouveront plus ces milieux favorables. C'est pourquoi le maintien d'une strate de végétation herbacée rase est une condition *sine qua non* pour maintenir les fonctionnalités de ces habitats. L'abandon des pratiques agropastorales traditionnelles sur ces types de milieux induit un développement de la végétation qui conduit à termes à la disparition de la pelouse et donc des cortèges faunistiques et floristiques associés. Si les entités les plus conséquentes en termes de superficie bénéficie déjà d'une forme de reconnaissance et de protection à travers leur intégration au site Natura 2000 « FR2200369 - Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval », d'autres reliquats, certes isolés géographiquement, perdurent encore aujourd'hui. C'est le cas dans la commune du Saulchoy ou de Verderel-lès-Sauqueuse par exemple. Au Saulchoy, la pelouse calcaire persistante présente une richesse spécifique entomologique et floristique intéressante qui la démarque des communes environnantes. Une dizaine d'espèces patrimoniales y ont été recensées ces 5 dernières années dont des espèces d'insectes caractéristiques tels que les quasi-menacés Criquet noir-ébène *Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821) et Criquet de la Palène - dont une sous-espèce - *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796) ou encore la rare Decticelle carroyée *Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825). D'un point de vue des papillons, on retrouve également des espèces caractéristiques de ces milieux tels que le Collier-de-corail *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775), espèce commune mais affectée en Picardie par l'embroussaillement des coteaux, ou encore les quasi-menacés Azuré bleu-céleste *Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775) et Argus frêle *Cupido minimus* (Fuessly, 1775). À proximité de la pelouse calcaire du Saulchoy, un individu d'Azuré de l'Ajonc *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758), classé « en danger d'extinction » sur le territoire picard, a été recensé. Enfin, concernant les espèces de plantes présentes sur cette pelouse calcaire, on retrouve notamment l'espèce quasi-menacée qu'est la Gentiane d'Allemagne *Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912, soit une espèce indicatrice de ce type de milieux. D'autres espèces de flore d'intérêt patrimonial ont également été recensées ces 5 dernières sur ou à proximité de cette pelouse calcaire. La présence et la diversité de ces espèces, dont la plupart porte des enjeux de conservations certains, traduisent encore une certaine fonctionnalité de cet habitat naturel pourtant en proie à la fermeture du milieu par le développement des ligneux. La disparition de cette pelouse calcaire conduirait irrémédiablement à une perte de biodiversité et concourrerait à son érosion sur le territoire. Sa gestion et sa valorisation semblent donc essentielles.



Gentiane d'Allemagne *Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912, photographiée sur le reliquat de pelouse calcaire au Saulchoy

À Verderel-lès-Sauqueuse, un reliquat de pelouse calcaire, situé au lieu-dit « les communes », présente encore un intérêt grâce à la présence de papillons patrimoniaux affectionnant les coteaux calcaires bien exposés tels que le Demi-Deuil *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758), les quasi-menacés Point de Hongrie *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) et Petite Violette *Boloria dia* (Linnaeus, 1767) ou encore la Lucine *Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758), classée en danger d'extinction sur le sol picard. La Gentiane d'Allemagne *Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912, pouvant être considéré comme une espèce indicatrice des pelouses calcaires, y est également présente. Là encore, l'absence de gestion peut nuire à ce milieu par le développement d'une strate arbustive puis arborée qui conduit à la fermeture progressive du milieu et la perte des conditions édaphiques ou thermiques nécessaires aux espèces adaptées. De plus, l'embroussaillement généralisé de ces milieux constitue de formidables refuges pour les sangliers qui peuvent avoir un impact négatif sur les cultures environnantes. La gestion de ces reliquats sur le plateau picard nord semble donc être un enjeu à différents niveaux.



Partie nord de la pelouse calcaire au lieu-dit « les communes » à Verderel-lès-Sauqueuse



Développement de fourrés épineux et de ligneux qui concoure à la fermeture de certaines parties de la pelouse calcaire du lieu-dit "les communes" à Verderel-lès-Sauqueuse

Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées sur le plateau picard nord

Tableau 1 - Orthoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard nord » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée	Indice de rareté [4]
***Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)**	Criquet marginé	LC	NE	LC	X		AR
***Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)**	Grillon des bois	LC	NE	LC			C
***Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)**	Criquet noir-ébène	NT	NE	LC	X		PC
***Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796)**	Criquet de la Palène	NT	NE	LC	X		AC
***Stenobothrus lineatus lineatus* (Panzer, 1796)**	Criquet de la Palène	NT	NE	LC	X		AC
***Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)**	Decticelle carroyée	LC	NE	LC	X		R

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Picardie Nature (2024)
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 2 - Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard nord » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]
***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Collier-de-Corail	LC	LC	LC		
***Boloria dia* (Linnaeus, 1767)**	Petite Violette	NT	LC	LC		
***Colias alfacariensis* (Ribbe, 1905)**	Fluoré	NT	LC	LC	X	
***Cupido minimus* (Fuessly, 1775)**	Argus frêle	NT	LC	LC		
***Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)**	Point de Hongrie	NT	LC	LC		
***Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758)**	Lucine	EN	LC	LC	X	
***Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775)**	Azuré bleu-céleste	NT	LC	LC		
***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**	Demi-Deuil	LC	LC	LC		
***Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)**	Azuré de l'Ajonc	EN	LC	LC	X	

[1] Liste rouge des papillons de jour des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 3 - Reptiles d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard nord » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]
***Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)**	Orvet fragile	LC	LC	LC		Art. 3	
***Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)**	Lézard des murailles	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Articles 2 & 3
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV

Tableau 4 - Mammifères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard nord » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)**	Sérotine commune	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Martes martes* (Linnaeus, 1758)**	Martre	NT	LC	LC	X		An. V	AC
***Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758)**	Muscardin	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Bechstein	VU	NT	VU	X	Art. 2	An. IV	PC
***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Daubenton	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	C
***Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)**	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)**	Grand Murin	EN	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)**	Murin à moustaches	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)**	Murin d'Alcathoe	DD	LC	NT		Art. 2	An. IV	-
***Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)**	Murin de Brandt	DD	LC	LC		Art. 2	An. IV	-
***Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)**	Murin de Natterer	LC	LC	LC		Art. 2	An. IV	AC
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**	Noctule de Leisler	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AR
***Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)**	Noctule commune	VU	VU	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)**	Pipistrelle de Kuhl	DD	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	-
***Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)**	Pipistrelle commune	LC	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	TC
***Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)**	Oreillard gris	DD	LC	NT	X	Art. 2	An. IV	-

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection : article 2
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexes IV & V
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 5 - Amphibiens d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard nord » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768)**	Alyte accoucheur	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)**	Crapaud commun	LC	LC	LC		Art. 3		C
***Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768)**	Triton alpestre	LC	LC	LC	X	Art. 3		AC
***Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)**	Triton palmé	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)**	Grenouille agile	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Rana temporaria* (Linnaeus, 1758)**	Grenouille rousse	LC	LC	LC		Art. 4		C

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : articles 2, 3 & 4
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe IV
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Directive oiseaux [5]	Espèce réglementée [6]	Tendance des populations nicheuses métropolitaines [7]
***Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)**	Épervier d'Europe	LC	LC	LC			Art. 3 & 6	?
***Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)**	Alouette des champs	VU	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)**	Pipit farlouse	EN	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Apus apus* (Linnaeus, 1758)**	Martinet noir	LC	NT	NT	X		Art. 3	?
***Ardea alba* (Linnaeus, 1758)**	Grande Aigrette	VU	NT	LC	X	An. I		↗
***Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)**	Hibou des marais	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗↘
***Asio otus* (Linnaeus, 1758)**	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC			Art. 3	?
***Athene noctua* (Scopoli, 1769)**	Chouette chevêche	NT	LC	LC	X		Art. 3	=
***Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)**	Œdicnème criard	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	?
***Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)**	Chardonneret élégant	NT	VU	LC	X		Art. 3	=
***Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)**	Verdier d'Europe	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)**	Cigogne blanche	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)**	Busard des roseaux	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	=
***Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)**	Busard Saint-Martin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)**	Busard cendré	EN	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Columba oenas* (Linnaeus, 1758)**	Pigeon colombin	LC	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Cuculus canorus* Linnaeus, 1758**	Coucou gris	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)**	Hirondelle de fenêtre	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)**	Pic épeiche	LC	LC	LC			Art. 3	↗
***Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)**	Pic mar	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)**	Pic épeichette	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)**	Pic noir	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
***Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)**	Bruant proyer	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)**	Bruant zizi	EN	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)**	Bruant jaune	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)**	Bruant des roseaux	EN	EN	LC	X		Art. 3	↘
***Falco peregrinus* (Tunstall, 1771)**	Faucon pèlerin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)**	Hirondelle de cheminée	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)**	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC	X		Art. 3	↗
***Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)**	Rossignol philomèle	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)**	Milan royal	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)**	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Muscicapa striata* (Pallas, 1764)**	Gobemouche gris	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)**	Moineau domestique	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Passer montanus* (Linnaeus, 1758)**	Moineau friquet	CR	EN	LC	X		Art. 3	↘
***Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)**	Bondrée apivore	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
***Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)**	Rougequeue à front blanc	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)**	Pouillot fitis	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Picus viridis* (Linnaeus, 1758)**	Pic vert	LC	LC	LC			Art. 3	↘
***Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)**	Bouvreuil pivoine	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)**	Tarier pâtre	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)**	Tourterelle des bois	EN	VU	VU	X		Art. 3	↘
***Strix aluco* (Linnaeus, 1758)**	Chouette hulotte	LC	LC	LC			Art. 3	?
***Sylvia borin* (Boddaert, 1783)**	Fauvette des jardins	VU	NT	LC			Art. 3	↘
***Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)**	Grive litorne	RE	LC	LC	X		Art. 3	?
***Tyto alba* (Scopoli, 1769)**	Chouette effraie	NT	LC	LC			Art. 3	↗↘
***Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)**	Vanneau huppé	NT	NT	VU	X		Art. 3	?

Tableau 6 - Avifaune d'intérêt patrimonial recensée dans le secteur « plateau picard nord » entre 2020 et 2025

[1] Liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France (2024)

[2] Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)

[3] Liste rouge européenne des espèces menacées

[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)

[5] Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I

[6] Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : article 3

[7] Inventaire national du patrimoine naturel

Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, RE : éteint, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable

En augmentation : ↗

Stable : =


En déclin : ↘


Inconnue : ?

Fluctuant : ↗↘


Auchy-la-Montagne

Oiseaux





Auchy-la-Montagne (60360) - Amphibiens et mammifères
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
Fond de Saint-Germain
Vallée des Broches
150
173
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Auchy-la-Montagne
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Grenouilles et crapauds
Alyte accoucheur
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Chauve-souris
Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
AGGLO BEAUVAISIS
OFB
FRANCE RELANCE
Cofinancé par l'Union européenne
PICARDIE NATURE
cbn CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL BAILLEUL
Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France
INPN OpenObs
CHASSEURS DE L'OISE
PÊCHE

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Auchy-la-Montagne (60360) - Habitats naturels et semi-naturels



Crèvecœur-le-Grand

Oiseaux



Crèvecœur-le-Grand (60360) - Rapaces nocturnes











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Vergers
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes
- Voie ferrée

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Rapaces nocturnes

- Hibou moyen-duc
  Asio otus (Linnaeus, 1758)
- Chouette chevêche
  Athene noctua (Scopoli, 1769)
- Chouette hulotte
  Strix aluco (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie
  Tyto alba (Scopoli, 1769)

VILLE DE CRÈVECŒUR-LE-GRAND

Crèvecœur-le-Grand (60360) - Autres espèces patrimoniales





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Reptiles

Lézards

- Orvet fragile
  Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Flore

Aracées

- Gouet d'Italie
  Arum italicum (Mill., 1768)


Lépidoptères

- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)


Mammifères


- Muscardin
  Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Crèvecœur-le-Grand (60360) - Habitats naturels et semi-naturels





Limites administratives

- Limite communale


Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes

Habitats naturels et semi-naturels

- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties

Oiseaux


Fontaine-Saint-Lucien (60480) - Oiseaux
le Champ de Saint-Aubin
Mont d'Abbeville
Plaint l'Aventure
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Fontaine-Saint-Lucien
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Rapaces diurnes
Busard cendré Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Rapaces nocturnes
Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Chouette effraie Tyto alba (Scopoli, 1769)
Pics
Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Passereaux
Bruant zizi Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)
Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
0
1
2 km

Fontaine-Saint-Lucien (60480) - Flore, mammifères et papillons

Hors site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval »

0 20 40 m

Site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval »

0 10 20 m

Site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval »

0 40 80 m

le Champ de Saint-Aubin

Mont d'Abbeville

Plant l'Aventure

0 1 2 km

HAUTS-DE-FRANCE

OISE

Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Fontaine-Saint-Lucien

Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Faune

Papillons

- Fluoré
  Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)
- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Chauves-souris

- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
  Murin de Brandt
  Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
  Murin d'Alcathoe
  Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)

Flore

Fabacées

- Bugrane épineuse
  Ononis spinosa (L., 1753)

Gentianacées

- Gentiane d'Allemagne
  Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912

Orchidées

- Elléborine blanche
  Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
- Helléborine rouge
  Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809
- Orchis moucheron
  Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
- Orchis pourpre
  Orchis purpurea (Huds., 1762)
- Orchis vert
  Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828

Orobanchacées

- Euphraise raide
  Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809


Renonculacées


- Hellébore fétide
  Helleborus foetidus (L., 1753)

Thyméléacées

- Daphné lauréole
  Daphne laureola (L., 1753)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Fontaine-Saint-Lucien (60480) - Habitats naturels et semi-naturels
le Champ de Saint-Aubin
Mont d'Abbeville
Plant l'Aventure
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Fontaine-Saint-Lucien
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties

Francastel

Oiseaux



Francastel (60480) - Amphibiens







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Grenouilles et crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
- Grenouille agile
  Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)



Francastel (60480) - Mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris


- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin à oreilles échancrées
  Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Noctule de Leisler
  Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
- Noctule commune
  Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
- Oreillard gris
  Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)


Autres mammifères

- Martre (des pins)
  Martes martes (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales

Francastel (60480) - Richesse spécifique de la faune patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Richesse spécifique de la faune patrimoniale (2020 - 2025)

Nombre d'espèces par maille (250 x 250m)


- Maille non prospectée ou sans données
- [1 - 3]
- [4 - 6]
- [7 - 9]
- 10

Habitats naturels et semi-naturels




Guignecourt

Oiseaux



Guignecourt (60480) - Flore et mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Mammifères

Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Pipistrelle de Kuhl
  Pipistrellus kuhlii(Natterer in Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)

Flore

Amaryllidacées

- Ail à tête ronde
  Allium sphaerocephalon (L., 1753)

Asparagacées

- Muscari chevelu
  Muscari comosum (L.) Mill., 1768

Flore-GUIGNE

- Hélianthème nummulaire
  Helianthemum nummularium(L.) Mill., 1768

Flore-GUIGNE

- Gesse sans feuilles
  Lathyrus aphaca (L., 1753) var. *aphaca*


Orchidées

- Elléborine blanche
  Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
- Orchis bouc
  Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
- Ophrys mouche
  Ophrys insectifera (L., 1753)


Orobanchacées

- Mélampyre des champs
  Melampyrum arvense (L., 1753)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Guignecourt (60480) - Habitats naturels et semi-naturels




Juvignies

Oiseaux



Juvignies (60112) - Flore et insectes







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces d'insectes et de flore (2020 - 2025)

Libellules

- Anax empereur — *Anax imperator* (Leach, 1815)
- Agrion jouvenceille — *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758)

Papillons

- Procris — *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)
- Myrtil — *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)
- Sylvain — *Ochlodes sylvanus* (Esper, 1777)
- Tircis — *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
- Amaryllis — *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771)
- Vulcain — *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)

Criquets et sauterelles

- Leptophye ponctuée — *Leptophyes punctatissima* (Bosc, 1792)
- Criquet des pâtures — *Pseudochorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821)
- Decticelle bariolée — *Roeseliana roeseli* (Hagenbach, 1822)
- Conocéphale gracieux — *Ruspolia nitidula* (Scopoli, 1786)
- Grande Sauterelle verte — *Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation


Flore

- Gouet d'Italie — *Arum italicum* (Mill., 1768)


Papillons

- Demi-Deuil — *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Lachaussée-du-Bois-d'Écu

Oiseaux



Lachaussée-du-Bois-d'Écu (60480) - Amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Grenouilles et crapauds


- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Oiseaux


Le Saulchoy (60360) - Oiseaux
le Mont Aubert
Vallée de Forestel
la Marnière
Vallée Jacquet
Vallée Fervet
Vallée de Cocriamont
150
150
181
150
0
1
2 km
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Le Saulchoy
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Vergers
Zone bâtie
Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Voie ferrée
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Oiseaux diurnes
Coucou gris
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Bruant proyer
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Bruant jaune
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
Rapaces nocturnes
Chouette effraie
Tyto alba (Scopoli, 1769)


Le Saulchoy (60360) - Papillons
le Mont Aubert
Vallée de Forestel
la Marnière
Vallée Jacquet
Vallée Fervet
Vallée de Cocriamont
0
50 m
165
150
0
150 m
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Le Saulchoy
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Vergers
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopièthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Voie ferrée
Espèces de papillons (2020 - 2025)
Procris
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Souci
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Cuivré commun
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Myrtil
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Sylvain
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Piéride du chou
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Piéride de la rave
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Azuré de la Bugrane
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Amaryllis
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Vulcain
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Belle-Dame
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation
Collier-de-corail
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argus frêle
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Bel-Argus
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
Demi-Deuil
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Azuré de l'Ajonc
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

Le Saulchoy (60360) - Criquets et sauterelles







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Vergers
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes
- Voie ferrée


Espèces de criquets et sauterelles (2020 - 2025)

- Criquet marginé *Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)
- Criquet mélodieux *Chorthippus biguttulus* (Linnaeus, 1758)
- Criquet des mouillères *Euchorthippus declivus* (Brisout de Barneville, 1848)
- Leptophye ponctuée *Leptophyes punctatissima* (Bosc, 1792)
- Grillon des bois *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)
- Phanéroptère commun *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761)
- Decticelle cendrée *Pholidoptera griseoaptera* (De Geer, 1773)
- Criquet des pâtures *Pseudochorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821)
- Decticelle bariolée *Roeseliana roeselii* (Hagenbach, 1822)
- Conocéphale gracieux *Ruspolia nitidula* (Scopoli, 1786)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation

- Criquet noir-ébène *Omocestus ruficornis* (Zetterstedt, 1821)
- Criquet de la Palène *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796)
- Criquet de la Palène *Stenobothrus lineatus lineatus* (P., 1796)
- Decticelle carroyée *Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)

Le Saulchoy (60360) - Flore patrimoniale







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Vergers
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes
- Voie ferrée

Espèces de flore patrimoniale (2020 - 2025)


Flore vasculaire

- Galéopsis à feuilles étroites
  Galeopsis angustifolia (Ehrh. ex Hoffm., 1804)
- Hélianthème nummulaire
  Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768
- Bugrane étalée
  Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913
- Épiaire annuel
  Stachys annua (Linnaeus, 1763)
- Station de Gentianes d'Allemagne
  Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Le Saulchoy (60360) - Habitats naturels et semi-naturels




Luchy

Oiseaux



Luchy (60360) - Mammifères & amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Grenouilles


- Grenouille agile
  Rana dalmatina (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)

Chauves souris

- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)
- Oreillard roux
  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales

Luchy (60360) - Richesse spécifique de la faune patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers


Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Richesse spécifique de la faune patrimoniale (2020 - 2025)

Nombre d'espèces par maille (250 x 250 m)


- Maille non prospectée ou sans données
- 1
- 2
- 3
- 4


Luchy (60360) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Luchy
Vallée Robinette
le Chaufour
Rougemaison
0
1
2 km
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
FONDS VERT


Faune


Maisoncelle-Saint-Pierre (60112) - Amphibiens et oiseaux
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
le Fond de Luchy
150
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Maisoncelle-Saint-Pierre
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Amphibiens
Crapauds
Alyte accoucheur
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Crapaud commun
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Grenouilles
Grenouille agile
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)
Passereaux
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Hirondelle de cheminée
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Moineau domestique
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Rapaces nocturnes
Chouette hulotte
Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Pics
Pic vert
Picus viridis (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Maulers


Faune et flore



Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels





Muidorge

Oiseaux



Muidorge (60480) - Amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Crapauds


- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Muidorge (60480) - Habitats naturels et semi-naturels





Rotangy (60360) - Espèces patrimoniales
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
Fond de Saint-Germain
la Côte de la Vigne
Vallée de Rotangy
Fosse Marie Delin
Vallée de Boves
150
176
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Rotangy
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Voie ferrée
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Crapauds
Alyte accoucheur
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Crapaud commun
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Grenouilles
Grenouille agile
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)
Grenouille rousse
Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
Rapaces diurnes
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Passereaux
Linotte mélodieuse
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
Flore
Galanthe perce-neige
Galanthus nivalis (Linnaeus, 1753)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Rotangy (60360) - Habitats naturels et semi-naturels





Limites administratives

- Limite communale

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes

Habitats naturels et semi-naturels


- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties

Verderel-lès-Sauqueuse

Oiseaux



Verderel-lès-Sauqueuse (60112) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Asparagacées

- Muscari chevelu
  Muscari comosum (L.) Mill., 1768

Astéracées

- Épervière en ombelle
  Hieracium umbellatum (L., 1753)

Cistacées

- Hélianthème nummulaire
  Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768

Fabacées

- Genêt des teinturiers
  Genista tinctoria (L., 1753)
- Bugrane épineuse
  Ononis spinosa (L., 1753)
- Bugrane étalée
  Ononis spinosa (Wallr.) Briq., 1913 subsp. *procurrens*

Gentianacées

- Gentiane d'Allemagne
  Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912

Orchidées

- Orchis pyramidal
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
- Orchis de Fuchs
  Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962
- Orchis moucheron
  Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
- Néottie ovale
  Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837

Orobanchacées

- Mélampyre des champs
  Melampyrum arvense (L., 1753)


Plantaginacées

- Digitale pourpre
  Digitalis purpurea (L., 1753)

Rubiacées

- Gaillet nain
  Galium pumilum (Murray, 1770)

Verderel-lès-Sauqueuse (60112) - Chauves-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris


- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein
  Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
  Murin de Brandt
  Myotis brandtii ((Eversmann, 1845)
  Murin d'Alcathoe
  Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)


Verderel-lès-Sauqueuse (60112) - Amphibiens, reptiles et papillons




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales


Verderel-lès-Sauqueuse (60112) - Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales








Verderel-lès-Sauqueuse (60112) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
Fond de Péronne
Sauqueuse Saint-Lucien
Guehengnies
la Fosse Grade
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Verderel-lès-Sauqueuse
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
FONDS VERT !

Richesse spécifique du plateau picard nord






Trame verte et bleue - Corridor multri-trames de la Liovette et boisements
la Fosse Mahut
Vallée de Maulers
Vallée de Maulers
le Fond de Luchy
les Grands Fossés
Fosse aux Prieux
Sauqueuse Saint-Lucien
le Champ de Saint-Aubin
Guehengnies
la Fosse Grade
la Boudinière
Mont d'Abbeville
Oroër
l'Anglée
Houssoy le Farcy
Plant l'Aventure
Champ Martin
Clos Saint-Maurice
le Moulin de Bonlier
Bosquet Roche
le Chêne Peuquet
Fouquenies
le Champ du Moulin
l'Hôpital
les Boëlles
les Tortues
Beauséjour
Saint-Just des Marais
Argentine
Nerfelu
Marissel
les Grouettes
la Terre Boileau
Wagicourt
les Seize Mines
la Liovette
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Maisoncelle-Saint-Pierre
Guignecourt
Fontaine-Saint-Lucien
Tillé
Beauvais
Limites administratives
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Limites communales
Altitude
Courbes de niveau (isoplèthes d'altitude)
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Occupation du sol
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Espèces de cohérence nationale de la trame arborée (2020-2025) *
Sous-trame parc et boisement urbain
Gobemouche gris
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Espèces de cohérence nationale de la trame arborée (2013-2020)
Sous-trame des réseaux de haies
Fauvette babillarde
Curruca curruca (Linnaeus, 1758)
Espèces de cohérence régionale** de la trame arborée (2020-2025)
Sous-trame parcs et boisements urbains
Chouette hulotte
Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Pic épeiche
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Espèces de cohérence régionale** de la trame arborée (2013-2020)
Sous-trame ensemble boisé
Grillon des bois
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Autres éléments de continuité écologique
Éléments de restauration des continuités écologiques
Haies à restaurer
Zone de restauration des continuités écologiques
Ruptures de continuité écologique
Ruptures linéaires
Ruptures ponctuelles
Réservoirs de biodiversité principal
Zone spéciale de conservation FR2200363
Réservoirs de biodiversité secondaires
Réservoirs secondaires avérés
Réservoirs secondaires potentiels
FONDS VERT

Réservoirs secondaires de biodiversité- Plateau picard nord



Verderel-lès-Sauqueuse (60112) - Réservoir secondaire de biodiversité




Zonages réglementaires et d'intérêt écologique du secteur « plateau picard nord »
0 1 2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Plateau picard nord
Limites administratives
Limites communales
Zonages réglementaires
Espaces naturels sensibles
Sites Natura 2000 (zone spéciale de conservation)
FR2200369 - Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval
Zones d'intérêt écologique
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2
Sites propriétés du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France
0 0,5 1 km
0 1,9 3,8 km
Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France

Misumena vatia (Clerck, 1758) par Mme Gaëlle Billette






Plateau Picard Sud

Situé entre la Brèche et le Thérain, le secteur du plateau picard sud compte 14 communes et 10 575 habitants pour une superficie d'environ 157 km². Les communes concernées par ce découpage territorial repris du plan local d'urbanisme intercommunal sont les suivantes :


- Bonlier ;
- Bresles ;
- Fouquerolles ;
- Haudivillers ;
- Lafraye ;
- La Rue-Saint-Pierre ;
- La Neuville-en-Hez ;
- Laversines ;
- Le Fay-Saint-Quentin ;
- Litz ;
- Nivillers ;
- Rémérangles ;
- Tillé ;
- Velennes.




Le secteur du plateau picard sud équivaut environ à 29 % du territoire intercommunal. Les secteurs « plateau picard nord » et « plateau picard sud » représentent donc à eux deux la moitié de la surface totale de la communauté d'agglomération du Beauvaisis. À l'instar du secteur nord, les habitats cultivés correspondent à la plus grande part d'occupation du sol avec 102,8 km² soit environ 65 % de l'occupation du sol. Là encore, ces habitats cultivés concernent essentiellement une agriculture annuelle intensive qui transparaît à travers des paysages agricoles d'openfield prédominant et de manière homogène au nord et au centre du secteur. En effet, les communes de Bonlier, Bresles, Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, La Rue-Saint-Pierre, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin, Litz, Nivillers, Rémérangles, Tillé et Velennes concentrent la quasi-totalité de ces types d'habitats cultivés. Tandis qu'au sud du secteur, les communes de Bresles, de Litz, La Rue-Saint-Pierre et la Neuville-en-Hez sont davantage concernés par la présence de milieux forestiers. Ces quatre communes concentrent à elles seules presque 87 % des habitats forestiers du secteur. Ces derniers recouvrent plus de 90 % du territoire de la Neuville-en-Hez grâce à la présence de la forêt domaniale de Hez-Froidmont par exemple. Les habitats forestiers représentent environ 39 km² de l'occupation du sol du plateau picard sud.

Un autre élément notable à considérer pour la partie sud de ce secteur réside dans la présence beaucoup plus importante de milieux humides comparé au nord et au centre. Si la commune de Laversines, en position plutôt centrale, présente des enjeux de l'ordre de la trame verte et bleue grâce à la présence de la Laversines, du cours d'eau des Grouettes et de milieux humides associés, l'essentielle de ces derniers se localise sur les communes de Bresles, La Rue-Saint-Pierre, Litz et dans une moindre mesure La Neuville-en-Hez. La commune de Litz est parcourue par la rivière de la Brêche, serpentant au sein du marais de Litz. Le marais tourbeux alcalin de la commune de Bresles s'étend sur près de 205 hectares, représentant un peu moins de 10 % de la superficie communale. 80 mares ont été inventoriées en 2024 dans le secteur du plateau picard sud.

Ces facteurs ont une influence sur les cortèges faunistiques et floristiques retrouvés dans les territoires communaux. La présence de milieux boisés et humides dans ce secteur du plateau picard tend à accroître la biodiversité. Les marais de Bresles et de Litz comportent encore une richesse floristique et faunistique intéressante dans un secteur où les milieux agricoles intensifs prédominent. Les milieux naturels ouverts occupent 3 % du territoire du secteur, localisés notamment en contexte marécageux, tandis que les zones bâties recouvrent environ 10 % du secteur avec 14,7 km².



N.B. : les données concernant les zones humides proviennent d'un autre jeu de données que celui utilisé pour les autres habitats. Les zones humides peuvent donc chevaucher un habitat forestier, ouvert ou cultivé (critère non cumulatif).



Dans ce secteur, 6 des 8 espèces de reptiles présentes dans le Beauvaisis sont retrouvées. 3 de ces espèces sont menacées au niveau local : les deux serpents que sont la vulnérable Coronelle lisse *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768) et la Vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758), en danger dans les Hauts-de-France et vulnérable à l'échelle métropolitaine. Le Lézard agile *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758) y figure aussi en tant qu'espèce vulnérable dans le Beauvaisis. La biodiversité reptilienne dans ce secteur est donc beaucoup plus importante que son corollaire du nord.

Parmi les 136 espèces d'oiseaux recensées dans ce secteur ces cinq dernières années, 64 sont considérées d'intérêt patrimonial soit presque la moitié ! Beaucoup d'entre elles sont des espèces nicheuses considérées menacées ou quasi menacées au niveau régional. Parmi elles, 5 sont classées « en danger critique d'extinction » dans les Hauts-de-France et, *a fortiori*, dans le Beauvaisis.

Sur les 44 lépidoptères recensés dans ce secteur à la même période, 7 espèces patrimoniales ont été identifiées. La moitié de ces papillons est menacée au niveau local. Il est intéressant de noter la présence de deux papillons forestiers vulnérables, les Petit et Grand Mars changeant *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775) et *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) qui trouvent dans ce secteur ses habitats de prédilections par rapport au plateau picard nord.

La biodiversité des orthoptères devient elle aussi plus intéressante que son corollaire du nord puisque sur les 25 espèces et sous-espèces identifiées sur le plateau picard sud, on compte 9 espèces patrimoniales dont 2 menacées dans le Beauvaisis.

36 espèces et sous-espèces d'odonates ont été observées - toujours ces cinq dernières années – soit plus de la moitié des espèces présentes en Picardie[3]. Figurent parmi elles 12 espèces d'intérêt patrimonial.

Par rapport au plateau picard nord, il est intéressant de souligner l'apparition nettement plus importante d'espèces de zones humides, aussi bien chez les oiseaux que les orthoptères avec la présence du Criquet ensanglanté *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758), du Tétrix des vasières *Tetrix ceperoi* (Bolívar, 1887) ou du rare et très menacé Criquet palustre *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825). Toujours en ce sens, la communauté d'odonates compte un cortège de 36 espèces (contre 4 sur le plateau picard nord selon les connaissances actuelles). Pour les amphibiens, on note la présence de la Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) dans le sud du secteur, non présente dans le cortège d'amphibiens du plateau picard nord qui compte tout de même une espèce de triton supplémentaire, le Triton alpestre *Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768)**.**

À propos des mammifères répertoriés dans le secteur, la guilde des chauves-souris compte 16 espèces sur les 21 présentes en Picardie[4]. Le Muscardin *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758), micromammifère discret de la famille du Loire et du Lérot, protégé dans le Beauvaisis, se retrouve dans les milieux boisés de la commune de la Neuville-en-Hez.



Mare forestière en forêt de Hez-Froidmont où il est possible d'apercevoir le Martin-pêcheur *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758), espèce nicheuse vulnérable en Hauts-de-France

[3] Liste rouge des odonates de Picardie – Picardie Nature (2017)

[4] Liste rouge des odonates de Picardie – Picardie Nature (2017)

Que se trame-t-il dans le plateau picard sud ?

Un autre enjeu de la Trame verte et bleue a été identifié dans le secteur du plateau picard sud. Il s'agit là encore d'un corridor multi-trames traversant 6 communes (cf. carte p. 156). Du nord au sud, il s'agit de : Lafraye, Velennes, Nivillers, Fouquerolles Laversines et Rochy-Condé. Lors des inventaires complémentaires d'odonates dans la commune de Laversines, il s'est avéré que la richesse spécifique est bien plus intéressante qu'attendue avec notamment l'observation d'un individu de Gomphe à forceps *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758), espèce rare du territoire classée « vulnérable » dans la dernière liste rouge actualisée des odonates de l'ancienne picardie administrative et espèce déterminante ZNIEFF. Une analyse des ruptures de continuités de la Laversines serait à envisager et est donc proposée pour le programme d'actions qui découle de l'ABC. Les travaux de restauration des zones humides entrepris par la commune sont favorables pour l'accueil de nouvelles espèces plus ou moins inféodées aux zones humides qui pourraient arriver naturellement par cette trame bleue. Celle-ci peut tout à fait se concevoir comme un front de reconquête de la biodiversité aquatique dans cette partie du territoire au réseau hydrographique plus réduit et dominé par l'agriculture intensive et ses paysages d'openfields fortement dépourvus en haies.

Des espèces patrimoniales d'oiseaux, présentant de véritables enjeux de conservation à l'échelle locale, sont également présents au sein de ce corridor s'inscrivant dans ce contexte fortement anthropisé. Au sein de ces 6 communes, ont notamment été identifiées la Tourterrele des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758) - en danger d'extinction dans les Hauts-de-France et vulnérable à l'échelle métropolitaine - les vulnérables Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758) et Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783). Les vulnérables Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758) et Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758) sont également présents dans ce corridor, oiseaux caractéristiques des milieux ouverts entrecoupés de haies, de buissons et de lisières de bois ou forêts. Des espèces cavicoles comme la Chouette hulotte *Strix aluco* (Linnaeus, 1758) et le Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) ainsi que des espèces de chauves-souris sont présentes dans les entités forestières qui ponctuent ce corridor multi-trames.

On observe donc des espèces inféodées aux zones humides pour tout ou partie de leur cycle de vie, des cortèges d'oiseaux typiques des milieux ouverts avec présences de haies mais aussi des espèces davantage forestières. La présence de toutes ces espèces patrimoniales, dont certaines aux lourds enjeux enjeux et pour lesquelles le Beauvaisis joue un rôle dans leur conservation d'abord régionale, justifie de prendre en considération ces problématiques de connectivité entre les différents réservoirs secondaires de biodiversité identifiés au sein de ce corridor écologique proposé.

L'aéroport et ses tapis de graminées, un havre de biodiversité ?

Un autre élément important dans ce secteur territorial repose sur la présence de l'aéroport de Beauvais-Tillé situé dans la commune de Tillé, au nord. Au vu de espèces recensées dans cette partie de la commune - et au-delà de toute considération politique ou économique - serait-on en droit de se demander s'il ne s'agit pas là d'un réservoir de biodiversité ? Si seulement 4 espèces d'insectes et de reptiles d'intérêt patrimonial y ont été observés ces cinq dernières années selon les données récoltées (dont l'assez rare criquet Œdipode turquoise *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)), la richesse spécifique des oiseaux est très intéressante. Trois espèces nicheuses classées en « danger critique d'extinction » dans les Hauts-de-France ont été renseignées ces cinq dernières (on ne parle pas des populations hivernantes ou de passage mais bien des populations nicheuses) :

- Le Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758) ;
- Le Hibou des marais *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) ;
- Le Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758).

D'autres espèces de passereaux et de rapaces en mauvais état de conservation régional fréquentent également les milieux herbacés de l'aéroport. On pense notamment aux trois espèces de bruants recensées dont le Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758) ou encore le Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758), tous deux classés « en danger » au niveau régional.

Les marais du plateau picard sud, haut lieu de biodiversité du secteur



Marais de Litz

Le Marais de Bresles, situé dans la partir sud de la commune éponyme, se localise dans la cuvette entre la Forêt de Hez-Froidmont et le Mont César, le long de la Vallée du Thérain. Malgré le développement de fourrés et de forêt denses qui tendent à refermer les milieux ouverts, ce marais tourbeux alcalin renferme encore une biodiversité très intéressante liée aux zones humides et aux pelouses sèches adjacentes ou qu'il renferme en son sein. C'est d'ailleurs dans ce marais que l'on retrouve la plus grande densité d'espèces patrimoniales floristiques et faunistiques du territoire communal. Beaucoup d'espèces rares et en danger s'y retrouvent comme le Criquet palustre *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), la Vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) ou la Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) - dont les effectifs nicheurs sont au bord de l'extinction d'après la dernière liste rouge régionale – pour ne citer qu'eux. C'est à peu près le même schéma pour le marais de Litz, même si les communautés animales et végétales d'intérêt patrimonial qu'on y retrouve comportent moins d'espèces. Des enjeux persistent tout de même, comme la localisation d'une espèce vulnérable de moule d'eau douce : l'Anodonte des étangs *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758), un organisme filtreur participant à l'épuration de l'eau. D'autres espèces patrimoniales de zones humides sont présentes mais la plupart sont beaucoup plus communes. Il s'agit là encore de la zone qui concentre le plus d'espèces patrimoniales dans la commune.

La petite anecdote naturaliste du secteur

Quelle fût la surprise, même minime, que de localiser une petite station d'Orchis pyramidal *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817 et d'Ophrys abeille *Ophrys apifera* (Huds., 1762), « coincées » entre deux parcelles de grande culture à l'orée d'un petit boisement lors des inventaires crépusculaire de rapaces nocturnes dans la commune de Velennes. Peut-être pas les espèces les plus emblématiques du territoire, mais un beau message d'espoir pour nous dire que la nature peut réserver quelques surprises là où on ne s'y attend pas forcément !



Ophrys abeille *Ophrys apifera* (Huds., 1762), observée de manière totalement fortuite lors d'inventaires de rapaces nocturnes à Velennes

Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées sur le plateau picard sud

Tableau 7 - Avifaune d'intérêt patrimonial recensée dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional*	État de conservation métropolitain*	État de conservation européen*	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie**	Directive oiseaux ***	Espèce réglementée ****	Tendance des populations nicheuses métropolitaines
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	NA	VU	LC	X		Art. 3	?
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	LC	LC	LC			Art. 3 & 6	?
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	Rousserole effarvatte	NT	LC	LC			Art. 3	=
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)	Alouette des champs	VU	NT	LC	X		Art. 3	↘
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur	VU	VU	LC	X	An. I	Art. 3	?
Apus apus (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC	NT	NT	X		Art. 3	?
Ardea alba (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↔
Asio otus (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC			Art. 3	?
Athene noctua (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche	NT	LC	LC	X		Art. 3	=
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	NT	VU	LC	X		Art. 3	=
Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	LC	NT	LC	X		Art. 3	=
Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	Petit Gravelot	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	EN	EN	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	=
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	EN	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Columba oenas Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	LC	LC	LC	X		Art. 3	↗
Cuculus canorus Linnaeus, 1758	Coucou gris	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC	LC	LC			Art. 3	↗
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Pic noir	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)	Bruant proyer	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	EN	EN	LC	X		Art. 3	↘
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Fulica atra (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	LC	LC	NT	X		Art. 3	=
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	CR	LC	LC	X		Art. 3	↘
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	CR	CR	VU	X		Art. 3	↘
Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle de cheminée	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	NT	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC	X		Art. 3	↗
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Milan noir	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)	Bergeronnette des ruisseaux	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Motacilla flava (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR	NT	LC	X		Art. 3	=
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	VU	LC	LC				↘
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Picus viridis (Linnaeus, 1758)	Pic vert	LC	LC	LC			Art. 3	↘
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	Râle d'eau	NT	LC	LC	X		Art. 3	?
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	CR	VU	LC	X		Art. 3	↘
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	Serin cini	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	EN	VU	VU	X		Art. 3	↘
Strix aluco (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte	LC	LC	LC			Art. 3	?
Sylvia borin (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	VU	NT	LC			Art. 3	↘
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	LC	LC	LC	X		Art. 3	↘
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)	Grive litorne	RE	LC	LC	X		Art. 3	?
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	NT	LC	LC			Art. 3	↔
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NT	NT	VU	X		Art. 3	?

*Liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France (2024)

*Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)

*Liste rouge européenne des espèces menacées

** List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)

***Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I

****Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3

****Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 6

Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction, CR : en danger critique d'extinction, RE : éteint, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable

En augmentation : ↗

Stable : =

En déclin : ↘

Inconnue : ?

Fluctuant : ↔

Tableau 8 - Reptiles d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]
***Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)**	Orvet fragile	LC	LC	LC		Art. 3	
***Coronella austriaca* (Laurenti, 1768)**	Coronelle lisse	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
***Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758)**	Lézard agile	VU	NT	LC	X	Art. 2	An. IV
***Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)**	Couleuvre à collier	LC	LC	LC	X	Art. 2	
***Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)**	Lézard des murailles	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
***Vipera berus* (Linnaeus, 1758)**	Vipère péliade	EN	VU	LC	X	Art. 2	

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Articles 2 & 3
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV

Tableau 9 - Orthoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée	Indice de rareté [4]
***Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)**	Criquet marginé	LC	NE	LC	X		AR
***Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758)**	Courtilière commune	VU	NE	LC			AR
***Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)**	Grillon des bois	LC	NE	LC			C
***Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)**	Œdipode turquoise	LC	NE	LC	X		AR
***Oedipoda caerulescens caerulescens* (Linnaeus, 1758)**	Œdipode turquoise	LC	NE	LC	X		AR
***Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)**	Criquet noir-ébène	NT	NE	LC	X		PC
***Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825)**	Criquet palustre	EN	NE	LC	X		R
***Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)**	Criquet ensanglanté	NT	NE	LC	X		AC
***Tetrix ceperoi* (Bolívar, 1887)**	Tétrix des vasières	LC	NE	LC	X		AR

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Picardie Nature (2024)
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 8 - Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]
***Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Petit Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Apatura iris* (Linnaeus, 1758)**	Grand Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Collier-de-Corail	LC	LC	LC		
***Boloria dia* (Linnaeus, 1767)**	Petite Violette	NT	LC	LC		
***Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)**	Hespérie du Brome	VU	LC	LC	X	
***Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)**	Miroir	EN	LC	LC	X	
***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**	Demi-Deuil	LC	LC	LC		

[1] Liste rouge des papillons de jour des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 9 - Mammifères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)**	Sérotine commune	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758)**	Muscardin	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Bechstein	VU	NT	VU	X	Art. 2	An. IV	PC
***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Daubenton	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	C
***Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)**	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)**	Grand Murin	EN	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)**	Murin à moustaches	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)**	Murin d'Alcathoe	DD	LC	NT		Art. 2	An. IV	-
***Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)**	Murin de Brandt	DD	LC	LC		Art. 2	An. IV	-
***Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)**	Murin de Natterer	LC	LC	LC		Art. 2	An. IV	AC
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**	Noctule de Leisler	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AR
***Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)**	Noctule commune	VU	VU	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)**	Pipistrelle de Kuhl	DD	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	-
***Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)**	Pipistrelle de Nathusius	NT	LC	LC		Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)**	Pipistrelle commune	LC	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	TC
***Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)**	Oreillard roux	NT			X	Art. 2	An. IV	PC
***Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)**	Oreillard gris	DD	LC	NT	X	Art. 2	An. IV	-

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 10 - Amphibiens d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768)**	Alyte accoucheur	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)**	Crapaud commun	LC	LC	LC		Art. 3		C
***Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)**	Triton palmé	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)**	Grenouille agile	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Rana temporaria* (Linnaeus, 1758)**	Grenouille rousse	LC	LC	?		Art. 4	An. V	C
***Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758)**	Salamandre tachetée	NT	LC	VU	X	Art. 3		PC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : articles 2, 3 & 4
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe IV
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 11 - Poissons d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain [1]	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée [4]
***Esox lucius* (Linnaeus, 1758)**	Brochet	?	VU	LC	X	Art. 1
***Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)**	Vairon	?	LC	LC	X	

[1] Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national : Article 1

Tableau 12 - Odonates d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée	Indice de rareté [5]
***Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)**	Aeschne affine	LC	LC	LC	X		AR
***Brachytron pratense* (O.F. Müller, 1764)**	Aeschne printanière	NT	LC	LC	X		PC
***Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X		C
***Calopteryx virgo virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X		C
***Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789)**	Agrion délicat	LC	LC	LC	X		PC
***Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842)**	Agrion mignon	LC	LC	LC	X		PC
***Erythromma lindenii* (Selys-Longchamps, 1840)**	Agrion de Vander Linden	LC	LC	LC	X		PC
***Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837)**	Orthétrum brun	LC	LC	LC	X		PC
***Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798)**	Orthétrum bleuissant	NT	LC	LC	X		AR
***Orthetrum coerulescens coerulescens* (Fabricius, 1798)**	Orthétrum bleuissant	NT	LC	LC	X		AR
***Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758)**	Gomphe à forceps	VU	LC	LC	X		R
***Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)**	Leste brun	LC	LC	LC	X		AC

[1] Picardie Nature (2024)
[2] Liste rouge des libellules et demoiselles de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Picardie Nature (2024)

Tableau 13 – Mollusques d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée
***Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758)**	Anodonte des étangs	VU	VU	NT		

[1] Liste rouge des Mollusques continentaux des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des mollusques continentaux de France métropolitaine (2021)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)

Tableau 14 - Flore d'intérêt patrimonial recensée dans le secteur « plateau picard sud » entre 2020 et 2025

Espèce		Famille	État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie/Hauts-de-France [4]	Directive Habitat-Faune-Flore [5]	Espèce réglementée [6]
Althaea officinalis **(L., 1753)**	Guimauve sauvage	Malvacées	LC	LC	LC	X		
Anacamptis pyramidalis **(L.) Rich., 1817**	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis **(L.) Rich., 1817**	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Anemone sylvestris **(L., 1753)**	Anémone sylvestre	Renonculacées	LC	NT	?	X		
Aquilegia alpina **(L., 1753)**	Ancolie des Alpes	Renonculacées	LC	LC	LC		An. IV	Art. 1 M.
Aquilegia vulgaris **(L., 1753)**	Ancolie commune	Renonculacées	LC	LC	DD	X		
Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris **(L., 1753)**	Ancolie commune	Renonculacées	LC	LC	DD	X		
Arabis hirsuta **(L.) Scop., 1772**	Arabette poilue	Brassicacées	LC	LC	LC	X		
Arum italicum **(Mill., 1768)**	Gouet d'Italie	Aracées	NA	LC	?	X		
Atropa belladonna **(L., 1753)**	Belladone	Solanacées	LC	LC	LC	X		
Avenella flexuosa subsp. flexuosa **(L.) Drejer, 1838**	Canche flexueuse	Poacées	LC	NE	?	X		
Betonica officinalis **(L., 1753)**	Bétoine officinale	Lamiacées	LC	LC	LC	X		
Buglossoides purpurocaerulea **(L.) I.M. Johnst., 1954**	Grémil bleu pourpre	Boraginacées	EN	LC	?	X		Art.1 P.
Calluna vulgaris **(L.) Hull, 1808**	Callune commune	Éricacées	LC	LC	LC	X		
Cardamine impatiens **(L., 1753)**	Herbe au diable	Brassicacées	LC	LC	?	X		
Carex digitata **(L., 1753)**	Laîche digitée	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex flava **(L., 1753)**	Laîche jaune	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex lepidocarpa **(Tausch, 1834)**	Laîche écailleuse	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex pallescens **(L., 1753)**	Laîche pâle	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex pilulifera subsp. pilulifera **(L., 1753)**	Laîche à pilules	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex pseudocyperus **(L., 1753)**	Laîche faux souchet	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex tomentosa **(L., 1767)**	Laîche tomenteuse	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Centaurea nigra **(L., 1753)**	Centaurée noire	Astéracées	?	DD	?	X		
Centaurium erythraea **(Rafn, 1800)**	Érythrée petite-centaurée	Gentianacées	LC	LC	LC			
Cephalanthera damasonium **(Mill.) Druce, 1906**	Elléborine blanche	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Cladium mariscus **(L.) Pohl, 1809**	Cladium des marais	Cypéracées	LC	LC	LC	X		
Dactylorhiza fuchsii **(Druce) Soó, 1962**	Orchis de Fuchs	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Dactylorhiza incarnata **(L.) Soó, 1962**	Orchis incarnat	Orchidées	NT	NT	LC	X		Art.1 P.
Dactylorhiza praetermissa **(Druce) Soó, 1962**	Orchis négligé	Orchidées	LC	NT	?	X		Art.1 P.


[1] Liste rouge de la flore vasculaire et des bryophytes des Hauts-de-France (2019)
[2] Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV
[6] Liste des espèces végétales protégées en région Picardie : Article 1
[6] Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1

Daphne laureola **(L., 1753)**	Daphné lauréole	Thyméléacées	LC	LC	LC	X	
Delphinium elatum **(L., 1753)**	Dauphinelle élevée	Renonculacées	?	VU	?		
Dianthus armeria **(L., 1753)**	Œillet armérie	Caryophyllacées	LC	LC	?	X	
Digitalis lutea **(L., 1753)**	Digitale jaune	Plantaginacées	LC	LC	?	X	
Digitalis purpurea **(L., 1753)**	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X	
Digitalis purpurea var. purpurea **(L., 1753)**	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X	
Equisetum hyemale **(L., 1753)**	Prêle d'hiver	Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes	LC	LC	LC	X	Art.1 P.
Euphrasia stricta **(D. Wolff ex J.F. Lehm., 1809)**	Euphraise raide	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Ficaria verna **(Huds., 1762)**	Ficaire printanière	Renonculacées	LC	LC	LC	X	
Genista tinctoria **(L., 1753)**	Genêt des teinturiers	Fabacées	LC	LC	?	X	
Helianthemum nummularium **(L.) Mill., 1768**	Hélianthème nummulaire	Cistacées	LC	LC	?	X	
Helleborus foetidus **(L., 1753)**	Hellébore fétide	Renonculacées	LC	LC	LC	X	
Himantoglossum hircinum **(L.) Spreng., 1826**	Orchis bouc	Orchidées	LC	LC	LC	X	
Hydrocotyle vulgaris **(L., 1753)**	Écuelle d'eau	Araliacées	LC	LC	LC	X	
Hylotelephium telephium **(L.) H. Ohba, 1977**	Orpin téléphium	Crassulacées	NT	LC	?	X	
Hypericum elodes **(L., 1759)**	Millepertuis des marais	Hypéricacées	VU	LC	LC	X	Art.1 P.
Hypericum humifusum **(L., 1753)**	Millepertuis couché	Hypéricacées	LC	LC	?	X	
Hypericum montanum **(L., 1755)**	Millepertuis des montagnes	Hypéricacées	VU	LC	?	X	
Hypericum pulchrum **(L., 1753)**	Millepertuis élégant	Hypéricacées	LC	LC	?	X	
Inula salicina **(L., 1753)**	Inule saulière	Astéracées	LC	LC	?	X	Art.1 P.
Iris foetidissima **(L., 1753)**	Iris fétide	Iridacées	LC	LC	?	X	
Juncus acutiflorus **(Ehrh. ex Hoffm., 1791)**	Jonc à fleurs aiguës	Joncacées	LC	LC	LC	X	
Juncus subnodulosus **(Schrank, 1789)**	Jonc à fleurs obtuses	Joncacées	LC	LC	LC	X	
Lithospermum officinale **(L., 1753)**	Grémil officinal	Boraginacées	LC	LC	?	X	
Luzula forsteri **(Sm.) DC., 1806**	Luzule de Forster	Joncacées	LC	LC	?	X	
Lysimachia tenella **(L., 1753)**	Lysimaque délicate	Primulacées	LC	LC	?	X	Art.1 P.
Malva alcea **(L., 1753)**	Mauve alcée	Malvacées	LC	LC	?	X	
Medicago arabica **(L.) Huds., 1762**	Luzerne maculée	Fabacées	LC	LC	LC	X	
Melampyrum arvense **(L., 1753)**	Mélampyre des champs	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Melampyrum pratense **(L., 1753)**	Mélampyre des prés	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Melica nutans **(L., 1753)**	Mélique penchée	Poacées	NT	LC	?	X	
Melittis melissophyllum **(L., 1753)**	Mélitte à feuilles de mélisse	Lamiacées	EN	LC	?	X	
Molinia caerulea **(L.) Moench, 1794**	Molinie bleue	Poacées	LC	LC	?	X	
Molinia caerulea subsp. caerulea **(L.) Moench, 1794**	Molinie bleue	Poacées	LC	LC	?	X	
Myosotis sylvatica **(Hoffm., 1791)**	Myosotis des forêts	Boraginacées	LC	LC	?	X	


***Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817**	Néottie nid-d'oiseau	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Ononis spinosa* (L., 1753)**	Bugrane épineuse	Fabacées	LC	LC	?	X		
***Ophrys apifera* (Huds., 1762)**	Ophrys abeille	Orchidées	LC	LC	LC			
***Ornithogalum umbellatum* (L., 1753)**	Dame-d'onze-heures	Asparagacées	LC	LC	?	X		
***Polygala calcarea* (F.W. Schultz, 1837)**	Polygale du calcaire	Polygalacées	LC	LC	LC	X		
***Polygala vulgaris* (L., 1753)**	Polygale commun	Polygalacées	LC	LC	?	X		
***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906**	Sceau-de-Salomon odorant	Asparagacées	LC	LC	LC	X		
***Potamogeton coloratus* (Hornem., 1813)**	Potamot coloré	Potamogétonacées	LC	LC	LC	X		Art.1 P.
***Potentilla verna* (L., 1753)**	Potentille printanière	Rosacées	LC	LC	?	X		
***Prunus padus* (L., 1753)**	Merisier à grappes	Rosacées	LC	LC	LC	X		
***Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768)**	Anémone pulsatille	Renonculacées	NT	LC	NT	X		
***Pyrus communis* (L., 1753)**	Poirier commun	Rosacées	LC	LC	LC	X		
***Quercus pubescens* (Willd., 1796)**	Chêne pubescent	Fagacées	LC	LC	LC	X		
***Rumex acetosella* (L., 1753)**	Patience petite-oseille	Polygonacées	LC	LC	LC	X		
***Ruscus aculeatus* L., 1753)**	Fragon piquant	Asparagacées	LC	LC	LC	X	An. V	
***Salix atrocinerea* (Brot., 1804)**	Saule gris cendré foncé	Salicacées	LC	LC	LC	X		
***Salvia pratensis* (L., 1753)**	Sauge des prés	Lamiacées	LC	LC	?	X		
***Samolus valerandi* (L., 1753)**	Samole de Valérand	Primulacées	LC	LC	LC	X		
***Scabiosa columbaria* (L., 1753)**	Scabieuse colombaire	Caprifoliacées	LC	LC	?	X		
***Sedum album* (L., 1753)**	Orpin blanc	Crassulacées	LC	LC	?	X		
***Sedum sexangulare* (L., 1753)**	Orpin à six angles	Crassulacées	LC	LC	?	X		
***Succisa pratensis* (Moench, 1794)**	Succise des prés	Caprifoliacées	LC	LC	?			
***Taxus baccata* (L., 1753)**	If commun	Taxacées	LC	LC	LC	X		
***Thalictrum flavum* (L., 1753)**	Pigamon jaune	Renonculacées	LC	LC	?	X		
***Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017**	Sorbier alisier	Rosacées	LC	LC	LC	X		
***Vaccinium myrtillus* (L., 1753)**	Myrtille	Ericacées	NT	LC	LC	X		
***Vincetoxicum hirundinaria* (Medik., 1790)**	Dompte-venin	Apocynacées	LC	LC	?	X		

Bonlier

Faune et flore




Habitats naturels et semi-naturels





Bresles

Oiseaux



Bresles (60510) - Oiseaux # 2





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopièthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Sizerin flammé *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758)
- Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Cochevis huppé *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Locustelle luscinioide *Locustella luscinioides* (Savi, 1824)
- Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)


Colombidés


- Pigeon colombin *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Autres

- Petit Gravelot *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786)
- Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)

Bresles (60510) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Orchidées

- Dactylorhize incarnat *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, 1962
- Dactylorhize négligé *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó, 1962
- Ophrys abeille *Ophrys apifera* (Huds., 1762)

Renonculacées

- Anémone sauvage *Anemone sylvestris* (L., 1753)
- Ancolie commune *Aquilegia vulgaris* (L., 1753)
- Anémone pulsatille *Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768)
- Pigamon jaune *Thalictrum flavum* (L., 1753)

Cypéracées

- Laîche écailleuse *Carex lepidocarpa* (Tausch, 1834)
- Laîche faux souchet *Carex pseudocyperus* (L., 1753)
- Marisque *Cladium mariscus* (L.) Pohl, 1809

Aracées

- Gouet d'Italie *Arum italicum* (Mill., 1768)

Fabacées

- Genêt des teinturiers *Genista tinctoria* (L., 1753)

Araliacées

- Hydrocotyle commune *Hydrocotyle vulgaris* (L., 1753)

Astéracées

- Inule saulière *Inula salicina* (L., 1753)

Iridacées

- Iris fétide *Iris foetidissima* (L., 1753)

Joncacées

- Jonc à fleurs obtuses *Juncus subnodulosus* (Schrank, 1789)

Primulacées

- Mouron délicat *Lysimachia tenella* (L., 1753)


Potamogetonacées


- Potamot coloré *Potamogeton coloratus* (Hornem., 1813)

Lamiacées

- Sauge des prés *Salvia pratensis* (L., 1753)

Bresles (60510) - Serpents et lézards





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Lézards (2020 - 2025)

- Orvet fragile
  Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation


- Lézard des souches
  Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)
- Lézard des murailles
  Podarcis muralis (Laurenti, 1768)


Serpents (2020 - 2025)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation

- Coronelle lisse
  Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
- Couleuvre à collier
  Natrix helvetica (Lacepède, 1789)
- Vipère péliade
  Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Bresles (60510) - Papillons, criquets et grillons





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Papillons

- Petit Mars changeant — *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Grand Mars changeant — *Apatura iris* (Linnaeus, 1758)
- Petite Violette — *Boloria dia* (Linnaeus, 1767)
- Hespérie du Brome — *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)
- Miroir — *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)
- Demi-Deuil — *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)


Criquets et grillons


- Criquet marginé — *Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)
- Taupette — *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758)
- Grillon des bois — *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)
- Œdipode turquoise — *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)
- Criquet noir-ébène — *Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)
- Criquet palustre — *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825)
- Criquet ensanglanté — *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)
- Tétrix des vasières — *Tetrix ceperoi* (Bolivar, 1887)

Bresles (60510) - Libellules et demoiselles, amphibiens et poissons




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Bresles (60510) - Habitats naturels et semi-naturels
Roch
Fresnoy
Carreau d'Antin
0
2
4 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Bresles
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties


Fouquerolles

Oiseaux




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Fouquerolles (60510) - Habitats naturels et semi-naturels
Petit Censieu
les Tortues
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Fouquerolles
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties

Haudivillers


Oiseaux




Haudivillers (60510) - Amphibiens et papillons



Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Haudivillers (60510) - Habitats naturels et semi-naturels




Lafraye


Oiseaux




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Lafraye (60510) - Habitats naturels et semi-naturels



Oiseaux


La Rue-Saint-Pierre (60510) - Oiseaux # 1
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
La Rue-Saint-Pierre
Carreau d'Antin
le Trépied
0 100 200 m
0 1 2 km
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Rapaces diurnes
Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Faucon hobereau Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Rapaces nocturnes
Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Chouette effraie Tyto alba (Scopoli, 1769)
Échassiers
Grande Aigrette Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Pics
Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Autres oiseaux
Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758)
Caille des blés Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Foulque macroule Fulica atra (Linnaeus, 1758)
Guêpier d'Europe Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)


La Rue-Saint-Pierre (60510) - Oiseaux # 2











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Autres espèces patrimoniales

La Rue-Saint-Pierre (60510) - Flore et autres espèces faunistiques patrimoniales







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Papillons de jour

- Petit Mars changeant — *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Papillons de nuit

- Écaille fermière — *Arctia villica* (Linnaeus, 1758)
- Sphinx gazé — *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758)

Flore

- Campanule agglomérée — *Campanula glomerata* (L., 1753)
- Chicorée sauvage — *Cichorium intybus* (L., 1753)
- Agripaume cardiaque — *Leonurus cardiaca* (L., 1753)
- Merisier à grappes — *Prunus padus* (L., 1753)

Crapauds

- Crapaud commun — *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)


Reptiles

- Lézard des murailles — *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)
- Vipère péliade — *Vipera berus* (Linnaeus, 1758)


Coléoptères


- Lucane cerf-volant — *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



La Rue-Saint-Pierre (60510) - Habitats naturels et semi-naturels





Limites administratives

- Limite communale

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes

Habitats naturels et semi-naturels

- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties

La Neuville-en-Hez

Contribution de la classe de Mme Marie Garzoni pour l'ABC du Beauvaisis

Les Chauves-souris



Cette année, la classe des GS-CP a travaillé sur les chauves-souris. Nous sommes allés les observer autour de l'étang le vendredi 25 avril au soir. Ce sont des animaux nocturnes et insectivores donc elles sortent chasser à la nuit tombée et il y a beaucoup d'insectes autour de l'eau.

À l'aide d'une caméra thermique, nous avons pu les voir et avec un autre appareil, nous avons pu entendre le son qu'elles émettent pour se repérer. Les chauves-souris de notre commune sont des pipistrelles, pas plus grandes qu'un pouce.

Elles peuvent nager si leurs ailes sont déployées. Leurs ailes sont faites d'une peau tendue entre leurs doigts, une membrane, qui leur permet de voler. Elles dorment à l'envers pour se protéger des prédateurs et pour pouvoir s'envoler car elles sont trop petites pour décoller du sol. C'est un mammifère qui fait un petit par an.

Les femelles s'organisent en maternité, certaines femelles gardent les petits pendant que les mamans vont chasser et quand elles reviennent, les gardiennes partent chasser à leur tour. Si une maman ne revient pas, le petit est abandonné. La colonie n'est pas capable de nourrir les orphelins. Si le petit ne réussit pas à s'envoler, il meurt. Sa mère ne peut pas l'aider.

On trouve souvent les chauves-souris dans les greniers, les grottes, ce sont des endroits humides qui leur permettent de rester hydratées. Ce petit animal est très utile et inoffensif malgré la réputation effrayante qu'il peut avoir.





Refrain de la chanson « La chauve-souris », des déménageurs.

Je suis une chauve-souris ri ri
Si tu me vois, souris ri ri
Te sauve pas
Te sauve pas à Paris ri ri
Ou Kinshasa
Reste un peu près de moi ...

Les Grenouilles





Cette année, la classe de GS-CP a travaillé sur les grenouilles. Au mois de mars, nous sommes allés voir à l'étang les grenouilles, ce sont plutôt des crapauds. Il y en avait beaucoup, sur les chemins, dans l'eau. Cet animal peut vivre dans ces deux endroits ; c'est un amphibien.

Les grenouilles sont insectivores et trouvent leur nourriture autour de l'étang. Elles nagent grâce à leur membrane entre leurs doigts et sautent grâce à leurs pattes postérieures très puissantes.




Les grenouilles sont ovipares. Leurs œufs sont mous sans coquille et pondus en grappe. Ensuite le petit, le têtard, se développe : il a une queue puis deux pattes postérieures, deux pattes antérieures, il perd sa queue et devient adulte. Fin avril, nous sommes retournés voir les têtards. Le 28 avril, nous avons participé à la journée « Save the frogs », journée pour la protection des grenouilles avec cette jolie production collective.





La Neuville-en-Hez (60510) - Oiseaux # 1







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
- Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
- Bondrée apivore *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)

Rapaces nocturnes

- Chouette hulotte *Strix aluco* (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)


Colombidés

- Pigeon colombin *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Autres

- Martin-pêcheur *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758)

La Neuville-en-Hez (60510) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

La Neuville-en-Hez (60510) - Flore # 1





Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amaryllidacées

- Ail maraîcher *Allium oleraceum* (L., 1753)
- Ail des ours *Allium ursinum* (L., 1753)

Apocynacées

- Dompte-venin *Vincetoxicum hirundinaria* (Medik., 1790)

Asparagacées

- Dame-d'onze-heures *Ornithogalum umbellatum* (L., 1753)
- Sceau-de-Salomon odorant *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906
- Fragon piquant *Ruscus aculeatus* (L., 1753)

Astéracées

- Inule saulière *Inula salicina* (L., 1753)

Boraginacées

- Grémil pourpre bleu *Buglossoides purpurocaerulea* (L.) I.M.Johnst., 1954
- Grémil officinal *Lithospermum officinale* (L., 1753)
- Myosotis des forêts *Myosotis sylvatica* (Hoffm., 1791)

Brassicacées

- Arabette hérissée *Arabis hirsuta* (L.) Scop., 1772
- Cardamine impatiente *Cardamine impatiens* (L., 1753)

Caprifoliacées

- Succise des près *Succisa pratensis* (Moench, 1794)

La Neuville-en-Hez (60510) - Flore # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Caryophyllacées

- Nielle des blés — *Agrostemma githago* (L., 1753)
- Œillet armérie — *Dianthus armeria* (L., 1753)

Crassulacées

- Orpin téléphium — *Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba, 1977

Cypéracées

- Laîche digitée — *Carex digitata* (L., 1753)
- Laîche jaune — *Carex flava* (L., 1753)
- Laîche écailleuse — *Carex lepidocarpa* (Tausch, 1834)
- Laîche pâlissante — *Carex pallescens* (L., 1753)
- Laîche à pilules — *Carex pilulifera* (L., 1753) subsp. *pilulifera*
- Laîche tomenteuse — *Carex tomentosa* (L., 1767)

Cystacées

- Hélianthème nummulaire — *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., 1768

Équisétacées

- Prêle d'hiver — *Equisetum hyemale* (L., 1753)

Éricacées

- Callune commune — *Calluna vulgaris* (L.) Hull, 1808
- Myrtille — *Vaccinium myrtillus* (L., 1753)

Gentianacées

- Érythrée petite-centaurée — *Centaurium erythraea* (Rafn, 1800)


Hypéricacées

- Millepertuis couché — *Hypericum humifusum* (L., 1753)
- Millepertuis des montagnes — *Hypericum montanum* (L., 1755)
- Millepertuis élégant — *Hypericum pulchrum* (L., 1753)

Fagacées

- Chêne pubescent — *Quercus pubescens* (Willd., 1796)

La Neuville-en-Hez (60510) - Flore # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Joncacées

- Jonc à fleurs aiguës — *Juncus acutiflorus* (Ehrh. ex Hoffm., 1791)
- Jonc à fleurs obtuses — *Juncus subnodulosus* (Schrank, 1789)
- Luzule de Forster — *Luzula forsteri* (Sm.) DC., 1806

Lamiacées

- Bétoine officinale — *Betonica officinalis* (L., 1753)
- Mélitte à feuilles de mélisse — *Melittis melissophyllum* (L., 1753)

Orchidées

- Orchis pyramidal — *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817
- Orchis de Fuchs — *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, 1962
- Néottie nid-d'oiseau — *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817
- Ophrys abeille — *Ophrys apifera* (Huds., 1762)


Orobanchacées

- Euphraise raide — *Euphrasia stricta* (D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809)
- Mélampyre des champs — *Melampyrum arvense* (L., 1753)
- Mélampyre des prés — *Melampyrum pratense* (L., 1753)

Plantaginacées

- Digitale jaune — *Digitalis lutea* (L., 1753)
- Digitale pourpre — *Digitalis purpurea* (L., 1753)
- Digitale pourpre — *Digitalis purpurea* (L., 1753) subsp. *purpurea*

La Neuville-en-Hez (60510) - Flore # 4







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Poacées

- Canche flexueuse — *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, 1838 subsp. *flexuosa*
- Mélique penchée — *Melica nutans* (L., 1753)
- Molinie bleue — *Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794
- Molinie bleue — *Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794 subsp. *caerulea*

Polygacées

- Polygale du calcaire — *Polygala calcarea* (F.W.Schultz, 1837)
- Polygale commun — *Polygala vulgaris* (L., 1753)

Primulacées

- Samole de Valérand — *Samolus valerandi* (L., 1753)

Renonculacées

- Ancolie des Alpes — *Aquilegia alpina* (L., 1753)
- Ancolie commune — *Aquilegia vulgaris* (L., 1753) subsp. *vulgaris*
- Hellébore fétide — *Helleborus foetidus* (L., 1753)

Rosacées

- Potentille printanière — *Potentilla verna* (L., 1753)
- Merisier à grappes — *Prunus padus* (L., 1753)
- Sorbier alisier — *Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017

Solanacées

- Belladone — *Atropa belladonna* (L., 1753)

Taxacées

- If commun — *Taxus baccata* (L., 1753)

Thymélacées


- Daphne laureola L., 1753

Aracées

- Gouet d'Italie — *Arum italicum* (Mill., 1768)

La Neuville-en-Hez (60510) - Chauve-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817) Murin de Brandt *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) Murin d'Alcathoe *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Natterer *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl *Pipistrellus kuhlii* (Natterer *in* Kuhl, 1817)
- Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Oreillard roux *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
- Oreillard gris *Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)

La Neuville-en-Hez (60510) - Amphibiens, serpents et lézards, criquets et grillons, insectes et mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Serpents

- Coronelle lisse *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768)
- Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)

Lézards

- Lézard des murailles *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)

Coléoptères

- Lucane cerf-volant *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)
- Lucane cerf-volant *Lucanus cervus cervus* (Linnaeus, 1758)

Micromammifères

- Muscardin *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758)


Criquets et grillons

- Grillon des bois *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)
- Œdipode turquoise *Oedipoda coerulescens* (Linnaeus, 1758)


Amphibiens

- Grenouille agile *Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)
- Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758)
- Triton palmé *Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)
- Grenouille rousse *Rana temporaria* (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



La Neuville-en-Hez (60510) - Habitats naturels et semi-naturels







Limites administratives

- Limite communale


Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes


Habitats naturels et semi-naturels

- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties


Oiseaux


Laversines (60510) - Oiseaux
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Laversines
les Égarites
Nerfélu
les Grouettes
la Terre Boileau
Saint-Martin
Saint-Germain
Fresnoy
la Fosse Guilin
0
1
2 km
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Passereaux
Alouette des champs
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Hirondelle de cheminée
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Bruant proyer
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Bruant jaune
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
Tarier pâtre
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
Rapaces diurnes
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Milan noir
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Rapaces nocturnes
Chouette effraie
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Autres
Martin-pêcheur
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Grande Aigrette
Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Vanneau huppé
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)


Autres espèces patrimoniales



Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Laversines (60510) - Habitats naturels et semi-naturels




Le Fay-Saint-Quentin

Oiseaux



Le Fay-Saint-Quentin (60510) - Flore et amphibiens







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Flore

Salicacées


- Saule gris cendré foncé
  Salix atrocinerea (Brot., 1804)

Amphibiens


Crapauds


- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Le Fay-Saint-Quentin (60510) - Habitats naturels et semi-naturels






Limites administratives
- Limite communale

Infrastructures de transport
- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes


Habitats naturels et semi-naturels
- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties

Litz

Oiseaux



Litz (60510) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)


Colombidés

- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)




Autres espèces patrimoniales

Litz (60510) - Autres espèces patrimoniales







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amphibiens

- Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
- Crapaud commun *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)
- Grenouille agile *Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)

Reptiles

- Lézard des murailles *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)
- Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)

Insectes

Demoiselles

- Caloptéryx vierge *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)

Coléoptères

- Lucane cerf-volant *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

Mammifères

Mustélidés

- Martre des pins *Martes martes* (Linnaeus, 1758)

Chauves-souris

- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Pipistrelle pygmée *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825)
- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)


Mollusque


Moules d'eau douce

- Anodonte des étangs *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758)



Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Litz (60510) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Litz
les Hièbles
la Guisseline
le Bosquet Lipus
0
1
2 km
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
FONDS VERT

Espèces patrimoniales

Nivillers (60510) - Espèces patrimoniales











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Grenouilles et crapauds

- Alyte accoucheur *Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768)
- Grenouille agile *Rana dalmatinain* Bonaparte, 1838)

Flore

- Dompte-venin *Vincetoxicum hirundinaria* (Medik., 1790)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol Philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Grive litorne *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)


Rapaces diurnes

- Busard cendré *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)
- Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)


Autres oiseaux

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Nivillers (60510) - Habitats naturels et semi-naturels



Rémérangles


Oiseaux




Rémérangles (60510) - Habitats naturels et semi-naturels
Chemin des Haguenets
le Moulin
la Valliette
le Champ Poudreux
les Pruniers
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Rémérangles
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties

Oiseaux

Tillé (60000) - Oiseaux # 1





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Tillé (60000) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
- Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
- Busard cendré *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)
- Faucon hobereau *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)
- Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)

Rapaces nocturnes

- Hibou des marais *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)
- Hibou moyen-duc *Asio otus* (Linnaeus, 1758)
- Chouette chevêche *Athene noctua* (Scopoli, 1769)
- Chouette hulotte *Strix aluco* (Linnaeus, 1758)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux


- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
- Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Flore

Les données de flore ne sont pas précisément géolocalisées pour cette commune. Un tableau présentant les espèces d'intérêt patrimonial qui y ont été identifiées ces cinq dernières années est donc proposé. Les statuts de protection et de conservation à propos de ces espèces apparaissent, le cas échéant, dans le tableau de synthèse des espèces floristiques du secteur du plateau picard sud auquel appartient Tillé. Une espèce particulière à enjeux de conservation est présente dans l'enceinte de l'aéroport : il s'agit du Millepertuis des marais *Hypericum elodes* (L., 1759), plante menacée et protégée dans le Beauvaisis. Cette espèce n'a jamais été répertoriée dans aucun autre secteur ou même commune du territoire, selon les données récoltées ces cinq dernières années. Un fait notable ! On note également la présence – fortuite ? – dans la commune d'une espèce originaire d'Italie en danger critique d'extinction au niveau européen mais non considérée comme patrimoniale.

Espèce		**Famille**	**Localisation approximative**
Centaurea nigra (L., 1753)	Centaurée noire	Astéracées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Scabiosa columbaria (L., 1753)	Scabieuse colombaire	Caprifoliacées	Zone d'activité rue du Moulin
Sedum album (L., 1753)	Orpin blanc	Crassulacées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Sedum sexangulare (L., 1753)	Orpin à six angles	Crassulacées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	Fabacées	Zone d'activité rue du Moulin
Ononis spinosa (L., 1753)	Bugrane épineuse	Fabacées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Hypericum elodes (L., 1759)	Millepertuis des marais	Hypéricacées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Althaea officinalis (L., 1753)	Guimauve sauvage	Malvacées	Zone d'activité rue du Moulin
Malva alcea (L., 1753)	Mauve alcée	Malvacées	Zone d'activité rue du Moulin
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817	Orchis pyramida	Orchidées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906	Elléborine blanche	Orchidées	Zone d'activité rue du Moulin
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc	Orchidées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau	Orchidées	Zone d'activité rue du Moulin
Ophrys apifera (Huds., 1762)	Ophrys abeille	Orchidées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Polygala calcarea (F.W. Schultz, 1837)	Polygale du calcaire	Polygalacées	Zone d'activité rue du Moulin
Rumex acetosella (L., 1753)	Patience petite-oseille	Polygonacées	Dans l'enceinte de l'aéroport
Delphinium elatum (L., 1753)	Dauphinelle élevée	Renonculacées	Rue des Sorbiers
Ficaria verna (Huds., 1762)	Ficaire printanière	Renonculacées	Dans l'enceinte de l'aéroport

Tillé (60000) - Habitats naturels et semi-naturels





Limites administratives

- Limite communale

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes

Habitats naturels et semi-naturels


- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties

Velennes

Oiseaux



Velennes (60510) - Flore et mammifères







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Mammifères

Chauves-souris

- Murin à oreilles échancrées
  Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)

Flore


Rosacées

- Poirier commun
  Pyrus communis (L., 1753)


Orchidées

- Ophrys abeille
  Ophrys apifera (Huds., 1762)
- Orchis pyramidal
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Richesse spécifique du plateau picard sud




Trame verte et bleue - Corridor multri-trames de la Laversines et boisements
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Nivillers
Velennes
Lafraye
Fouquerolles
Laversines
Rochy-Condé
Limites administratives
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Limites communales
Altitude
Courbes de niveau (isopléthes d'altitude)
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Occupation du sol
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Cours d'eau
Cours d'Eau 01 des Groucettes
la Laversines
le Thérain
Mont de Bourguillemont
0
1
2 km
Éléments de continuité écologique
Éléments de restauration des continuités écologiques
Haies à restaurer
Zone de restauration des continuités écologiques
Ruptures de continuité écologique
Ruptures linéaires
Ruptures ponctuelles
Réservoirs de biodiversité secondaires
Réservoirs secondaires avérés
Réservoirs secondaires potentiels
Localisation d'espèces patrimoniales ou à enjeux de conservations (2020-2025)
Oiseaux
Martin-pêcheur
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Pic épeiche
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Bruant proyer
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Bruant jaune
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)
Pic vert
Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Tarier pâtre
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Chouette hulotte
Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Fauvette des jardins
Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Amphibiens
Alyte accoucheur
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Grenouille agile
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)
Libellules et demoiselles
Calopteryx vierge
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Gomphe à forceps
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Mammifères
Chauves-souris

Zonages réglementaires et autres sites d’intérêt écologique du plateau picard sud




Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) par M. Philippe Sergeur



Thérain- Avelon


Situé entre la vallée du Thérain, l'Avelon et les hauts de Bray, le secteur du Thérain-Avelon compte 9 661 habitants répartis sur 10 communes pour une surface d'environ 90 km² (16,5% du territoire intercommunal). Les communes concernées par ce découpage territorial repris du plan local d'urbanisme intercommunal sont les suivantes :

- Fouquenies ;
- Herchies ;
- Le Mont-Saint-Adrien ;
- Milly-sur-Thérain ;
- Pierrefitte-en-Beauvaisis ;
- Rainvillers ;
- Saint-Germain-la-Poterie ;
- Saint-Paul ;
- Savignies ;
- Troissereux.




En termes d'occupation du sol, ce secteur présente une couverture forestière nettement plus importante que les deux secteurs du plateau picard traités précédemment. Presque 34 % du territoire est concerné par un habitat forestier soit 30 km² environ. Cela s'explique notamment par la présence de deux entités forestières relativement importante en termes de surface que sont le Massif forestier du Haut Bray de l'Oise, classé site Natura 2000 et s'étendant sur 4 communes du secteur (Savignies, Saint-Paul, Saint-Germain-la-Poterie, Pierrefitte-en-Beauvaisis) ainsi qu'une bonne partie de la forêt domaniale du Parc Saint-Quentin, à cheval sur 2 communes du secteur (Le Mont-Saint-Adrien et Fouquenies).

Les habitats cultivés représentent quant à eux 42,8 % du territoire du secteur avec environ 38,4 km². Les milieux ouverts occupent une surface plus importante que dans les secteurs du plateau picard avec environ 12,3 km² soit 13,7 % de la couverture du territoire concerné. Les surfaces bâties représentent en tout 6,5 % du territoire du secteur avec environ 5,9 km². Le reste de l'occupation du sol concerne des modes d'occupation du sol beaucoup plus négligeables. Les zones humides, qui peuvent se localiser au sein d'entités forestières ou d'espaces cultivés (critère non cumulatif), représentent environ 5 % du territoire. La présence du Thérain et de nombre de ses affluents – notamment l'Avelon – tend à augmenter cette valeur par rapport aux secteurs picards par exemple. On nota également la présence de plans d'eau artificiels qui favorisent une biodiversité aquatique. 98 mares y ont été recensées en 2024. Ce secteur semble donc un plus équilibré en termes d'habitats naturels et semi-naturels présents, propice au développement d'espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation variées.



N.B. : les données concernant les zones humides proviennent d'un autre jeu de données que celui utilisé pour les autres habitats. Les zones humides peuvent donc chevaucher un habitat forestier, ouvert ou cultivé (critère non cumulatif).



Ainsi, 10 espèces d'amphibiens ont été recensées entre 2020 et 2025 soit un peu plus des deux tiers des 14 espèces présentes dans le Beauvaisis à l'heure actuelle. Parmi elles, 9 espèces patrimoniales ont été identifiées dont la vulnérable Rainette verte *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758), fort enjeu de conservation dans le Beauvaisis. Cela représente environ les deux tiers des espèces présentes dans le Beauvaisis. Au contraire, 6 espèces d'amphibiens ont été recensées dans le secteur du plateau picard sud qui abrite pourtant les marais de Bresles et de Litz, véritables points chauds de biodiversité de l'agglomération.

Chez les poissons, on retrouve notamment des espèces considérées comme patrimoniales telles que l'Anguille européenne *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758) - au bord de l'extinction mondiale - la Lamproie de planer *Lampetra planeri* (Bloch, 1784) ou encore la Truite commune *Salmo trutta* (Linnaeus, 1758). Ces espèces sont également indicatrices d'une continuité écologique fonctionnelle, ce qui est de bon augure pour cette partie du territoire.

Parmi les 185 espèces d'oiseaux observées dans ce secteur ces 5 dernières années - aussi bien nicheuses que non nicheuses - 99 espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation ont été recensées contre 47 pour le plateau picard nord et 64 pour le plateau picard sud. Les espèces qui gonflent les chiffres du secteur Thérain-Avelon concernant notamment des oiseaux d'eau du genre *Anas* ou *Spatula*. On pense notamment aux très menacées Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (Linnaeus, 1758) et Sarcelle d'été *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758). Des échassiers limicoles à forts enjeux de conservation sont également présents grâce à l'existence de ces zones humides favorables comme la vulnérable Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758) ou les très menacés Courlis cendré *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) et Échasse blanche *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) en tant que nicheurs.

À propos des lépidoptères, 43 espèces ont été recensées au total et figurent parmi elles 16 espèces de papillons et 1 espèce de zygènes d'intérêt patrimonial. La moitié est menacée et seules deux espèces sont classées en préoccupation mineure au niveau local. Il s'agit donc d'un taxon à forts enjeux de conservation pour ce secteur.

33 odonates y ont été répertoriés ces cinq dernières années soit un peu plus que la moitié des espèces connues de Picardie. Sur ces 33 espèces, un tiers est considéré patrimonial. Le nombre d'odonates est peu ou prou équivalent à celui du plateau picard sud – qui, nous le rappelons, comporte des zones humides intéressantes dans sa partie sud - mais ne concerne pas la même communauté d'espèces avec la localisation notable de l'Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840) à Milly-sur-Thérain en 2024.

Pour les mammifères, 18 espèces de chauves-souris ont été recensées, presque la totalité des 21 espèces de Picardie[5]. Par rapport aux secteurs précédemment traités, on observe la présence notable du menacé Grand Rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* ainsi que sa sous-espèce *Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreber, 1774)*.

Parmi les 26 espèces d'orthoptères observées dans ce secteur ces cinq dernières années, 7 espèces d'intérêt patrimonial y sont présentes. L'identification du peu commun et menacé Conocéphale des roseaux *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804) dans les zones humides de Rainvillers est à souligner tout particulièrement. En plus d'une Vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) inventoriée non loin du criquet, certaines zones humides de Rainvillers semblent abriter un cortège d'espèces patrimoniales et menacées non négligeable.

Enfin, 326 espèces et sous-espèces de flore vasculaire, de bryophytes et de fougères ont été recensées dans ce secteur selon les données disponibles. 67 espèces patrimoniales ont été identifiées dont certaines présentent des enjeux de conservation certains au niveau local comme la Mélitte à feuilles de mélisse *Melittis melissophyllum* L., 1753, classée « en danger » dans les Hauts-de-France ou encore les vulnérables Géranium sanguin *Geranium sanguineum* (L., 1753) ou Osmonde royale *Osmunda regalis* (L., 1753), fougère d'intérêt communautaire et protégée.

[5] Liste rouge des chiroptères en Picardie – Picardie Nature (2017)



Osmonde royale *Osmunda regalis* (L., 1753), une fougère menacée et protégée dans le Beauvaisis dont l'état actuel des connaissances ne la localise que dans le secteur Thérain-Avrelon, plus particulièrement dans le Massif forestier du Haut Bray de l'Oise



Conocéphale des Roseaux *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), criquet classé « vulnérable » en Hauts-de-France et donc menacé dans le Beauvaisis. Sa découverte dans les zones humides de Rainvillers est donc plutôt de bon augure pour le secteur !

Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans le secteur Thérain-Avelon

Tableau 15 - Mammifères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)**	Sérotine commune	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Martes martes* (Linnaeus, 1758)**	Martre	NT	LC	LC	X			AC
***Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)**	Murin d'Alcathoe	DD	LC	NT		Art. 2	An. IV	-
***Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Bechstein	VU	NT	VU	X	Art. 2	An. IV	PC
***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Daubenton	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	C
***Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)**	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)**	Grand Murin	EN	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)**	Murin à moustaches	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)**	Murin de Brandt	DD	LC	LC		Art. 2	An. IV	-
***Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)**	Murin de Natterer	LC	LC	LC		Art. 2	An. IV	AC
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**	Noctule de Leisler	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AR
***Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)**	Noctule commune	VU	VU	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)**	Pipistrelle de Kuhl	DD	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	-
***Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)**	Pipistrelle de Nathusius	NT	LC	LC		Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)**	Pipistrelle commune	LC	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	TC
***Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)**	Oreillard roux	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)**	Oreillard gris	DD	LC	NT	X	Art. 2	An. IV	-
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV & II	AC
Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV & II	AC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection : Article 2
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 16 - Amphibiens d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
Alytes obstetricans **(Laurenti, 1768)**	Alyte accoucheur	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
Bufo bufo **(Linnaeus, 1758)**	Crapaud commun	LC	LC	LC		Art. 3		C
Hyla arborea **(Linnaeus, 1758)**	Rainette verte	VU	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
Ichthyosaura alpestris **(Laurenti, 1768)**	Triton alpestre	LC	LC	LC		Art. 3		AC
Lissotriton helveticus **(Razoumowsky, 1789)**	Triton palmé	LC	LC	LC		Art. 3		AC
Pelophylax lessonae **(Camerano, 1882)**	Grenouille de Lessona	DD	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	?
Rana dalmatina **(Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)**	Grenouille agile	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
Rana temporaria **(Linnaeus, 1758)**	Grenouille rousse	LC	LC	?		Art. 4	An. V	C
Salamandra salamandra **(Linnaeus, 1758)**	Salamandre tachetée	NT	LC	VU	X	Art. 3		PC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 17 - Poissons et apparentés d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain [1]	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée [4]
Anguilla anguilla **(Linnaeus, 1758)**	Anguille européenne	?	CR	CR	X	
Lampetra planeri **(Bloch, 1784)**	Lamproie de Planer	?	LC	LC	X	Art.1
Salmo trutta **(Linnaeus, 1758)**	Truite commune	?	LC	LC		Art.1

[1] Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national

Tableau 18 - Reptiles d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]
***Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)**	Orvet fragile	LC	LC	LC		Art. 3	
***Coronella austriaca* (Laurenti, 1768)**	Coronelle lisse	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
***Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)**	Couleuvre à collier	LC	LC	LC	X	Art. 2	
***Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)**	Lézard des murailles	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
Vipera berus (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	EN	VU	LC	X	Art. 2	
***Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)**	Lézard vivipare	LC	LC	LC		Art. 3	

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : articles 2 & 3
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe IV

Tableau 19 - Odonates d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X			C
***Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840)**	Agrion de Mercure	VU	LC	?	X	Art.3	An. II	AR
***Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825)**	Agrion joli	NT	VU	LC	X			PC
***Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842)**	Agrion mignon	LC	LC	LC	X			PC
***Erythromma lindenii* (Selys-Longchamps, 1840)**	Agrion de Vander Linden	LC	LC	LC	X			PC
***Lestes barbarus* (Fabricius, 1798)**	Leste sauvage	NT	LC	LC	X			AR
***Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837)**	Orthétrum brun	LC	LC	LC	X			PC
***Oxygastra curtisii* (Dale, 1834)**	Cordulie à corps fin	NT	LC	NT	X	Art. 2	An. II & IV	AR
***Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)**	Leste brun	LC	LC	LC	X			AC
***Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840)**	Sympétrum de Fonscolombe	LC	LC	LC	X			AR

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des libellules et demoiselles de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe II
[7] Picardie Nature (2024)

Tableau 20 - Orthoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée	Indice de rareté [4]
***Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)**	Criquet marginé	LC	NE	LC	X		AR
***Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804)**	Conocéphale des Roseaux	VU	NE	LC	X		PC
***Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)**	Grillon des bois	LC	NE	LC			C
***Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)**	Œdipode turquoise	LC	NE	LC	X		AR
***Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)**	Criquet noir-ébène	NT	NE	LC	X		PC
***Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796)**	Criquet de la Palène	NT	NE	LC	X		AC
***Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)**	Decticelle carroyée	LC	NE	LC	X		R

[1] Liste des espèces d'odonates de Picardie avec statuts de rareté et de menace - mise à jour 06/12/13 (Picardie Nature - https://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/Liste_espece_et_statuts_061213.pdf)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Picardie Nature (2024)
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 21 – Coléoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [1]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [2]	Directive Habitats-Faune-Flore [3]
***Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)**	Lucane cerf-volant	NE	NE	NT	X	An. II

[1] Liste rouge européenne des espèces menacées
[2] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[3] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe II

Tableau 22 - Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]
***Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Petit Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Apatura iris* (Linnaeus, 1758)**	Grand Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)**	Gazé	EN	LC	LC	X	
***Arctia villica* (Linnaeus, 1758)**	Écaille fermière	?	?	?	X	
***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Collier-de-Corail	LC	LC	LC		
***Colias alfacariensis* (Ribbe, 1905)**	Fluoré	NT	LC	LC	X	
***Cupido minimus* (Fuessly, 1775)**	Argus frêle	NT	LC	LC		
***Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)**	Point de Hongrie	NT	LC	LC		
***Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)**	Damier de la Succise	EN	LC	LC	X	Art.3
***Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758)**	Lucine	EN	LC	LC	X	
***Jordanita globulariae* (Hübner, 1793)**	Procris des Centaurées	EN	?	?	X	
***Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)**	Mégère	NT	LC	LC	X	
***Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775)**	Azuré bleu-céleste	NT	LC	LC	X	
***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**	Demi-Deuil	LC	LC	LC		
***Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)**	Grande Tortue	NT	LC	LC		
***Speyeria aglaja* (Linnaeus, 1758)**	Grand Nacré	EN	LC	LC		
***Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Zygène du Lotier	VU	?	?	X	

[1] Liste rouge des papillons de jour des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : article 3

Tableau 23 - Flore d'intérêt patrimonial recensée dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		Famille	État de conservation régional[1]	État de conservation métropolitain[2]	État de conservation européen[3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie[4]	Directive Habitat-Faune-Flore[5]	Espèce réglementée[6]
***Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis* (L.) Rich., 1817**	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris* (L., 1753)**	Ancolie commune	Renonculacées	LC	LC	DD	X		
***Arum italicum* (Mill., 1768)**	Gouet d'Italie	Aracées	NA	LC	?	X		
***Astragalus glycyphyllos* (L., 1753)**	Réglisse sauvage	Fabacées	LC	LC	LC	X		
***Blechnum spicant* (L.) Roth, 1794**	Blechne en épi	Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes	LC	LC	LC	X		
***Buxus sempervirens* (L., 1753)**	Buis sempervirent	Buxacées	LC	LC	LC	X		
***Caltha palustris* (L., 1753)**	Populage des marais	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Campanula glomerata* (L., 1753)**	Campanule agglomérée	Campanulacées	LC	LC	?	X		
***Campanula persicifolia* (L., 1753)**	Bâton-de-Jacob	Campanulacées	NT	LC	?	X		
***Cardamine amara subsp. amara* (L., 1753)**	Cardamine amère	Brassicacées	LC	LC	LC	X		
***Carex caryophyllea* (Latourr., 1785)**	Laîche caryophyllée	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex leporina* (L., 1753)**	Laîche patte-de-lièvre	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex panicea* (L., 1753)**	Laîche panic	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex pilulifera subsp. pilulifera* (L., 1753)**	Laîche à pilules	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, 1962**	Orchis de Fuchs	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, 1962**	Orchis tacheté	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Dactylorhiza praetermissa var. praetermissa* (Druce) Soó, 1962**	Orchis négligé	Orchidées	LC	NT	?	X		Art.1 P.
***Digitalis lutea* (L., 1753)**	Digitale jaune	Plantaginacées	LC	LC	?	X		
***Digitalis purpurea* (L., 1753)**	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X		
***Digitalis purpurea var. purpurea* (L., 1753)**	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X		
***Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser, 1809**	Helléborine rouge	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769**	Helléborine	Orchidées	LC	LC	LC			
***Ficaria verna* (Huds., 1762)**	Ficaire printanière	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Ficaria verna subsp. verna* (Huds., 1762)**	Ficaire printanière	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Galium palustre* (L., 1753)**	Gaillet des marais	Rubiacées	LC	LC	?	X		
***Galium pumilum* (Murray, 1770)**	Gaillet nain	Rubiacées	LC	LC	?	X		
***Genista tinctoria* (L., 1753)**	Genêt des teinturiers	Fabacées	LC	LC	?	X		
***Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912**	Gentiane d'Allemagne	Gentianacées	NT	LC	?	X		
***Geranium sanguineum* (L., 1753)**	Géranium sanguin	Géraniacées	VU	LC	LC	X		Art.1 P.

[1] Liste rouge de la flore vasculaire et des bryophytes des Hauts-de-France (2019)
[2] Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe IV
[6] Liste des espèces végétales protégées en région Picardie : article 1
[6] Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : article 1

***Geum rivale* (L., 1753)**	Benoîte des ruisseaux	Rosacées	LC	LC	?	X	
***Helianthemum nummularium* (L.) Mill., 1768**	Hélianthème nummulaire	Cistacées	LC	LC	?	X	
***Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826**	Orchis bouc	Orchidées	LC	LC	LC	X	
***Iberis amara* (L., 1753)**	Ibéris amer	Brassicaceae	LC	LC	?	X	
***Jacobaea maritima* (L.) Pelser & Meijden, 2005**	Séneçon cinéraire	Astéracées	NA	LC			
***Juncus acutiflorus* (Ehrh. ex Hoffm., 1791)**	Jonc à fleurs aiguës	Joncacées	LC	LC	LC	X	
***Juncus subnodulosus* (Schrank, 1789)**	Jonc à fleurs obtuses	Joncacées	LC	LC	LC	X	
***Luzula multiflora subsp. multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811**	Luzule multiflore	Joncacées	LC	LC	?	X	
***Melampyrum arvense* (L., 1753)**	Mélampyre des champs	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
***Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum* (L., 1753)**	Mélitte à feuilles de mélisse	Lamiacées	EN	LC	?	X	
***Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794**	Molinie bleue	Poacées	LC	LC	?	X	
***Molinia caerulea subsp. caerulea* (L.) Moench, 1794**	Molinie bleue	Poacées	LC	LC	?	X	
***Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817**	Néottie nid-d'oiseau	Orchidées	LC	LC	LC	X	
***Ophrys apifera* (Huds., 1762)**	Ophrys abeille	Orchidées	LC	LC	LC		
***Orchis mascula* (L.) L., 1755**	Orchis mâle	Orchidées	LC	LC	LC	X	
***Orchis purpurea* (Huds., 1762)**	Orchis pourpre	Orchidées	LC	LC	LC		
***Osmunda regalis* (L., 1753)**	Osmonde royale	Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes	VU	LC	LC	X	Art.1 P.
***Polygala calcarea* (F.W. Schultz, 1837)**	Polygale du calcaire	Polygalacées	LC	LC	LC	X	
***Polygonatum multiflorum* (L.) All., 1785**	Sceau-de-Salomon multiflore	Asparagacées	LC	LC	?		
***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906**	Sceau-de-Salomon odorant	Asparagacées	LC	LC	LC	X	
***Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799**	Polystic à aiguillons	Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes	LC	LC	?		
***Potamogeton trichoides* (Cham. & Schltdl., 1827)**	Potamot capillaire	Potamogétonacées	LC	LC	LC	X	Art.1 P.
***Potentilla verna* (L., 1753)**	Potentille printanière	Rosacées	LC	LC	?	X	
***Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768)**	Anémone pulsatille	Renonculacées	NT	LC	NT	X	
***Pyrus communis* (L., 1753)**	Poirier commun	Rosacées	LC	LC	LC	X	
***Ribes nigrum* (L., 1753)**	Groseillier noir	Grossulariacées	LC	LC	LC	X	
***Salix atrocinerea* (Brot., 1804)**	Saule gris cendré foncé	Salicacées	LC	LC	LC	X	
***Salvia pratensis* (L., 1753)**	Sauge des prés	Lamiacées	LC	LC	?	X	
***Saxifraga granulata* (L., 1753)**	Saxifrage granulée	Saxifragacées	NT	LC	?	X	
***Scabiosa columbaria* (L., 1753)**	Scabieuse colombaire	Caprifoliacées	LC	LC	?	X	
***Stachys alpina* (L., 1753)**	Épiaire des Alpes	Lamiacées	LC	LC	?	X	
***Succisa pratensis* (Moench, 1794)**	Succise des prés	Caprifoliacées	LC	LC	?		
***Taxus baccata* (L., 1753)**	If commun	Taxacées	LC	LC	LC	X	
***Teucrium chamaedrys* (L., 1753)**	Germandrée petit-chêne	Lamiacées	LC	LC	LC	X	
***Teucrium chamaedrys subsp. germanicum* (F.Herm.) Rech.f., 1941**	Germandrée petit-chêne	Lamiacées	LC	LC	LC	X	
***Teucrium montanum* (L., 1753)**	Germandrée des montagnes		LC	LC	LC	X	Art.1 P.
***Vaccinium myrtillus* (L., 1753)**	Myrtille	Ericacées	NT	LC	LC	X	
***Vincetoxicum hirundinaria* (Medik., 1790)**	Dompte-venin	Apocynacées	LC	LC	?	X	

Tableau 24 – Avifaune d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Thérain-Avelon » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional*	État de conservation métropolitain*	État de conservation européen*	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie**	Directive oiseaux ***	Espèce réglementée ****	Tendance des populations nicheuses métropolitaines
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	NA	VU	LC	X		Art. 3	NC
Acanthis flammea caberet (Muller, 1776)	Sizerin cabaret	NA					Art. 3	NC
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	EN	LC	LC	X		Art. 3 & 6	=
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	LC	LC	LC			Art. 3 & 6	?
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	Rousserole effarvatte	NT	LC	LC			Art. 3	=
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)	Alouette des champs	VU	NT	LC	X		Art. 3	↘
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur	VU	VU	LC	X	An. I	Art. 3	?
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NA	LC	NT				↘
Anas acuta (Linnaeus, 1758)	Canard pilet	NA	NA	VU	X		Art. 3	NC
Anas crecca (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'hiver	CR	VU	LC	X		Art. 3	?
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	EN	VU	LC	X		Art. 3	↘
Apus apus (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC	NT	NT	X		Art. 3	?
Ardea alba (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Asio otus (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC			Art. 3	?
Athene noctua (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche	NT	LC	LC	X		Art. 3	=
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	EN	VU	VU	X		Art. 3	?
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	VU	LC	NT	X		Art. 3	↗
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)	Pique boeufs	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)	Œdicnème criard	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	?
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	NT	VU	LC	X		Art. 3	=
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)	Grimpereau des bois	VU	LC	LC	X		Art. 3	↗
Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	LC	NT	LC	X		Art. 3	=
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	EN	EN	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	=
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	EN	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Columba oenas Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	LC	LC	LC	X		Art. 3	↗
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	VU	LC	NT			Art. 3	↘
Cuculus canorus Linnaeus, 1758	Coucou gris	VU	LC	LC			Art. 3	↘

*Liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France (2024)

*Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)

*Liste rouge européenne des espèces menacées

** List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)

***Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I

****Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3

****Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 6

Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, RE : éteint, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable

En augmentation : ↗

Stable : =

En déclin : ↘

Inconnue : ?

Fluctuant : ↕


Non concerné : NC

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC	LC	LC			Art. 3	↗
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Pic noir	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)	Bruant proyer	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)	Bruant zizi	EN	LC	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	EN	EN	LC	X		Art. 3	↘
Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	Faucon émerillon	NA	NA	VU		An. I	Art. 3	NC
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	VU	?	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
Fulica atra (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	LC	LC	NT	X		Art. 3	=
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	CR	CR	VU	X		Art. 3	↘
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	Échasse blanche	EN	LC	LC	X	An. I	Art. 3	?
Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle de cheminée	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776)	Mouette pygmée	NA	NA	LC		An. I	Art. 3	NC
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)	Torcol fourmilier	CR	LC	LC	X		Art. 3	=
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	NT	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Locustella naevia (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	VU	NA	LC	X		Art. 3	↘
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	CR	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Mareca strepera (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Milan noir	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Milan royal	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)	Bergeronnette des ruisseaux	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Motacilla flava (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Motacilla flava flava (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Netta rufina (Pallas, 1773)	Nette rousse	NA	LC	LC	X		Art. 3	↗
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	CR	VU	NT	X		Art. 3	?
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR	NT	LC	X		Art. 3	=
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	NE	VU	LC		An. I	Art. 3	↗
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Passer montanus (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	CR	EN	LC	X		Art. 3	↘
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	VU	LC	LC				↘
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	EN	LC	LC	X		Art. 3	↗
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	EN	NT	LC	X		Art. 3	=
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Picus viridis (Linnaeus, 1758)	Pic vert	LC	LC	LC			Art. 3	↘
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	Avocette élégante	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	VU	LC	LC			Art. 3	?
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	CR	VU	LC	X		Art. 3	↘
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)	Bécasse des bois	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	Serin cini	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)	Sterne pierregarin	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	EN	VU	VU	X		Art. 3	↘
Strix aluco (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte	LC	LC	LC			Art. 3	?
Sylvia borin (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	VU	NT	LC			Art. 3	↘
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	LC	LC	LC	X		Art. 3	↘
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)	Grive litorne	RE	LC	LC	X		Art. 3	?
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	NT	LC	LC			Art. 3	↘↗
Upupa epops (Linnaeus, 1758)	Huppe fasciée	CR	LC	LC	X		Art. 3	↘
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NT	NT	VU	X		Art. 3	?

Fouquenies

Oiseaux

Fouquenies (60000) - Oiseaux # 1




Fouquenies (60000) - Oiseaux # 2





Étangs / Les Prés des Voleurs









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Échassiers

- Grande Aigrette — *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Pique bœufs — *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne blanche — *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
- Aigrette garzette — *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)
- Échasse blanche — *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
- Avocette élégante — *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux d'eau

- Martin-pêcheur — *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- Canard pilet — *Anas acuta* (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'hiver — *Anas crecca* (Linnaeus, 1758)
- Fuligule milouin — *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
- Fuligule morillon — *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule — *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Mouette mélanocéphale — *Ichthyaetus melanocephalus* (Temminck, 1820)
- Canard chipeau — *Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran — *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe huppé — *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
- Canard souchet — *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'été — *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758)
- Sterne pierregarin — *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe castagneux — *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

Autres oiseaux

- Vanneau huppé — *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Fouquenies (60000) - Oiseaux # 3











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle des rivages *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Motacilla flava Linnaeus, 1758
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Fouquenies (60000) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol
- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport
- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Campanulacées
- Bâton-de-Jacob — *Campanula persicifolia* (L., 1753)

Caprifoliacées
- Scabieuse colombaire — *Scabiosa columbaria* (L., 1753)

Cistacées
- Hélianthème nummulaire — *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., 1768

Fabacées
- Genêt des teinturiers — *Genista tinctoria* (L., 1753)

Lamiacées
- Épiaire des Alpes — *Stachys alpina* (L., 1753)
- Germandrée petit-chêne — *Teucrium chamaedrys* (F.Herm.) Rech.f., 1941 subsp. *germanicum*

Orchidées
- Orchis pyramidal — *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817 var. *pyramidalis*
- Orchis négligé — *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó, 1962 var. *praetermissa*
- Néottie nid-d'oiseau — *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817
- Ophrys abeille — *Ophrys apifera* (Huds., 1762)

Orobanchacées
- Mélampyre des champs — *Melampyrum arvense* (L., 1753)

Plantaginacées
- Digitale jaune — *Digitalis lutea* (L., 1753)

Polygacées
- Polygale du calcaire — *Polygala calcarea* (F.W.Schultz, 1837)

Renonculacées
- Ancolie commune — *Aquilegia vulgaris* (L., 1753) subsp. *vulgaris*

Rubiacées
- Gaillet nain — *Gallum pumilum* (Murray, 1770)

N.B. *Les données situées en forêt domaniale semblent utiliser le centroïde de la commune au vu de la concentration d'espèces partageant différents biotopes. Si elles ne semblent pas témoigner d'une localisation précise, les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*

Fouquenies (60000) - Chauves-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein
  Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées
  Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler
  Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
- Noctule commune
  Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl
  Pipistrellus kuhlii (Natterer *in* Kuhl, 1817)
- Pipistrelle de Nathusius
  Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
- Oreillard roux
  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Fouquenies (60000) - Amphibiens, insectes et reptiles





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amphibiens

Crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Tritons

- Triton alpestre
  Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
- Triton palmé
  Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

Reptiles

Serpents

- Coronelle lisse
  Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
- Couleuvre à collier
  Natrix helvetica (Lacepède, 1789)

Insectes


Papillons

- Petit Mars changeant
  Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)


Demoiselles

- Caloptéryx vierge
  Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Fouquenies (60000) - Habitats naturels et semi-naturels



Herchies

Oiseaux



Herchies (60112) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)

Colombidés

- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Herchies (60112) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Apiacées
- Libanotide des Pyrénées — *Libanotis pyrenaica* (L.) O.Schwarz, 1949

Caprifoliacées
- Scabieuse colombaire — *Scabiosa columbaria* (L., 1753)
- Succise des prés — *Succisa pratensis* (Moench, 1794)

Caryophyllacées
- Digitale jaune — *Digitalis lutea* (L., 1753)

Fabacées
- Genêt des teinturiers — *Genista tinctoria* (L., 1753)

Gentianacées
- Gentiane d'Allemagne — *Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912

Liamacées
- Germandrée petit-chêne — *Teucrium chamaedrys* (L., 1753)
- Germandrée petit-chêne — *Teucrium chamaedrys* (F.Herm.) Rech.f., 1941 subsp. *germanicum*

Orchidées
- Helléborine rouge — *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser, 1809
- Épipactide helléborine — *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769
- Orchis bouc — *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826
- Orchis pourpre — *Orchis purpurea* (Huds., 1762)

Orobanchacées
- Orobanche du panicaut — *Orobanche amethystea* (Thuill., 1799)

Taxacées
- If commun — *Taxus baccata* (L., 1753)

Herchies (60112) - Insectes et mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Mammifères

Chauves-souris

- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus*(Schreber, 1774)

Insectes

Papillons dits « de nuit »

- Écaille fermière *Arctia villica* (Linnaeus, 1758)

Papillons dits « de jours »

- Collier-de-corail *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Argus frêle *Cupido minimus* (Fuessly, 1775)
- Point de Hongrie *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)
- Argus bleu-nacré *Lysandra coridon* (Poda, 1761)
- Demi-Deuil *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)

Zygène


- Zygène du Lotier *Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775)


Criquets

- Criquet noir-ébène *Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)
- Criquet de la Palène *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796)




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Herchies (60112) - Habitats naturels et semi-naturels
le Cornouiller
Montagne de Houssoye
la Haute Borne
0
0,8
1,6 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Herchies
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties

Le Mont-Saint-Adrien

Oiseaux



Le Mont-Saint-Adrien (60650) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux


- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Alouette lulu *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)


Le Mont-Saint-Adrien (60650) - Chauve-souris





Le Mont-Saint-Adrien (60650) - Papillons, criquets et flore





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Papillons

- Petit Mars changeant
  Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Grand Mars changeant
  Apatura iris (Linnaeus, 1758)
- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Criquets

- Criquet marginé
  Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)
- Decticelle carroyée
  Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)


Flore
Plantaginacées


- Digitale pourpre
  Digitalis purpurea (L., 1753)

Géraniacées

- Géranium sanguin
  Geranium sanguineum (L., 1753)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Le Mont-Saint-Adrien (60650) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Le Mont-Saint-Adrien
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
0
1
2 km


Milly-sur-Thérain


Oiseaux



Poissons

Milly-sur-Thérain (60112) - Poissons/lamproies, reptiles et amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Période 2020 - 2025

Poissons et autres

- Loche franche
  Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
- Chabot commun
  Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
- Épinoche à trois épines
  Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758)
- Goujon
  Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
- Perche
  Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)
- Épinochette
  Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation

- Anguille européenne
  Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
- Lamproie de Planer
  Lampetra planeri (Bloch, 1784)
- Truite de mer
  Salmo trutta (Linnaeus, 1758)

Reptiles

Lézards

- Orvet fragile
  Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
- Lézard vivipare
  Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation

- Lézard des murailles
  Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Serpents (espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation)


- Couleuvre à collier
  Natrix helvetica (Lacepède, 1789)

Amphibiens


Grenouilles et crapauds


- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
- Grenouille verte
  Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Milly-sur-Thérain (60112) - Papillons, zygènes et criquets



Milly-sur-Thérain (60112) - Libellules et demoiselles # 1 - Anisoptères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Anisoptères

- Aeschne bleue *Aeshna cyanea* (O.F. Müller, 1764)
- Anax empereur *Anax imperator* (Leach, 1815)
- Anax napolitain *Anax parthenope* (Selys, 1839)
- Leste vert *Chalcolestes viridis* (Vander Linden, 1825)
- Crocothémis écarlate *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832)
- Gomphe joli *Gamphus pulchellus* (Selys, 1840)
- Libellule déprimée *Libellula depressa* (Linnaeus, 1758)
- Libellule fauve *Libellula fulva* (O.F. Müller, 1764)
- Orthétrum réticulé *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758)
- Sympétrum méridional *Sympetrum meridionale* (Selys, 1841)
- Sympétrum sanguin *Sympetrum sanguineum* (O.F. Müller, 1764)
- Sympétrum fascié *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation

- Aeschne affine *Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)
- Orthétrum brun *Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837)
- Leste brun *Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)
- Sympétrum de Fonscolombe *Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840)

Milly-sur-Thérain (60112) - Libellules et demoiselles # 2 - Zygoptères







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Zygoptères

- Caloptéryx éclatant *Calopteryx splendens* (Harris, 1780)
- Agrion jouvencelle *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758)
- Agrion porte-coupe *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840)
- Naïade aux yeux rouges *Erythromma najas* (Hansemann, 1823)
- Naïade au corps vert *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840)
- Agrion élégant *Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820)
- Agrion à larges pattes *Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771)
- Petite nymphe au corps de feu *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation

- Caloptéryx vierge *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)
- Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840)
- Agrion de Vander Linden *Erythromma lindenii* (Selys-Longchamps, 1840)

Milly-sur-Thérain (60112) - Flore patrimoniale







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

N.B. *Les données situées en plaine de Monceaux semblent utiliser le centroïde de la commune au vu de la concentration d'espèces partageant différents biotopes. Si elles ne semblent pas témoigner d'une localisation précise, les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Orchidées

- Orchis pyramidal
  Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis (L.) Rich., 1817
- Épipactide rouge sombre
  Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809
- Orchis pourpre
  Orchis purpurea (Huds., 1762)

Astéracées

- Séneçon cinéraire
  Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005

Aracées

- Gouet d'Italie
  Arum italicum (Mill., 1768=

Apocynacées

- Dompte-venin
  Vincetoxicum hirundinaria (Medik., 1790)

Brassicacées

- Ibéris amer
  Iberis amara (L., 1753)

Caprifoliacées

- Scabieuse colombaire
  Scabiosa columbaria (L., 1753)
- Succise des prés
  Succisa pratensis (Moench, 1794)

Cistacées

- Hélianthème jaune
  Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768

Campanulacées

- Campanule agglomérée
  Campanula glomerata (L., 1753)

Fabacées

- Genêt des teinturiers
  Genista tinctoria (L., 1753)

Gentianacées

- Gentiane d'Allemagne
  Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912

Géraniacées

- Géranium sanguin
  Geranium sanguineum (L., 1753)

Lamiacées

- Germandrée petit-chêne
  Teucrium chamaedrys subsp. germanicum (F.Herm.) Rech.f., 1941
- Germandrée des montagnes
  Teucrium montanum (L., 1753)


Renonculacées


- Anémone pulsatille
  Anemone pulsatilla (L., 1753)

Rosacées

- Benoîte des ruisseaux
  Geum rivale (L., 1753)
- Potentille printanière
  Potentilla verna (L., 1753)

Milly-sur-Thérain (60112) - Chauves-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Grand murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Noctule commune
  Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Habitats naturels et semi-naturels



Oiseaux


Pierrefitte-en-Beauvaisis (60112) - Oiseaux # 1
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Pierrefitte-en-Beauvaisis
le Détroit
le Plouy Louvet
200
150
146
100
0
1
2 km
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Rapaces diurnes
Épervier d'Europe
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Rapaces nocturnes
Hibou moyen-duc
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Pics
Pic vert
Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Échassiers
Grande Aigrette
Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Autres oiseaux
Coucou
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
OFB
FRANCE RELANCE
Cofinancé par l'Union européenne
PICARDIE NATURE
cbn
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL BAILLEUL
Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France
INPN OpenObs
CHASSEURS DE L'OISE
PÊCHE

Pierrefitte-en-Beauvaisis (60112) - Oiseaux # 2









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Grive litorne *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766)

Pierrefitte-en-Beauvaisis (60112) - Amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Tritons

- Triton palmé
  Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Pierrefitte-en-Beauvaisis (60112) - Habitats naturels et semi-naturels
le Détroit
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Pierrefitte-en-Beauvaisis
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
0
1
2 km

Rainvillers

Oiseaux



Rainvillers (60155) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)

Rainvillers (60155) - Oiseaux # 3





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Rainvillers (60155) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol
- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport
- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Campanulacées
- Bâton-de-Jacob *Campanula persicifolia* (L., 1753)

Brassicacées
- Cardamine amère *Cardamine amara* (L., 1753) subsp. *amara*

Buxacées
- Buis commun *Buxus sempervirens* (L., 1753)

Cypéracées
- Laîche printanière *Carex caryophyllea* (Latourr., 1785)
- Laîche bleuâtre *Carex panicea* (L., 1753)
- Laîche à pilules *Carex pilulifera* (L., 1753) subsp. *pilulifera*

Éricacées
- Myrtille *Vaccinium myrtillus* (L., 1753)

Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes
- Struthioptéride en épi *Struthiopteris spicant* (L.) Weiss, 1770
- Polystic à aiguillons *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799

Grossulariacées
- Groseillier noir *Ribes nigrum* (L., 1753)

Joncacées
- Jonc à fleurs obtuses *Juncus subnodulosus* (Schrank, 1789)
- Luzule multiflore *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811 subsp. *multiflora*

Poacées
- Molinie bleue *Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794
- Molinie bleue *Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794 subsp. *caerulea*

Renonculacées
- Populage des marais *Caltha palustris* (L., 1753)

Rubiacées
- Gaillet des marais *Galium palustre* (L., 1753)

Saxifragacées
- Saxifrage granulée *Saxifraga granulata* (L., 1753)

N.B. *Les données situées en bois de Rainvillers ne semblent pas être localisées de manière précise au vu de la concentration d'espèces partageant différents biotopes. Les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*

Rainvillers (60155) - Chauves-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein
  Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler
  Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
- Noctule commune
  Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl
  Pipistrellus kuhlii (Natterer *in* Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
- Oreillard roux
  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
- Grand Rhinolophe
  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rainvillers (60155) - Amphibiens et reptiles





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amphibiens

Grenouilles

- Rainette verte — *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758)
- Grenouille de Lessona — *Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882)
- Grenouille agile — *Rana dalmatina* (Fitzinger in Bonaparte, 1838)

Tritons et salamandres

- Triton alpestre — *Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768)
- Triton palmé — *Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)
- Salamandre tachetée — *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758)

Reptiles

Serpents

- Couleuvre à collier — *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)
- Vipère péliade — *Vipera berus* (Linnaeus, 1758)

Lézards

- Lézard des murailles — *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)
- Lézard vivipare — *Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)

Rainvillers (60155) - Insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Papillons

- Gazé — *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)
- Collier-de-corail — *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Demi-Deuil — *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
- Grande Tortue — *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)

Demoiselles

- Caloptéryx vierge — *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)
- Agrion joli — *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825)
- Agrion mignon — *Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842)
- Leste sauvage — *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798)

Sauterelles


- Conocéphale des roseaux — *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804)

Grillons


- Grillon des bois — *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)

0 1 2 km

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Rainvillers (60155) - Habitats naturels et semi-naturels




Saint-Germain-la-Poterie

Oiseaux



Saint-Germain-la-Poterie (60650) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Saint-Germain-la-Poterie (60650) - Chauves-souris









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein
  Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
- Grand murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Pipistrelle de Kuhl
  Pipistrellus kuhlii (Natterer *in* Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
- Oreillard roux
  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
- Grand rhinolophe
  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Saint-Germain-la-Poterie (60650) - Flore, amphibiens et insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amphibiens

Crapauds

- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Grenouilles

- Grenouille agile
  Rana dalmatina (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)
- Grenouille rousse
  Rana temporaria (Linnaeus, 1758)

Tritons

- Triton palmé
  Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
- Salamandre tachetée
  Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Insectes

Demoiselles

- Calopteryx vierge
  Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Flore


Orchidées

- Orchis mâle
  Orchis mascula (L.) L., 1755


Taxacées

- If commun
  Taxus baccata (L., 1753)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Saint-Germain-la-Poterie (60650) - Habitats naturels et semi-naturels




Saint-Paul

Oiseaux



Saint-Paul (60650) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Pics

- Pic épeiche — *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar — *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir — *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Torcol fourmilier — *Jynx torquilla* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert — *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Échassiers

- Grande Aigrette — *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne blanche — *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne noire — *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)
- Aigrette garzette — *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)

Autres oiseaux d'eau

- Martin-pêcheur — *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule — *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Bécassine des marais / Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
- Courlis cendré / *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran — *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe castagneux — *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)


Colombidés

- Pigeon colombin — *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle turque — *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux

- Martinet noir — *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Coucou — *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise — *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Bécasse des bois — *Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758)
- Huppe fasciée — *Upupa epops* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé — *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Saint-Paul (60650) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Sizerin flammé *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758)
- Sizerin cabaret *Acanthis flammea cabaret* (Muller, 1776)
- Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant zizi *Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
- Alouette lulu *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)

Saint-Paul (60650) - Oiseaux # 4







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Moineau friquet *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Saint-Paul (60650) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Asparagacées

- Sceau-de-Salomon multiflore
  Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Cypéracées

- Laîche patte-de-lièvre
  Carex leporina (L., 1753)

Joncacées

- Jonc à fleurs aiguës
  Juncus acutiflorus (Ehrh. ex Hoffm., 1791)

Orchidées

- Ophrys abeille
  Ophrys apifera (Huds., 1762)

Plantaginacées

- Digitale pourpre
  Digitalis purpurea (L., 1753)

Potamogétonacées

- Potamot capillaire
  Potamogeton trichoides (Cham. & Schltdl., 1827)


Saxifragacées

- Saxifrage granulée
  Saxifraga granulata (L., 1753)

Renonculacées

- Ficaire printanière
  Ficaria verna (Huds., 1762) subsp. *verna*

Saint-Paul (60650) - Mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin d'Alcathoe *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Bechstein *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin de Natterer *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Noctule commune *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl *Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)
- Pipistrelle de Kuhl *Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)
  Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Oreillard roux *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)

Mustélidés

- Martre *Martes martes* (Linnaeus, 1758)

Saint-Paul (60650) - Reptiles et insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Reptiles

Serpents

- Couleuvre à collier — *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)
- Vipère péliade — *Vipera berus* (Linnaeus, 1758)

Lézards

- Lézard vivipare — *Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)

Insectes

Demoiselles

- Caloptéryx vierge — *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)

Coléoptères

- Lucane cerf-volant — *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

Grillons

- Grillon des bois — *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)


Criquets

- Œdipode turquoise — *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)


Papillons

- Grande Tortue — *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Saint-Paul (60650) - Habitats naturels et semi-naturels




Savignies

Oiseaux



Savignies (60650) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes

- Struthioptéride en épi — *Struthiopteris spicant* (L.) Weiss, 1770
- Osmonde royale — *Osmunda regalis* (L., 1753)

Orchidées

- Orchis tacheté — *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, 1962

Caprifoliacées

- Succise des prés — *Succisa pratensis* (Moench, 1794)

Plantaginacées

- Digitale pourpre — *Digitalis purpurea* (L., 1753)
- Digitale pourpre — *Digitalis purpurea* (L., 1753) subsp. *purpurea*

Géraniacées

- Géranium sanguin — *Geranium sanguineum* (L., 1753)

Asparagacées

- Sceau-de-Salomon odorant — *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906


Salicacées

- Saule gris cendré foncé — *Salix atrocinerea* (Brot., 1804)

Éricacées

- Myrtille — *Vaccinium myrtillus* (L., 1753)

Savignies (60650) - Chauves-souris







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris


- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin d'Alcathoé *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Bechstein *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin de Natterer *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Noctule commune *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl *Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)
- Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Oreillard roux *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
- Oreillard gris *Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)
- Grand rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)

Amphibiens


Savignies (60650) - Amphibiens




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Oiseaux


Troissereux (60112) - Oiseaux # 1
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Troissereux
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Houssoy le Farcy
Campdeville
Clos Saint-Maurice
Hameau du Château
Bracheux
0
300
600 m
0
1
2 km
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Rapaces diurnes
Épervier d'Europe
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Buzard Saint-Martin
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Faucon pèlerin
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Faucon hobereau
Falco subbuteo Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Rapaces nocturnes
Chouette hulotte
Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Chouette effraie
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Échassiers
Grande aigrette
Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Pique bœufs
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Aigrette garzette
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Canards et autres oiseaux d'eau
Martin-pêcheur
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Sarcelle d'hiver
Anas crecca (Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Foulque macroule
Fulica atra (Linnaeus, 1758)
Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Canard chipeau
Mareca strepera (Linnaeus, 1758)
Nette rousse
Netta rufina (Pallas, 1773)
Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Grèbe huppé
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Canard souchet
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)
Sterne pierregarin
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)
Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Troissereux (60112) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Sizerin cabaret *Acanthis flammea caboret* (Muller, 1776)
- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)


Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Autres

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Troissereux (60112) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Orchidées

- Orchis pyramidal *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817 var. *pyramidalis*
- Orchis de Fuchs *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, 1962
- Épipactide helléborine *Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769
- Orchis bouc *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826
- Néottie nid-d'oiseau *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817

Aracées

- Gouet d'Italie *Arum italicum* (Mill., 1768)

Fabacées

- Réglisse sauvage *Astragalus glycyphyllos* (L., 1753)

Lamiacées

- Mélitte à feuilles de mélisse *Melittis melissophyllum* (L., 1753) subsp. *melissophyllum*
- Sauge des prés *Salvia pratensis* (L., 1753)

Plantaginacées

- Digitale pourpre *Digitalis purpurea* (L., 1753)

Renonculacées

- Ficaire printanière *Ficaria verna* (Huds., 1762)

Gentianacées

- Gentiane d'Allemagne *Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912

Géraniacées


- Géranium sanguin *Geranium sanguineum* (L., 1753)

Rosacées

- Poirier commun *Pyrus communis* (L., 1753)

N.B. *Les données situées au nord du Clos Saint-Maurice ne semblent pas être localisées de manière précise au vu de la concentration d'espèces partageant différents biotopes. Les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*

Troissereux (60112) - Chauve-souris





Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin d'Alcathoe *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Bechstein *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin de Brandt *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)
- Murin d'Alcathoe *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Natterer *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Noctule commune *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Oreillard roux *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
- Oreillard gris *Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)
- Grand rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)

Troissereux (60112) - Amphibiens, papillons, libellules et demoiselles





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Libellules


- Agrion mignon
  Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
- Cordulie à corps fin
  Oxygastra curtisii (Dale, 1834)


Papillons

- Collier-de-corail
  Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Mégère
  Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
- Grande Tortue
  Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)





Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Troissereux (60112) - Habitats naturels et semi-naturels
Houssoy-le-Farcy
Campdeville
Clos-Saint-Maurice
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Troissereux
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties

Richesse spécifique du secteur Thérain-Avelon




Pierrefitte-en-Beauvaisis (60112) - Réservoir secondaire de biodiversité
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Pierrefitte-en-Beauvaisis
Fond de Noirvié
Pierrefitte-en-Beauvaisis
Vers le bourg (environ 1 km)
Vers la forêt domaniale du Parc Saint-Quentin (environ 1 km)
146
0
0.3
0.6 km
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopièthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Réservoir de biodiversité
Réservoir secondaire de biodiversité avéré
Espèces patrimoniales (2020 - 2025)
Groupe d'espèces patrimoniales (en nombre d'individus d'espèces patrimoniales par rayon de 20 mètres)
Faune
Individus d'espèces patrimoniales isolés dans rayon de 20 mètres

Herchies (60112) - Réservoir secondaire de biodiversité









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Réservoir de biodiversité


- Réservoir secondaire de biodiversité avéré

Espèces patrimoniales (2020 - 2025)

Groupe d'espèces patrimoniales (en nombre d'individus d'espèces patrimoniales par rayon de 20 mètres)

- Faune et flore
- Individus d'espèces patrimoniales isolés dans rayon de 20 mètres

Zonages réglementaires et autres sites d’intérêt écologique du Thérain-Avelon




Xylocopa valga ♀ (Gerstäcker, 1872) par M. David Aubert




Beauvais

Le secteur de Beauvais compte la seule commune de Beauvais qui représente 54 738 habitants répartis sur une surface d'environ 32,9 km² (6 % du territoire intercommunal). Ce secteur représente littéralement le cœur de l'agglomération d'un point de vue géographique et socio-économique.




Les surfaces bâties représentent l'essentielle de l'occupation du sol avec 14,8 km² soit un peu moins de la moitié du territoire du secteur (environ 45 %). Les habitats cultivés occupent à peu près 7,3 km² du territoire (22 %). Ce type d'habitat se situe en très grande partie aux abords des limites communales, notamment au nord à proximité immédiate de l'aéroport Beauvais-Tillé mais également au sud entre le centre pénitentiaire et la maladrerie Saint-Lazare. Les habitats forestiers ont une emprise d'environ 5 km² soit 15 % du territoire. Ces habitats correspondent à des entités plus ou moins importantes en termes de superficie et se déclinent aussi bien en boisements et parcs urbains (Parc John Fitzgerald Kennedy, bois de Marissel, entité forestière riverain du Thérain dans le quartier de Voisinlieu…) qu'en boisements périphériques comme une partie de la forêt domaniale du Parc Saint-Quentin au nord-est, le bois Quéquet en limite sud ou les entités forestières du Marais-de-Saint-Just au nord, entres autres. Le territoire est concerné par la présence de zones humides relativement importante en termes de surface telles que le marais de Saint-Just ou le plan d'eau du Canada en lui-même et, dans une moindre mesure, le marais du Moulin de la Fos. 50 mares ont été recensées en 2024 dans le secteur de Beauvais. Ces zones humides représenteraient environ 5,7 % du territoire mais proviennent d'un autre jeu de données plus précises. Le reste de l'occupation du sol concernent des milieux ouverts et d'autres types d'habitats plus négligeables.

Ces différences en termes d'occupation du sol ont bien sûr des incidences sur la diversité d'espèces faunistiques, floristiques et autres que l'on rencontre dans le secteur. Si ce dernier comporte un noyau urbain central plutôt dense, la présence d'espaces naturels et semi-naturels périphériques - mais également en son sein - lui confère une biodiversité loin d'être marginale ! Entre coteaux crayeux du Mont aux Lièvres – site Natura 2000 - espaces prairiaux, boisements et zones humides, une diversité d'habitats permet le développement d'une biodiversité qui n'a rien à envier aux autres secteurs du territoire, bien au contraire.



N.B. : les données concernant les zones humides proviennent d'un autre jeu de données que celui utilisé pour les autres habitats. Les zones humides peuvent donc chevaucher un habitat forestier, ouvert ou cultivé (critère non cumulatif).



Un peu moins de 100 espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial, et dont beaucoup sont concernées par des enjeux de conservation importants à différentes échelles territoriales, y ont été recensées ces 5 dernières années. Parmi elles, 11 sont considérées « en danger critique d'extinction » au niveau régional dans la catégorie « nicheurs ». Ce chiffre est loin d'être anecdotique. À lui seul, ce secteur composé d'une seule commune comporte presque autant d'espèces d'oiseaux que les secteurs les plus riches en biodiversité du Beauvaisis. Les 5 espèces de rapaces nocturnes présents dans le Beauvaisis sont retrouvés dans ce secteur. On note également une belle diversité des passereaux : 4 cartes auront été nécessaires pour renseigner leur localisation des 5 années précédentes !

Sur les 27 espèces d'odonates répertoriées, 6 espèces patrimoniales sont présentent. On retrouve l'intégralité de ces espèces dans les autres secteurs du Beauvaisis et aucune espèce « inédite » n'y figure. Un peu moins de la moitié des espèces connues en Picardie sont présentes dans ce secteur[6].

17 espèces d'amphibiens sont présentent en Picardie et 14 dans le Beauvaisis. On retrouve 9 espèces à Beauvais dont 8 d'intérêt patrimonial, la grenouille verte *Pelophylax kl. esculentus* (Linnaeus, 1758) ayant été écartée en raison de la complexité d'identification due à la forte pollution génétique issue de multiples hybridations avec d'autres grenouilles du genre *Pelophylax*.

7 espèces de lépidoptères – ordre d'insectes regroupant notamment les papillons et les zygènes - sur les 34 inventoriées dans le secteur ces cinq dernières années sont considérées patrimoniales. Plus de la moitié d'entre elles est menacée !

Des données intéressantes concernent également les mammifères. Le Crossope aquatique *Neomys fodiens* (Pennant, 1771), musaraigne peu commune vivant dans les zones humides, a été identifié à partir de l'analyse de pelotes de réjection d'une chouette effraie *Tyto alba* (Scopoli, 1769) ayant élu domicile dans les combles de l'écospace de la Mie-au-Roy. 17 espèces de chauves-souris sont recensées dans ce secteur parmi les 21 connues actuellement en Picardie[7]. La communauté de chauves-souris de Beauvais correspond peu ou prou aux mêmes communautés rencontrées dans les autres secteurs du Beauvaisis.

Sur les 15 espèces d'orthoptères – ordre d'insectes regroupant les criquets, sauterelles et grillons – seules 2 espèces patrimoniales ont été identifiées dont la vulnérable, discrète et assez rare Courtilière commune *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758) ou encore l'Œdipode turquoise *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758).

À propos des reptiles, 7 espèces et sous-espèces ont été rencontrées. La totalité des 3 espèces de serpents présents dans le Beauvaisis se retrouve à Beauvais. Pour les lézards, 3 espèces sur les 5 présentes dans le Beauvaisis ont pu y être observés. Nous rappelons qu'aucune espèce indigène de tortues n'est présente à l'état sauvage dans le Beauvaisis.

5 espèces de poissons d'intérêt patrimoniale a été recensées ces cinq dernières années ce qui fait de Beauvais le secteur comptant le plus d'espèces patrimoniales relatives à ce taxon. Parmi eux, 2 espèces sont menacées dont l'Anguille européenne *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758), au bord de l'extinction mondiale. Cette espèce est bon indicateur de continuités écologiques fonctionnelles.

Enfin, 216 espèces de flore vasculaire, fougères et bryophytes selon les données récoltées concernent le secteur de Beauvais. On y compte 28 espèces patrimoniales dont 2 menacées que sont l'Aster amelle *Aster amellus* (L., 1753), une « marguerite », et la Tulipe des bois *Tulipa sylvestris* (L., 1753).

Une diversité d'habitats naturels ou semi-naturels permet cet état de fait, comme évoqué précédemment. Déjà, la présence d'une multitude de zones humides – mais dont le réel degré de fonctionnalité reste à préciser pour certaines - permet l'existence d'une faune et d'une flore adaptée aux milieux aquatiques.

[6] Liste rouge des odonates de Picardie – Picardie Nature (2017)

[7] Liste rouge des chiroptères en Picardie – Picardie Nature (2017)

Les zones humides de Beauvais, points chauds de biodiversité

Des zones humides remarquables ponctuent le territoire de Beauvais : le Moulin de la Fos, le secteur du marais de Saint-Just où se côtoient mares, forêt marécageuse et prairies inondables ou bien encore le Thérain ou les abords de la Liovette dans le quartier de Villers-Saint-Lucien sont de véritables réservoirs de biodiversité accueillant des espèces patrimoniales.

Beaucoup d'oiseaux d'eau, aussi bien nicheurs qu'hivernants ou de passage, s'observent au niveau du plan d'eau du Canada qui se conçoit comme un véritable carrefour migratoire dans le Beauvaisis où y transitent de nombreuses espèces.



Radeau à sternes sur le plan d'eau du Canada, site de nidification de la quasi-menacée Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758). La Sterne naine *Sternula albifrons* (Pallas, 1764), en danger, fréquente également le plan d'eau entre ses zones d'hivernage et de reproduction. D'autres laridés, anatidés et limicoles à forts enjeux de conservation au niveau local fréquentent ce plan d'eau artificiel et ses zones humides adjacentes qui en font un véritable point chaud de biodiversité à l'échelle de tout le Beauvaisis !

Les observations d'odonates patrimoniaux se concentrent presqu'exclusivement dans le marais de Saint-Just où l'on peut rencontrer le rare et vulnérable Gomphe à forceps *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) ou encore le quasi-menacé Cordulégastre annelé *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807), considéré comme peu commun en Picardie. D'autres espèces d'odonates encore non recensées côtoient très certainement ce secteur géographique. Plusieurs espèces d'amphibiens patrimoniaux sont retrouvées là encore dans les mares et espaces naturels du marais de Saint-Just, au Moulin de la Fos ou bien dans les zones humides du quartier de Villers Saint-Lucien. Une espèce de papillon des zones humides à forts enjeux de conservation puisque classée « en danger d'extinction » au niveau régional a également été recensé dans les milieux aquatiques du secteur : il s'agit du Cuivré des marais *Lycaena dispar* (Haworth, 1802). L'Hespérie du chiendent *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775), autre



Paysage de la zone humide du Moulin de la Fos, ancienne peupleraie et zone de compensation environnementale restaurée pour accueillir une biodiversité typique de ces milieux et tamponner les phénomènes de crues. Plusieurs espèces patrimoniales d'amphibiens ou de poissons y ont été recensées ces 5 dernières années.

lépidoptère classé « en danger d'extinction » dans les Hauts-de-France, a également été localisé à proximité du plan d'eau Le Montdu Canada.

Le secteur du plan d'eau du Canada et ses milieux adjacents concentrent également l'essentielle des observations de reptiles de Beauvais dont des espèces à forts enjeux de conservations que sont la Vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) ou la vulnérable Coronelle lisse *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768). Une sous-espèce de la Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789), un reptile des zones humides, est également présente dans le secteur. Enfin, les zones humides de Beauvais abrite deux espèces de poissons menacées que sont l'Anguille européenne *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758) et le Brochet *Esox lucius* (Linnaeus, 1758).

Ces zones humides sont donc un support inestimable de biodiversité mais procurent également bon nombre de services écosystémiques comme la régulation des crues. Leur conservation est un enjeu primordial.



Milieux prairiaux pâturés dans le secteur du marais de Saint-Just, grande zone humide de Beauvais ponctué de mares qui accueille des communautés animales et végétales d'intérêt patrimonial et à enjeux de conservation certains au niveau local. Les cartes parlent d'elles-mêmes !

Milieux boisés urbains et périphériques, des poumons de biodi-*vert*-sité

Les habitats forestiers, qui représentent tout de même 15 % de la superficie communale, se déclinent aussi bien en boisements et parcs urbains (Parc John Fitzgerald Kennedy, bois de Marissel, entité forestière riveraine du Thérain dans le quartier de Voisinlieu…) qu'en boisements périphériques comme une partie de la forêt domaniale du Parc Saint-Quentin au nord-ouest, le bois Quéquet en limite sud à proximité du centre pénitentiaire ou les entités forestières du Marais-de-Saint-Just au nord. Ces boisements sont autant des réservoirs de biodiversité que des sources d'aménités aux citoyens.

Est-ce pour cela que toutes les espèces de pics actuellement connues dans le Beauvaisis sont présentent à Beauvais ? On note même l'observation d'un Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (Linnaeus, 1758), espèce nicheuse en Hauts-de-France classée en « danger critique d'extinction » au niveau local et jamais observée ailleurs dans le Beauvaisis ces cinq dernières années. La préservation des vieux arbres est incontournable dans tous les secteurs de Beauvais et du Beauvaisis en tant qu'habitat pour les espèces cavicoles que sont les pics, les chouettes ou certains mammifères dont les chauves-souris. Plusieurs espèces de chauves-souris ont été recensées dans la forêt du Parc Saint-Quentin, au bois Brûlet ou bien dans les secteurs boisés de Marissel.



Milieu forestier dans le quartier de Marissel. Bien qu'enclavé en milieu urbain, ce boisement accueille au moins une espèce patrimoniale de plante et de nombreuses espèces d'oiseaux. L'enchevêtrement de bois mort est favorable pour les insectes saproxylophages qui s'en nourrissent et bénéficient aux pics qui fréquentent ce boisement. Une parenthèse verte à préserver au sein du tissu urbain !



Petite biche *Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758), un coléoptère saproxylophage certes commun mais indispensable à la formation d'humus. Et source de protéines pour les pics qui en raffolent !

Le Mont-aux-Lièvres, panorama sur Beauvais mais aussi la biodiversité !

Avec Creil et Saint-Maximin, et la butte du Mont aux Lièvres constituent les trois derniers bastions de l'Oise pour une herbe extrêmement rare et menacée en Hauts–de-France : la Seslérie bleue *Sesleria caerulea* (L.) Ard., 1763, une espèce protégée (mais non cartographiée dans cet ABC). Peu concurrentielle face aux autres plantes, cette dernière ne peut se maintenir que sur des milieux pionniers où la végétation est rase. Pour la faune, on observe un petit papillon de jour inféodé à ces milieux calcaires, l'Hespérie du chiendent *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775), classé « en danger d'extinction » dans les Hauts-de-France. Autrefois exploité en carrière, le sous-sol de ce site remarquable abrite désormais des populations de chauves-souris.



Vue de la butte du Mont aux Lièvres, en arrière-plan, depuis la cathédrale de Beauvais

Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans le secteur Beauvais

Tableau 25 - Amphibiens d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768)**	Alyte accoucheur	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)**	Crapaud commun	LC	LC	LC		Art. 3		C
***Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768)**	Triton alpestre	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)**	Triton palmé	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882)**	Grenouille de Lessona	DD	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	?
***Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771)**	Grenouille rieuse	NA	LC	LC		Art. 3	An. V	?
***Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)**	Grenouille agile	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Rana temporaria* (Linnaeus, 1758)**	Grenouille rousse	LC	LC	?		Art. 4	An. V	C

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7]Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 26 - Mammifères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)**	Sérotine commune	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Martes martes* (Linnaeus, 1758)**	Martre	NT	LC	LC	X			AC
***Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)**	Murin d'Alcathoe	DD	LC	NT		Art. 2	An. IV	-
***Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Bechstein	VU	NT	VU	X	Art. 2	An. IV	PC
***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Daubenton	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	C
***Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)**	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)**	Grand Murin	EN	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)**	Murin à moustaches	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)**	Murin de Brandt	DD	LC	LC		Art. 2	An. IV	-
***Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)**	Murin de Natterer	LC	LC	LC		Art. 2	An. IV	AC
***Neomys fodiens* (Pennant, 1771)**	Crossope aquatique	NT	LC	LC	X	Art. 2		PC
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**	Noctule de Leisler	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AR
***Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)**	Noctule commune	VU	VU	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)**	Pipistrelle de Kuhl	DD	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	-
***Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)**	Pipistrelle de Nathusius	NT	LC	LC		Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)**	Pipistrelle commune	LC	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	TC
***Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)**	Oreillard roux	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV & II	AC
Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV & II	AC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7]Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 27 - Poissons d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain [1]	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée [4]
***Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758)**	Ablette	?	LC	LC	X	
***Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758)**	Anguille européenne	?	CR	CR	X	
***Esox lucius* (Linnaeus, 1758)**	Brochet	?	VU	LC	X	Art.1
***Leuciscus leuciscus* (Linnaeus, 1758)**	Vandoise	?	LC	LC	X	Art.1
***Salmo trutta* (Linnaeus, 1758)**	Truite commune	?	LC	LC		Art.1

[1] Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national

Tableau 28 - Reptiles d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]
***Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)**	Orvet fragile	LC	LC	LC		Art. 3	
***Coronella austriaca* (Laurenti, 1768)**	Coronelle lisse	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
***Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)**	Couleuvre à collier	LC	LC	LC	X	Art. 2	
***Natrix helvetica helvetica* (Lacepède, 1789)**	Couleuvre à collier	LC	LC	LC	X	Art. 2	
***Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)**	Lézard des murailles	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
Vipera berus (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	EN	VU	LC	X	Art. 2	
***Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)**	Lézard vivipare	LC	LC	LC		Art. 3	

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Articles 2 & 3
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)

Tableau 29 - Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]
***Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Petit Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Apatura iris* (Linnaeus, 1758)**	Grand Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Collier-de-Corail	LC	LC	LC		
***Lycaena dispar* (Haworth, 1802)**	Cuivré des marais	EN	LC	?	X	Art.2
***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**	Demi-Deuil	LC	LC	LC		
***Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)**	Grande Tortue	NT	LC	LC		
***Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775)**	Hespérie du Chiendent	EN	LC	NT		

[1] Liste rouge des papillons de jour des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3

Tableau 30 - Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)**	Aeschne affine	LC	LC	LC	X			AR
***Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X			C
***Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)**	Cordulégastre annelé	NT	LC	LC	X			PC
***Erythromma lindenii* (Selys-Longchamps, 1840)**	Agrion de Vander Linden	LC	LC	LC	X			PC
***Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758)**	Gomphe à forceps	VU	LC	LC	X			R
***Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)**	Leste brun	LC	LC	LC	X			AC

[1] Liste des espèces d'odonates de Picardie avec statuts de rareté et de menace - mise à jour 06/12/13 (Picardie Nature - https://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/Liste_espece_et_statuts_061213.pdf)
[2] Liste rouge des libellules et demoiselles de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7] Picardie Nature (2024)

Tableau 31 - Orthoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée	Indice de rareté [4]
***Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758)**	Courtilière commune	VU	NE	LC	X		AR
***Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)**	Œdipode turquoise	LC	NE	LC	X		AR

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Picardie Nature (2024)
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 32 – Flore vasculaire d'intérêt patrimonial recensée dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		Famille	État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Directive Habitat-Faune-Flore [5]	Espèce réglementée [6]
***Agrostemma githago* (L., 1753)**	Nielle des blés	Caryophyllacées	LC	LC	?	X		
***Althaea officinalis* (L., 1753)**	Guimauve sauvage	Malvacées	LC	LC	LC	X		
***Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817**	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis* (L.) Rich., 1817**	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Aquilegia vulgaris* (L., 1753)**	Ancolie commune	Renonculacées	LC	LC	DD	X		
***Arum italicum* (Mill., 1768)**	Gouet d'Italie	Aracées	NA	LC	?	X		
***Aster amellus* (L., 1753)**	Aster amelle	Astéracées	VU	LC	LC	X		Art.1 M.
***Buxus sempervirens* (L., 1753)**	Buis sempervirent	Buxacées	LC	LC	LC	X		
***Campanula glomerata* (L., 1753)**	Campanule agglomérée	Campanulacées	LC	LC	?	X		
***Campanula persicifolia* (L., 1753)**	Bâton-de-Jacob	Campanulacées	NT	LC	?	X		
***Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, 1906**	Elléborine blanche	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Ficaria verna* (Huds., 1762)**	Ficaire printanière	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br., 1813**	Orchis moucheron	Orchidées	LC	LC	LC			
***Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826**	Orchis bouc	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Medicago arabica* (L.) Huds., 1762**	Luzerne maculée	Fabacées	LC	LC	LC	X		
***Orchis purpurea* (Huds., 1762)**	Orchis pourpre	Orchidées	LC	LC	LC			
***Ononis spinosa* (L., 1753)**	Bugrane épineuse	Fabacées	LC	LC	?	X		
Onopordum acanthium (L., 1753)	Chardon aux ânes	Astéracées	LC	LC	?	X		
***Ophrys apifera* (Huds., 1762)**	Ophrys abeille	Orchidées	LC	LC	LC			
***Ornithogalum umbellatum* (L., 1753)**	Dame-d'onze-heures	Asparagacées	LC	LC	?	X		
***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906**	Sceau-de-Salomon odorant	Asparagacées	LC	LC	LC	X		
***Scilla bifolia* (L., 1753)**	Scille à deux feuilles	Asparagacées	LC	LC	LC	X		
***Stachys recta* (L., 1767)**	Épiaire droit	Lamiacées	LC	LC	?	X		
***Stellaria neglecta* (Weihe, 1825)**	Stellaire négligée	Caryophyllacées	LC	LC	?	X		
***Taxus baccata* (L., 1753)**	If commun	Taxacées	LC	LC	LC	X		
***Tulipa sylvestris* (L., 1753)**	Tulipe des bois	Liliacées	VU	LC	?	X		
***Ulmus glabra* (Huds., 1762)**	Orme des montagnes	Ulmacées	LC	LC	?	X		
***Ulmus laevis* (Pall., 1784)**	Orme lisse	Ulmacées	?	LC	DD	X		Art.1 P.

[1] Liste rouge de la flore vasculaire et des bryophytes des Hauts-de-France (2019)
[2] Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[6] Liste des espèces végétales protégées en région Picardie : Article 1
[6] Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1

Tableau 33 - Avifaune d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « Beauvais » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional[1]	État de conservation métropolitain[2]	État de conservation européen[3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie[4]	Directive oiseaux[5]	Espèce réglementé[6]	Tendance des populations nicheuses métropolitaines[7]
Acanthis flammea cabaret (Muller, 1776)	Sizerin cabaret	NA					Art. 3	NC
***Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)**	Autour des palombes	EN	LC	LC	X		Art. 3 & 6	=
***Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)**	Épervier d'Europe	LC	LC	LC			Art. 3 & 6	?
***Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)**	Rousserole effarvatte	NT	LC	LC			Art. 3	=
***Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)**	Alouette des champs	VU	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)**	Martin-pêcheur	VU	VU	LC	X	An. I	Art. 3	?
***Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)**	Perdrix rouge	NA	LC	NT				↘
***Anas acuta* (Linnaeus, 1758)**	Canard pilet	NA	NA	VU	X		Art. 3	NC
***Anas crecca* (Linnaeus, 1758)**	Sarcelle d'hiver	CR	VU	LC	X		Art. 3	?
***Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)**	Pipit farlouse	EN	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Apus apus* (Linnaeus, 1758)**	Martinet noir	LC	NT	NT	X		Art. 3	?
***Ardea alba* (Linnaeus, 1758)**	Grande Aigrette	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Ardea purpurea* (Linnaeus, 1766)**	Héron pourpré	NA	LC	LC		An. I	Art. 3	↘
***Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)**	Hibou des marais	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↘↗
***Asio otus* (Linnaeus, 1758)**	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC			Art. 3	?
***Athene noctua* (Scopoli, 1769)**	Chouette chevêche	NT	LC	LC	X		Art. 3	=
***Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)**	Fuligule milouin	EN	VU	VU	X		Art. 3	?
***Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)**	Fuligule morillon	VU	LC	NT	X		Art. 3	↗
***Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)**	Pique bœufs	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)**	Œdicnème criard	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	?
***Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)**	Chardonneret élégant	NT	VU	LC	X		Art. 3	=
***Cettia cetti* (Temminck, 1820)**	Bouscarle de Cetti	LC	NT	LC	X		Art. 3	=
***Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)**	Cigogne blanche	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)**	Cigogne noire	EN	EN	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)**	Busard des roseaux	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	=
***Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)**	Busard Saint-Martin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Columba oenas* Linnaeus, 1758**	Pigeon colombin	LC	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)**	Caille des blés	VU	LC	NT			Art. 3	↘
***Cuculus canorus* Linnaeus, 1758**	Coucou gris	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)**	Hirondelle de fenêtre	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)**	Pic épeiche	LC	LC	LC			Art. 3	↗


***Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)**	Pic mar	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)**	Pic épeichette	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)**	Pic noir	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
***Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)**	Aigrette garzette	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)**	Bruant proyer	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)**	Bruant zizi	EN	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)**	Bruant jaune	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)**	Bruant des roseaux	EN	EN	LC	X		Art. 3	↘
***Falco columbarius* (Linnaeus, 1758)**	Faucon émerillon	NA	NA	VU		An. I	Art. 3	NC
***Falco peregrinus* (Tunstall, 1771)**	Faucon pèlerin	VU	?	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)**	Faucon hobereau	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)**	Gobemouche noir	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
***Fulica atra* (Linnaeus, 1758)**	Foulque macroule	LC	LC	NT	X		Art. 3	=
***Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)**	Cochevis huppé	CR	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)**	Bécassine des marais	CR	CR	VU	X		Art. 3	↘
***Haematopus ostralegus* (Linnaeus, 1758)**	Huîtrier pie	CR	LC	VU			Art. 3	?
***Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)**	Échasse blanche	EN	LC	LC	X	An. I	Art. 3	?
***Hirundo rustica* Linnaeus, 1758**	Hirondelle de cheminée	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Ichthyaetus melanocephalus* (Temminck, 1820)**	Mouette mélanocéphale	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Jynx torquilla* (Linnaeus, 1758)**	Torcol fourmilier	CR	LC	LC	X		Art. 3	=
***Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)**	Pie-grièche écorcheur	NT	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)**	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC	X		Art. 3	↗
***Locustella naevia* (Boddaert, 1783)**	Locustelle tachetée	VU	NA	LC	X		Art. 3	↘
***Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)**	Alouette lulu	CR	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)**	Rossignol philomèle	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)**	Gorgebleue à miroir	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)**	Canard chipeau	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
***Milvus migrans* (Boddaert, 1783)**	Milan noir	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)**	Milan royal	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)**	Bergeronnette des ruisseaux	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)**	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Motacilla flava flava* (Linnaeus, 1758)**	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Muscicapa striata* (Pallas, 1764)**	Gobemouche gris	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Netta rufina* (Pallas, 1773)**	Nette rousse	NA	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)**	Traquet motteux	CR	NT	LC	X		Art. 3	=
***Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)**	Balbuzard pêcheur	NE	VU	LC		An. I	Art. 3	↗

Passer domesticus **(Linnaeus, 1758)**	Moineau domestique	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Perdix perdix **(Linnaeus, 1758)**	Perdrix grise	VU	LC	LC				↘
Pernis apivorus **(Linnaeus, 1758)**	Bondrée apivore	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Phalacrocorax carbo **(Linnaeus, 1758)**	Grand Cormoran	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Phoenicurus phoenicurus **(Linnaeus, 1758)**	Rougequeue à front blanc	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Phylloscopus trochilus **(Linnaeus, 1758)**	Pouillot fitis	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Picus viridis **(Linnaeus, 1758)**	Pic vert	LC	LC	LC			Art. 3	↘
Platalea leucorodia **(Linnaeus, 1758)**	Spatule blanche	EN	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Podiceps cristatus **(Linnaeus, 1758)**	Grèbe huppé	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Podiceps nigricollis **(Brehm, 1831)**	Grèbe à cou noir	VU	LC	VU	X		Art. 3	?
Porzana porzana **(Linnaeus, 1766)**	Marouette ponctuée	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	?
Pyrrhula pyrrhula **(Linnaeus, 1758)**	Bouvreuil pivoine	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Rallus aquaticus **(Linnaeus, 1758)**	Râle d'eau	NT	NT	LC	X		Art. 3	?
Recurvirostra avosetta **(Linnaeus, 1758)**	Avocette élégante	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Riparia riparia **(Linnaeus, 1758)**	Hirondelle de rivage	VU	LC	LC			Art. 3	?
Saxicola rubetra **(Linnaeus, 1758)**	Tarier des prés	CR	VU	LC	X		Art. 3	↘
Saxicola rubicola **(Linnaeus, 1766)**	Tarier pâtre	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Serinus serinus **(Linnaeus, 1766)**	Serin cini	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Spatula clypeata **(Linnaeus, 1758)**	Canard souchet	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
Spatula querquedula **(Linnaeus, 1758)**	Sarcelle d'été	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
Sterna hirundo **(Linnaeus, 1758)**	Sterne pierregarin	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Sternula albifrons **(Pallas, 1764)**	Sterne naine	EN	LC	LC		An. I	Art. 3	↗
Streptopelia turtur **(Linnaeus, 1758)**	Tourterelle des bois	EN	VU	VU	X		Art. 3	↘
Strix aluco **(Linnaeus, 1758)**	Chouette hulotte	LC	LC	LC			Art. 3	?
Sylvia borin **(Boddaert, 1783)**	Fauvette des jardins	VU	NT	LC			Art. 3	↘
Sylvia curruca **(Linnaeus, 1758)**	Fauvette babillarde	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Tachybaptus ruficollis **(Pallas, 1764)**	Grèbe castagneux	LC	LC	LC	X		Art. 3	↘
Turdus pilaris **(Linnaeus, 1758)**	Grive litorne	RE	LC	LC	X		Art. 3	?
Tyto alba **(Scopoli, 1769)**	Chouette effraie	NT	LC	LC			Art. 3	↝
Vanellus vanellus **(Linnaeus, 1758)**	Vanneau huppé	NT	NT	VU	X		Art. 3	?

[1] Liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I
[6] Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Articles 3 et 6
[7] Picardie Nature (2024)


Beauvais

Flore



N.B. *Les données concentrées dans le point central (juste en dessous Argentine) ne semblent pas être localisées de manière précise au vu de la présence d'espèces partageant différents biotopes. Les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*

Beauvais (60000) - Flore patrimoniale # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Lamiacées

- Épiaire droit — *Stachys recta* (L., 1767)

Liliacées

- Tulipe des bois — *Tulipa sylvestris* (L., 1753)

Orchidées

- Orchis pyramidal — *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817
- Orchis moucheron — *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br., 1813
- Orchis bouc — *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826
- Ophrys abeille — *Ophrys apifera* (Huds., 1762)
- Orchis pourpre — *Orchis purpurea* (Huds., 1762)

Renonculacées

- Renoncule ficaire — *Ficaria verna* (Huds., 1762)

Ulmacées

- Orme glabre — *Ulmus glabra* (Huds., 1762)

Beauvais (60000) - Amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Grenouilles et crapauds

Crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)


Grenouilles

- Grenouille de Lessona
  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
- Grenouille rieuse
  Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
- Grenouille agile
  Rana dalmatina (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)
- Grenouille rousse
  Rana temporaria (Linnaeus, 1758)

Tritons

- Triton alpestre
  Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
- Triton palmé
  Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)


Beauvais (60000) - Insectes




Mammifères

Beauvais (60000) - Mammifères





Beauvais (60000) - Reptiles et poissons







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Poissons

- Ablette *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758)
- Anguille européenne *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758)
- Brochet *Esox lucius* (Linnaeus, 1758)
- Vandoise *Leuciscus leuciscus* (Linnaeus, 1758)
- Truite commune *Salmo trutta* (Linnaeus, 1758)

Reptiles


Serpents

- Coronelle lisse *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768)
- Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)
- Vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758)

Lézards

- Orvet fragile *Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)
- Lézard des murailles *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)
- Lézard vivipare *Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 1







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Autour des palombes *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
- Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
- Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
- Faucon émerillon *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758)
- Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771)
- Faucon hobereau *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)
- Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
- Milan royal *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)
- Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)
- Bondrée apivore *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces nocturnes

- Hibou des marais
  Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
- Hibou moye,-duc
  Asio otus (Linnaeus, 1758)
- Chouette chevêche
  Athene noctua (Scopoli, 1769)
- Chouette hulotte
  Strix aluco (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie
  Tyto alba (Scopoli, 1769)



Beauvais (60000) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Pics

- Pic épeiche
  Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
- Pic mar
  Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette
  Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
- Pic noir
  Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
- Torcol fourmilier
  Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)
- Pic vert
  Picus viridis (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 4







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Grands échassiers

- Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne noire *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

Gallinacés

- Perdrix rouge *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)
- Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)


Colombidés


- Pigeon colombin *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle turque *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)


Autres oiseaux

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 5











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux # 1

- Sizerin cabaret
  Acanthis flammea cabaret (Muller, 1776)
- Rousserolle effarvatte
  Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
- Alouette des champs
  Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse
  Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant
  Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti
  Cettia cetti (Temminck, 1820)
- Hirondelle de fenêtre
  Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer
  Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
- Bruant zizi
  Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)
- Bruant jaune
  Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux
  Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 6







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux # 2

- Gobemouche noir
  Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
- Cochevis huppé
  Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée
  Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur
  Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse
  Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
- Locustelle tachetée
  Locustella naevia (Boddaert, 1783)
- Alouette lulu
  Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle
  Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)
- Gorgebleue à miroir
  Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 7







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux # 3

- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 8







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux # 4

- Tarier des prés
  Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre
  Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
- Serin cini
  Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins
  Sylvia borin (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde
  Curruca curruca (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne
  Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 9











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Oiseaux d'eau # 1

- Martin-pêcheur
  Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
- Canard pilet
  Anas acuta (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'hiver
  Anas crecca (Linnaeus, 1758)
- Grande Aigrette
  Ardea alba (Linnaeus, 1758)
- Héron pourpré
  Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
- Fuligule milouin
  Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
- Fuligule morillon
  Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
- Pique-bœufs
  Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
- Œdicnème criard
  Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
- Aigrette garzette
  Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 10







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Oiseaux d'eau # 2

- Foulque macroule
  Fulica atra (Linnaeus, 1758)
- Bécassine des marais
  Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
- Huîtrier pie
  Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)
- Échasse blanche
  Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
- Mouette mélanocéphale
  Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)
- Canard chipeau
  Mareca strepera (Linnaeus, 1758)
- Nette rousse
  Netta rufina (Pallas, 1773)
- Grand Cormoran
  Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
- Spatule blanche
  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
- Grèbe huppé
  Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Beauvais (60000) - Oiseaux # 11







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Oiseaux d'eau # 3

- Grèbe à cou noir
  Podiceps nigricollis(Brehm, 1831)
- Marouette ponctuée
  Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
- Râle d'eau
  Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
- Avocette élégante
  Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
- Canard souchet
  Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'été
  Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)
- Sterne pierregarin
  Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)
- Sterne naine
  Sternula albifrons (Pallas, 1764)
- Grèbe castagneux
  Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
- Vanneau huppé
  Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Beauvais (60000) - Habitats naturels et semi-naturels





Limites administratives

- Limite communale


Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes

Habitats naturels et semi-naturels

- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties

Zonages réglementaires et autres sites d’intérêt écologique de Beauvais



Papaver rhoeas (Linnaeus, 1753) par Mme Véronique Boyault



Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) par M. Yves Lacoutière




Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) par M. Florentin Morel



Vallée du Thérain aval


Situé au sud-est du Beauvaisis, le secteur de la vallée du Thérain aval compte 9 256 habitants répartis sur 6 communes pour une surface d'environ 63,7 km² (presque 12 % du territoire intercommunal). Les communes concernées par ce découpage territorial repris du plan local d'urbanisme intercommunal sont les suivantes :

- Allonne ;
- Bailleul-sur-Thérain ;
- Hermes ;
- Rochy-Condé ;
- Therdonne ;
- Warluis.




Les habitats cultivés représentent le premier mode d'occupation du sol en termes de surface avec 30,1 km² soit presque la moitié du territoire du secteur. Viennent ensuite les habitats forestiers qui couvrent 18,2 km², presque un tiers du territoire (28,5 % environ). Les zones bâties occupent un peu moins de 10 % du territoire avec 6,1 km². Les habitats ouverts couvrent environ 5,5 km² (presque 9 %). D'autres modes d'occupation du sol plus négligeables correspondant aux « surfaces minérales » existent.

Ce secteur est également concerné par une part importante de zones humides sur son territoire. Elles y représentent 9 km² soit presque 15 % du territoire. 26 mares y ont été recensées en 2024. Ces zones humides peuvent se superposer aux différents types d'habitats susmentionnés car elles proviennent d'une autre source de données. Par exemple, un boisement marécageux peut très bien être comptabilisé à la fois en habitat forestier et en zones humides.



N.B. : les données concernant les zones humides proviennent d'un autre jeu de données que celui utilisé pour les autres habitats. Les zones humides peuvent donc chevaucher un habitat forestier, ouvert ou cultivé (critère non cumulatif).



Ce secteur géographique figure parmi les plus riches en nombre d'espèces patrimoniales grâce à la présence d'habitats naturels et semi-naturels plus diversifiés vis-à-vis des autres secteurs : les parts des différents modes d'occupation du sol y sont plus équilibrés, même s'il y a une prédominance des habitats forestiers et cultivés. C'est ici par exemple que l'on a la plus grande surface de zones humides de tous les secteurs de l'atlas : environ 14 % de la surface du secteur contre 3 % dans la boutonnière du Bray, 8 % sur le plateau picard sud, presque 6 % à Beauvais ou encore 5 % dans le secteur Thérain-Avelon. C'est d'ailleurs ce secteur qui détient le record de la maille avec la plus grande densité d'espèces patrimoniales !

Ainsi, on retrouve presque logiquement la quasi-totalité des 13 espèces d'amphibiens connues dans le Beauvaisis actuellement. Seul le Triton alpestre *Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768) semble manquer à l'appel, espèce patrimoniale certes mais au statut de conservation local jugé « en préoccupation mineure » d'après les dernières informations des listes rouges régionales. Si davantage d'espèces de poissons patrimoniaux ont été recensés dans d'autres secteurs, tout de même deux espèces y figurent dans ce secteur dont l'Anguille européenne *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758), au bord de l'extinction mondiale. Il est donc satisfaisant de retrouver cette espèce à fort enjeux de conservation dans le Thérain et ses affluents aussi bien en amont de Beauvais qu'en aval. Cet état de fait rend compte des efforts qui ont réalisés pour améliorer la continuité de la trame bleue, notamment portés par le Syndicat intercommunal de la vallée du Thérain.

Idem pour les reptiles : 7 des 8 reptiles du Beauvaisis sont présents, dont les serpents évoluant en zones humides que sont la Vipère péliade *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) et la Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789). La vulnérable Coronelle lisse *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768) n'a pas été localisée lors des cinq dernières années mais elle y est très certainement présente !

À propos des insectes, deux espèces patrimoniales de coléoptères sont recensées : il s'agit du Carabe des arbres *Carabus intricatus* (Linnaeus, 1761), qui semble commun, et du Lucane cerf-volant *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), quasi-menacé en Europe et espèce d'intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la Directive européenne « Habitat-faune-flore ». Parmi les 47 espèces de papillons dits « diurnes » recensées dans ce secteur – qu'on appelle autrement rhopalocères pour briller en dîners mondains de naturalistes - 12 espèces patrimoniales ont été recensées dans ce secteur dont une en voie de disparition dans le Beauvaisis et encore jamais observée dans tous les autres secteurs : il s'agit de l'Azuré des Cytises *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761), un papillon des pelouses sèches, friches calcaires et lisières. La disparition de ces types de milieux naturels dans ce secteur est donc un réel enjeu. 2 autres espèces de papillons dits « de nuit » considérées comme patrimoniales complètent cette liste. À propos des orthoptères - qui regroupent criquets, sauterelles et grillons – parmi les 28 espèces recensées au total ces cinq dernières années dans le secteur, 10 espèces patrimoniales ont été recensées. Comparé à d'autres parties du Beauvaisis, il ne semble pas y a voir d'observations particulières vis-à-vis du cortège d'orthoptères, dont on retrouve un bon nombre d'espèces dans les autres secteurs du Beauvaisis. À noter qu'hormis pour la commune de Therdonne, aucun inventaire complémentaire n'a été conduit dans les autres communes du secteur sur ce taxon. La réalité et la diversité d'espèces d'orthoptères y semblent donc largement sous-estimées. Mais l'on peut tout de même évoquer la présence du peu commun Conocéphale des roseaux *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), espèces d'orthoptère des zones humides à forts enjeux de conservation car classé « vulnérable » au niveau local. Enfin, à propos des odonates – libellules et demoiselles – parmi les 32 espèces recensées dans ce secteur, soit tout de même la moitié des espèces connues en Picardie actuellement – l'on recense 10 espèces d'intérêt patrimonial dont une espèce rare et vulnérable au niveau local qu'est le Gomphe à forceps *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758), réel enjeu de conservation des zones humides de la vallée du Thérain aval.

Concernant des mammifères, si l'on retrouve 16 des 21 espèces de chauves-souris connues actuellement en Picardie dont le vulnérable Grand Rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) et sa sous-espèce, pas toujours présents dans tous les secteurs de l'atlas. Aucune mention de Martre *Martes martes* (Linnaeus, 1758) ou d'Hermine *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758) n'y figurent et cela malgré la présence de milieux pourtant favorables. Idem pour les micromammifères semi-aquatiques : en dépit de milieux aquatiques favorables, les deux espèces à enjeux que sont le Crossope aquatique *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) ou le Campagnol amphibie *Arvicola sapidus* (Miller, 1908) – peut-être disparu du Beauvais à l'heure actuelle - ne sont pas retrouvées d'après les données récoltées. À noter que ces deux espèces ont déjà été observées dans ce secteur du Beauvaisis mais les données remontent à plus de 10 ans désormais.

Enfin, parmi les 318 espèces de flore vasculaire, bryophytes, fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes recensées dans le secteur, 111 espèces patrimoniales y sont présentes, chiffre sûrement en deçà de la réalité.

Les oiseaux témoignent également de cette diversité de milieux forestiers, ouverts et aquatiques présents dans le secteur car l'on retrouve des cortèges d'espèces typiques associés. Des espèces d'oiseaux d'eau en fort déclin sont présentent comme les deux Sarcelles d'été et d'hiver, respectivement *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758) et *Anas crecca* (Linnaeus, 1758), dont les effectifs nicheurs sont en très mauvais état de conservation régionale, deux espèces de fuligules du genre *Aythya* ou encore des échassiers patrimoniaux du Beauvaisis tels que 2 espèces d'Aigrette ou encore la présence signalée du petit héron nocturne Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758), inédit vis-à-vis des autres secteurs traités dans l'atlas. On retrouve aussi les passereaux à enjeux de conservations des zones ouvertes entrecoupées de haies comme les bruants ou le quasi-menacé Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758), entres autres, mais encore des espaces plus densément boisés : les quasi-menacés Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831) et Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758), la vulnérable Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783), etc.

Ainsi, ce secteur concentre encore beaucoup d'espèces d'intérêt patrimoniales à propos de tous les taxons abordés dans cet atlas, témoignant de la présence de zones humides fonctionnelles, de milieux ouverts et thermophiles comme les pelouses sèches sur substrat calcaire ou des milieux forestiers favorables à des insectes d'intérêt communautaire ou à forts enjeux de conservation locaux. Toute cette diversité de milieu est le support d'une biodiversité que l'on pourrait qualifier de remarquable vis-à-vis d'autres secteur du Beauvaisis mais gardons toujours à l'esprit qu'une approche qualitative prévaut également. Comparaison n'est pas raison : chaque secteur présente des spécificités et parfois des espèces que l'on a retrouvées dans nul autre !



L'Azuré des Cytises *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761), en voie d'extinction dans le Beauvaisis et les Hauts-de-France d'une manière générale. Elle ne subsiste que dans quelques localités. Elle est très souvent associée à plusieurs espèces de fourmis qui la protègent des prédateurs en échange d'un miellat qu'elle sécrète grâce à une glande mellifère dorsale

Le mont César, patrimoines à la croisée des chemins

Le mont César, culminant à 138 mètres et situé dans la commune de Bailleul-sur-Thérain, s'avère être l'un des larris les plus riches du département de l'Oise en termes d'habitats et d'espèces animales et végétales. Et certainement le site le plus riche de tout le Beauvaisis ! C'est en effet sur le mont César que l'on retrouve la maille comptant la plus grande densité d'espèces patrimoniales de tout le Beauvaisis - faune et flore confondues. Au moins 85 espèces patrimoniales s'y localisent ! Son microclimat lui conférant une ambiance méridionale en été et ses caractéristiques géologiques et morphologiques ont permis l'installation de milieux naturels extrêmement rares et menacés de disparition : les pelouses sèches sur sable et calcaire. Il s'agit de l'une des dernières pelouses sèches parmi les plus remarquables du territoire picard, d'un seul tenant de 17 hectares. Depuis de nombreuses années, ce site est géré le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et intègre le périmètre du site Natura 2000 « FR2200377 - Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ». Quoi de mieux pour prouver sa valeur environnementale ?



Pelouse sèche du mont César, parmi les plus remarquables de celles qui perdurent encore de nos jours dans l'Oise, siège d'une faune et d'une flore exceptionnelle

En termes de faune, l'on retrouve notamment un cortège typique de papillons patrimoniaux des milieux ouvert ensoleillé sur coteaux calcaires comme le quasi-menacé Point de Hongrie *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758), l'assez rare Argus frêle *Cupido minimus* (Fuessly, 1775), pas loin d'être menacé en Hauts-de-France, ou encore le Demi-Deuil *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758). Chez les orthoptères, l'on y retrouve notamment le Gomphocère tacheté *Myrmeleotettix maculatus* (Thunberg, 1815), un criquet quasi-menacé adepte d'une végétation très éparse voir même des sols nus, uniquement signalé sur ce site dans l'atlas. D'autres espèces patrimoniales sont présentes comme le Criquet de la Palène *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796), l'assez rare Œdipode turquoise *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758) ou bien encore la rare Decticelle carroyée *Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)**.** Le Lucane cerf-volant *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), coléoptère d'intérêt communautaire inscrit à la directive européenne « Habitat-faune-flore », est présent dans les zones boisées du mont.

La richesse floristique n'a rien à envier à bon nombre de sites naturels des Hauts-de-France voire même de métropole d'une certaine manière. On retrouve là encore des espèces caractéristiques des pelouses héliophiles calcicoles comme la Séséli des montagnes *Seseli montanum* (L., 1753), la Germandrée des montagnes *Teucrium montanum* (L., 1753), une espèce protégée de Picardie, l'Anémone pulsatille *Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768), véritable indicateur des pelouses calcaires ou encore le vulnérable et menacé Millepertuis des montagnes *Hypericum montanum* (L., 1755). Une dizaine d'espèces d'orchidées sont présentes sur le mont César dont deux espèces protégées en Picardie : le Limodore avorté *Limodorum abortivum* (L.) Sw., 1799 et l'Ophrys araignée *Ophrys aranifera* Huds., 1778 (ainsi que l'une de ses trois sous-espèce, *Ophrys aranifera subsp. Aranifera*).

Longtemps pâturé par les ovins, certaines parties du mont César sont en proie au développement des ligneux qui recouvrent maintenant une bonne moitié de sa superficie. Suite à l'arrêt des pratiques agropastorales traditionnelles, cette dynamique végétale spontanée peut à termes nuire à la biodiversité du site mais le Conservatoire d'espaces naturels veille aux grains !

Au-delà de l'aspect biodiversité, il s'agit également d'un site culturel historique majeur du Beauvaisis, occupé par l'Homme dès l'âge du bronze puis devenu siège d'un oppidum romain. En témoignent les nombreux vestiges archéologiques trouvés dans le sous-sol depuis le XVIII^{e} siècle. Au mont César, le patrimoine sous toute ses formes est bel à bien à la croisée des chemins !



Pâturage ovin au début du XX^{e} siècle sur le mont César. Les ligneux occupaient une surface nettement moindre à celle d'aujourd'hui, contenu à l'époque par les pratiques agropastorales traditionnelles. Mais le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France veille aujourd'hui à sauvegarder les milieux pelousaires du mont avec l'aide de nombreux bénévoles



Limodore avorté *Limodorum abortivum* (L.) Sw., 1799 photographié sur le Mont César. Orchidée quasi-protégée protégée dans le Beauvaisis ! Cette espèce thermophile et xérophile est menacée par la disparition ou l'évolution des groupements pré-forestiers calcicoles dans lesquels elle vit, d'où la nécessité de maintenir des stades dynamiques primaires sur le mont, en particulier les pelouses et les pré-bois.

Liste des espèces d'intérêt patrimonial recensées dans la vallée du Thérain aval

Tableau 34 - Amphibiens d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
Alytes obstetricans **(Laurenti, 1768)**	Alyte accoucheur	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
Bufo bufo **(Linnaeus, 1758)**	Crapaud commun	LC	LC	LC		Art. 3		C
Hyla arborea **(Linnaeus, 1758)**	Rainette verte	VU	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
Lissotriton helveticus **(Razoumowsky, 1789)**	Triton palmé	LC	LC	LC		Art. 3		AC
Lissotriton vulgaris **(Linnaeus, 1758)**	Triton ponctué	NT	NT	LC	X	Art. 3		AC
Pelophylax lessonae **(Camerano, 1882)**	Grenouille de Lessona	DD	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	?
Pelophylax ridibundus **(Pallas, 1771)**	Grenouille rieuse	NA	LC	LC		Art. 3	An. V	?
Rana dalmatina **(Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)**	Grenouille agile	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
Rana temporaria **(Linnaeus, 1758)**	Grenouille rousse	LC	LC	?		Art. 4	An. V	C
Salamandra salamandra **(Linnaeus, 1758)**	Salamandre tachetée	NT	LC	VU	X	Art. 3		PC
Triturus cristatus **(Laurenti, 1768)**	Triton crêté	VU	NT	LC	X	Art. 2	An. II & IV	PC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7]Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 35 – Poissons d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain [1]	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée [4]
Anguilla anguilla **(Linnaeus, 1758)**	Anguille européenne	?	CR	CR	X	
Leuciscus leuciscus **(Linnaeus, 1758)**	Vandoise	?	LC	LC	X	Art.1

[1] Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national

Tableau 36 - Mammifères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)**	Sérotine commune	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)**	Murin d'Alcathoe	DD	LC	NT		Art. 2	An. IV	-
***Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Bechstein	VU	NT	VU	X	Art. 2	An. IV	PC
***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Daubenton	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	C
***Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)**	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)**	Grand Murin	EN	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)**	Murin à moustaches	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)**	Murin de Brandt	DD	LC	LC		Art. 2	An. IV	-
***Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)**	Murin de Natterer	LC	LC	LC		Art. 2	An. IV	AC
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**	Noctule de Leisler	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AR
***Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)**	Noctule commune	VU	VU	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)**	Pipistrelle de Nathusius	NT	LC	LC		Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)**	Pipistrelle commune	LC	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	TC
***Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)**	Oreillard roux	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV & II	AC
Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV & II	AC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7] Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 37 – Autres insectes d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [1]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [2]	Directive Habitats-Faune-Flore [3]	Indice de rareté [4]
***Carabus intricatus* (Linnaeus, 1761)**	Carabe des arbres	NE	NE	NE			
***Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)**	Lucane cerf-volant	NE	NE	NT	X	An. II	AR

[1] Liste rouge européenne des espèces menacées
[2] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[3] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II
[4] Clicnat (2024)

Tableau 38 - Odonates d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée	Indice de rareté [5]
***Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)**	Aeschne affine	LC	LC	LC	X		AR
***Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X		C
***Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789)**	Agrion délicat	LC	LC	LC	X		PC
***Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842)**	Agrion mignon	LC	LC	LC	X		PC
***Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)**	Cordulégastre annelé	NT	LC	LC	X		PC
***Erythromma lindenii* (Selys-Longchamps, 1840)**	Agrion de Vander Linden	LC	LC	LC	X		PC
***Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758)**	Gomphe à forceps	VU	LC	LC	X		R
***Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837)**	Orthétrum brun	LC	LC	LC	X		PC
***Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798)**	Orthétrum bleuissant	NT	LC	LC	X		AR
***Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)**	Leste brun	LC	LC	LC	X		AC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des libellules et demoiselles de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II
[7] Picardie Nature (2024)

Tableau 39 - Reptiles d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]
***Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)**	Orvet fragile	LC	LC	LC		Art. 3	
***Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758)**	Lézard agile	VU	NT	LC	X	Art. 2	An. IV
***Lacerta bilineata* (Daudin, 1802)**	Lézard à deux raies	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
***Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)**	Couleuvre à collier	LC	LC	LC	X	Art. 2	
***Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)**	Lézard des murailles	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
Vipera berus (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	EN	VU	LC	X	Art. 2	
***Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)**	Lézard vivipare	LC	LC	LC		Art. 3	

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Articles 2 & 3
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)

Tableau 40 - Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]
***Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Petit Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Apatura iris* (Linnaeus, 1758)**	Grand Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Arctia villica* (Linnaeus, 1758)**	Écaille fermière	?	?	?	X	
***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Collier-de-Corail	LC	LC	LC		
***Boloria dia* (Linnaeus, 1767)**	Petite Violette	NT	LC	LC		
***Colias alfacariensis* (Ribbe, 1905)**	Fluoré	NT	LC	LC	X	
***Cupido minimus* (Fuessly, 1775)**	Argus frêle	NT	LC	LC		
***Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)**	Point de Hongrie	NT	LC	LC		
***Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)**	Azuré des Cytises	EN	LC	LC	X	
***Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)**	Miroir	EN	LC	LC	X	
***Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775)**	Azuré bleu-céleste	NT	LC	LC	X	
***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**	Demi-Deuil	LC	LC	LC		
***Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)**	Grande Tortue	NT	LC	LC		
***Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Grand Paon de nuit	?	?	?	X	

[1] Liste rouge des papillons de jour des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 41 – Orthoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée	Indice de rareté [4]
***Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758)**	Caloptène italien	LC	NE	LC	X		R
***Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)**	Criquet marginé	LC	NE	LC	X		AR
***Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804)**	Conocéphale des Roseaux	VU	NE	LC	X		PC
***Myrmeleotettix maculatus* (Thunberg, 1815)**	Gomphocère tacheté	NT	NE	LC	X		
***Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)**	Grillon des bois	LC	NE	LC			C
***Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)**	Œdipode turquoise	LC	NE	LC	X		AR
***Omocestus rufipes* (Zetterstedt, 1821)**	Criquet noir-ébène	NT	NE	LC	X		PC
***Platycleis albopunctata* (Goeze, 1778)**	Decticelle grisâtre	NT	NE	LC	X		PC
***Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796)**	Criquet de la Palène	NT	NE	LC	X		AC
***Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)**	Decticelle carroyée	LC	NE	LC	X		R

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Picardie Nature (2024)
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 42 – Flore vasculaire et bryophytes d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025

Espèce		Famille	État de conservation régional[1]	État de conservation métropolitain[2]	État de conservation européen[3]	Espèce déterminante ZNIEFF Hauts-de-France et/ou Picardie[4]	Directive Habitat-Faune-Flore[5]	Espèce réglementée[6]
Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys (L.) Schreb., 1773	Bugle petit-pin	Lamiacées	NT	LC	?	X		
Allium oleraceum (L., 1753)	Ail maraîcher	Amaryllidacées	LC	LC	LC	X		
Allium ursinum (L., 1753)	Ail des ours	Amaryllidacées	LC	LC	LC	X		
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759	Alysson faux alysson	Brassicaceae	NT	LC	?	X		
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris (L., 1753)	Ancolie commune	Renonculacées	LC	LC	DD	X		
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772	Arabette poilue	Brassicacées	LC	LC	LC	X		
Arum italicum (Mill., 1768)	Gouet d'Italie	Aracées	NA	LC	?	X		
Astragalus glycyphyllos (L., 1753)	Réglisse sauvage	Fabacée	LC	LC	LC	X		
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst., 1954	Grémil bleu pourpre	Boraginacées	EN	LC	?	X		Art.1 P.
Bunium bulbocastanum (L., 1753)	Bunium noix-de-terre	Apiacées	LC	LC	?	X		
Caltha palustris (L., 1753)	Populage des marais	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib., 1901		Mousses, hépatiques et anthocérotes	LC	NE	LC	X		
Compylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen		Mousses, hépatiques et anthocérotes	LC	NE	LC	X		
Carex caryophyllea (Latourr., 1785)	Laîche caryophyllée	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex digitata (L., 1753)	Laîche digitée	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex pallescens (L., 1753)	Laîche pâle	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex pilulifera subsp. pilulifera (L., 1753)	Laîche à pilules	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex pseudocyperus (L., 1753)	Laîche faux souchet	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex strigosa (Huds., 1778)	Laîche maigre	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Carex tomentosa (L., 1767)	Laîche tomenteuse	Cypéracées	LC	LC	?	X		
Cichorium intybus (L., 1753)	Chicorée sauvage	Astéracées	LC	LC	LC	X		
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962	Orchis de Fuchs	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Daphne laureola (L., 1753)	Daphné lauréole	Thyméléacées	LC	LC	LC	X		
Dianthus armeria (L., 1753)	Œillet armérie	Caryophyllacées	LC	LC	?	X		
Digitalis lutea (L., 1753)	Digitale jaune	Plantaginacées	LC	LC	?	X		
Digitalis purpurea (L., 1753)	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X		
Digitalis purpurea var. purpurea (L., 1753)	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X		
Dipsacus pilosus (L., 1753)	Cardère poilue	Caprifoliacées	LC	LC	?	X		
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809	Helléborine rouge	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Erica cinerea (L., 1753)	Bruyère cendrée	Éricacées	NT	LC	LC			Art.1 P.
Euphrasia stricta (D. Wolff ex J.F. Lehm., 1809)	Euphraise raide	Orobanchacées	LC	LC	?	X		
Festuca heterophylla (Lam., 1779)	Fétuque hétérophylle	Poacées	LC	LC	LC	X		
Genista tinctoria (L., 1753)	Genêt des teinturiers	Fabacées	LC	LC	?	X		
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	Hélianthème nummulaire	Cistacées	LC	LC	?	X		
Helictochloa pratensis subsp. pratensis (L.) Romero Zarco, 2011	Avénule des prés	Poacées	LC	LC	?	X		
Helleborus foetidus (L., 1753)	Hellébore fétide	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc	Orchidées	LC	LC	LC	X		
Hypericum montanum (L., 1755)	Millepertuis des montagnes	Hypéricacées	VU	LC	?	X		
Isopyrum thalictroides (L., 1753)	Isopyre faux pigamon	Renonculacées	VU	LC	?	X		Art.1 P.
Koeleria macrantha subsp. macrantha (Ledeb.) Schult., 1824	Koelérie à grandes fleurs	Poacées	LC	LC	?	X		
Lactuca virosa (L., 1753)	Laitue sauvage	Astéracées	LC	LC	DD	X		
Leucojum vernum (L., 1753)	Nivéole de printemps	Amaryllidacées	NT	LC	LC	X		Art.1 P.
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799	Limodore à feuilles avortées	Orchidées	NT	LC	LC	X		Art.1 P.

[1] Liste rouge de la flore vasculaire et des bryophytes des Hauts-de-France (2019)
[2] Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexe V
[6] Liste des espèces végétales protégées en région Picardie : article 1
[6] Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : article 1

Lithospermum officinale (L., 1753)	Grémil officinal	Boraginacées	LC	LC	?	X	
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	Joncacées	LC	LC	?	X	
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore	Joncacées	LC	LC	?	X	
Luzula multiflora subsp. multiflora (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore	Joncacées	LC	LC	?	X	
Lythrum portula (L.) D.A. Webb, 1967	Salicaire pourpier	Lythracées	LC	LC	LC	X	
Malus sylvestris (Mill., 1768)	Pommier sauvage	Rosacées	LC	LC	DD	X	
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	Luzerne maculée	Fabacées	LC	LC	LC	X	
Medicago minima (L.) L., 1754	Petite luzerne	Fabacées	LC	LC	DD	X	
Melica nutans (L., 1753)	Mélique penchée	Poacées	NT	LC	?	X	
Melittis melissophyllum (L., 1753)	Mélitte à feuilles de mélisse	Lamiacées	EN	LC	?	X	
Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum (L., 1753)	Mélitte à feuilles de mélisse	Lamiacées	EN	LC	?	X	
Muscari neglectum (Guss. ex Ten. & Sangiov., 1841)	Muscari négligé	Asparagacées	LC	LC	?	X	
Myriophyllum verticillatum (L., 1753)	Myriophylle verticillé	Haloragacées	LC	LC	LC	X	
Najas marina subsp. marina (L., 1753)	Naïade marine	Hydrocharitacées	LC	LC	?	X	
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau	Orchidées	LC	LC	LC	X	
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Néottie ovale	Orchidées	LC	LC	LC		
Ononis pusilla (L., 1759)	Bugrane fluette	Fabacées	VU	LC	?	X	Art.1 P.
Ophrys apifera (Huds., 1762)	Ophrys abeille	Orchidées	LC	LC	LC		
Ophrys aranifera (Huds., 1778)	Ophrys araignée	Orchidées	NT	LC	?	X	Art.1 P.
Ophrys aranifera subsp. aranifera (Huds., 1778)	Ophrys araignée	Orchidées	NT	LC	?	X	Art.1 P.
Orchis mascula (L.) L., 1755	Orchis mâle	Orchidées	LC	LC	LC	X	
Orchis militaris (L., 1753)	Orchis militaire	Orchidées	LC	LC	LC	X	
Orchis purpurea (Huds., 1762)	Orchis pourpre	Orchidées	LC	LC	LC		
Orchis simia (Lam., 1779)	Orchis singe	Orchidées	VU	LC	LC	X	
Orobanche alba (Stephan ex Willd., 1800)	Orobanche du thym	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Orobanche gracilis (Sm., 1798)	Orobanche sanglante	Orobanchacées	VU	LC	?	X	
Orobanche picridis (F.W. Schultz, 1830)	Orobanche de la picride	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Orobanche teucrii (Holandre, 1829)	Orobanche de la germandrée	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood, 1964	Pétrorhagie prolifère	Caryophyllacées	LC	LC	?	X	
Phleum phleoides (L.) H. Karst., 1880	Fléole fausse fléole	Poacées	LC	LC	?	X	
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906	Sceau-de-Salomon odorant	Asparagacées	LC	LC	LC	X	
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons	Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes	LC	LC	?		
Potentilla verna (L., 1753)	Potentille printanière	Rosacées	LC	LC	?	X	
Pulsatilla vulgaris (Mill., 1768)	Anémone pulsatille	Renonculacées	NT	LC	NT	X	
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage	Rosacées	LC	LC	?	X	
Quercus pubescens (Willd., 1796)	Chêne pubescent	Fagacées	LC	LC	LC	X	
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe crête-de-coq	Orobanchacées	LC	LC	?	X	
Rumex acetosella (L., 1753)	Patience petite-oseille	Polygonacées	LC	LC	LC	X	
Ruscus aculeatus L., 1753)	Fragon piquant	Asparagacées	LC	LC	LC	X	An. V
Samolus valerandi (L., 1753)	Samole de Valérand	Primulacées	LC	LC	LC	X	
Saxifraga granulata (L., 1753)	Saxifrage granulée	Saxifragacées	NT	LC	?	X	
Scabiosa columbaria (L., 1753)	Scabieuse colombaire	Caprifoliacées	LC	LC	?	X	
Seseli montanum subsp. montanum (L., 1753)	Séséli des montagnes	Apiacées	LC	LC	?	X	
Silene otites (L.) Wibel, 1799	Silène à oreillettes	Caryophyllacées	VU	LC	?	X	
Sparganium emersum subsp. emersum (Rehmann, 1871)	Rubanier émergé	Typhacées	LC	LC	LC	X	
Succisa pratensis (Moench, 1794)	Succise des prés	Caprifoliacées	LC	LC	?		
Teucrium chamaedrys (L., 1753)	Germandrée petit-chêne	Lamiacées	LC	LC	LC	X	
Teucrium chamaedrys subsp. germanicum (F. Herm.) Rech.f., 1941	Germandrée petit-chêne	Lamiacées	LC	LC	LC	X	
Teucrium montanum (L., 1753)	Germandrée des montagnes	Lamiacées	LC	LC	LC	X	Art.1 P.
Thesium humifusum (DC., 1815)	Thésion couché	Santalacées	LC	LC	?	X	
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017	Sorbier alisier	Rosacées	LC	LC	LC	X	
Tortula subulata (Hedw., 1801)		Mousses, hépatiques et anthocérotes	LC	NE	LC	X	
Ulmus laevis (Pall., 1784)	Orme lisse	Ulmacées	?	LC	DD	X	Art.1 P.
Utricularia neglecta (Lehm., 1828)	Grande utriculaire	Lentibulariacées	LC	LC	?	X	
Verbascum blattaria (L., 1753)	Molène blattaire	Scrophulariacées	LC	LC	?	X	
Vincetoxicum hirundinaria (Medik., 1790)	Dompte-venin	Apocynacées	LC	LC	?	X	
Zannichellia palustris subsp. palustris (L., 1753)	Zannichellie des marais	Potamogétonacées	LC	LC	LC	X	

Tableau 43 - Avifaune d'intérêt patrimonial recensée dans le secteur « vallée du Thérain aval » entre 2020 et 2025


Espèce		État de conservation régional[1]	État de conservation métropolitain[2]	État de conservation européen[3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie[4]	Directive oiseaux[5]	Espèce réglementée[6]	Tendance des populations nicheuses métropolitaines[7]
***Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)**	Autour des palombes	EN	LC	LC	X		Art. 3 & 6	=
***Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)**	Épervier d'Europe	LC	LC	LC			Art. 3 & 6	?
***Acrocephalus schipoceus* (Hermann, 1804)**	Rousserole effarvatte	NT	LC	LC			Art. 3	=
***Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)**	Alouette des champs	VU	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)**	Martin-pêcheur	VU	VU	LC	X	An. I	Art. 3	?
***Anas acuta* (Linnaeus, 1758)**	Canard pilet	NA	NA	VU	X		Art. 3	NC
***Anas crecca* (Linnaeus, 1758)**	Sarcelle d'hiver	CR	VU	LC	X		Art. 3	?
***Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)**	Pipit farlouse	EN	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Apus apus* (Linnaeus, 1758)**	Martinet noir	LC	NT	NT	X		Art. 3	?
***Ardea alba* (Linnaeus, 1758)**	Grande Aigrette	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)**	Hibou des marais	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↘↗
***Asio otus* (Linnaeus, 1758)**	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC			Art. 3	?
***Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)**	Fuligule milouin	EN	VU	VU	X		Art. 3	?
***Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)**	Fuligule morillon	VU	LC	NT	X		Art. 3	↗
***Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)**	Pique bœufs	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Bubulcus ibis ibis* (Linnaeus, 1758)**	Pique bœufs	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)**	Chardonneret élégant	NT	VU	LC	X		Art. 3	=
***Cettia cetti* (Temminck, 1820)**	Bouscarle de Cetti	LC	NT	LC	X		Art. 3	=
***Childonias hybrida* (Pallas, 1811)**	Guifette moustac	NA	VU	LC		An. I	Art. 3	=
***Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)**	Verdier d'Europe	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)**	Cigogne blanche	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)**	Busard Saint-Martin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)**	Busard cendré	EN	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
***Columba oenas* Linnaeus, 1758**	Pigeon colombin	LC	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)**	Caille des blés	VU	LC	NT			Art. 3	↘
***Cuculus canorus* Linnaeus, 1758**	Coucou gris	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)**	Hirondelle de fenêtre	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)**	Pic épeiche	LC	LC	LC			Art. 3	↗
***Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)**	Pic mar	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)**	Pic épeichette	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)**	Pic noir	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=

[1] Liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I
[6] Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Articles 3 et 6
[7] Picardie Nature (2024)

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)	Bruant proyer	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)	Bruant zizi	EN	LC	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	EN	EN	LC	X		Art. 3	↘
Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	Faucon émerillon	NA	NA	VU		An. I	Art. 3	NC
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	VU	?	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Fulica atra (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	LC	LC	NT	X		Art. 3	=
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	CR	CR	VU	X		Art. 3	↘
Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle de cheminée	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	NT	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Locustella naevia (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	VU	NA	LC	X		Art. 3	↘
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	CR	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Mareca strepera (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	Guêpier d'Europe	VU	LC	LC	X		Art. 3	=
Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Milan noir	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Milan royal	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)	Bergeronnette des ruisseaux	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Motacilla flava (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Netta rufina (Pallas, 1773)	Nette rousse	NA	LC	LC	X		Art. 3	↗
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	CR	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR	NT	LC	X		Art. 3	=
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	NE	VU	LC		An. I	Art. 3	↗
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	VU	LC	LC				↘
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	EN	LC	LC	X		Art. 3	↗
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	EN	NT	LC	X		Art. 3	=
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Picus viridis (Linnaeus, 1758)	Pic vert	LC	LC	LC			Art. 3	↘
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	VU	LC	LC			Art. 3	?
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)	Bécasse des bois	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	Serin cini	VU	LC	LC	X		Art. 3	↘
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	VU	LC	LC	X		Art. 3	?
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)	Sterne pierregarin	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	EN	VU	VU	X		Art. 3	↘
Strix aluco (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte	LC	LC	LC			Art. 3	?
Sylvia borin (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	VU	NT	LC			Art. 3	↘
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	LC	LC	LC	X		Art. 3	↘
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)	Grive litorne	RE	LC	LC	X		Art. 3	?
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	NT	LC	LC			Art. 3	↭
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NT	NT	VU	X		Art. 3	?

Allonne

Mammifères



Allonne (60000) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Astéracées
- Laitue sauvage — *Lactuca virosa* (L., 1753)

Caprifoliacées
- Succise des prés — *Succisa pratensis* (Moench, 1794)

Fabacées
- Luzerne maculée — *Medicago arabica* (L.) Huds., 1762

Haloragacées
- Myriophylle verticillé — *Myriophyllum verticillatum* (L., 1753)

Hydrocharitacées
- Naïade marine — *Najas marina* (L., 1753) subsp. *marina*

Lamiacées
- Germandrée petit-chêne — *Teucrium chamaedrys* (L., 1753)

Lentibulariacées
- Utriculaire négligée — *Utricularia neglecta* (Lehm., 1828)

Orchidées
- Orchis bouc — *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826
- Orchis pourpre — *Orchis purpurea* (Huds., 1762)


Polygonacées
- Patience petite-oseille — *Rumex acetosella* (L., 1753)

Primulacées
- Samole de Valérand — *Samolus valerandi* (L., 1753)

Saxifragacées
- Saxifrage granulée — *Saxifraga granulata* (L., 1753)

Typhacées
- Rubanier émergé — *Sparganium emersum* (Rehmann, 1871) subsp. *emersum*

Allonne (60000) - Insectes



Allonne (60000) - Oiseaux # 1







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Braunt proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)

☆ Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)

Allonne (60000) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- Faucon hobereau *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)
- Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
- Bondrée apivore *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)

Rapaces nocturnes

- Hibou moyen-duc *Asio otus* (Linnaeus, 1758)
- Chouette hulotte *Strix aluco* (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Colombidés

- Pigeon colombin *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

Échassiers


- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Aigrette garzette *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)

Autres

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

N.B. *Certaines données concentrées dans le bois d'Aumont ne semblent pas être localisées de manière précise au vu de la présence d'espèces partageant différents biotopes. Les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*

Allonne (60000) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Pics


- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)


Autres oiseaux d'eau

- Martin-pêcheur *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (Linnaeus, 1758)
- Fuligule milouin *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Canard chipeau *Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)
- Nette rousse *Netta rufina* (Pallas, 1773)
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
- Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

N.B. *Certaines données concentrées dans le bois d'Aumont ne semblent pas être localisées de manière précise au vu de la présence d'espèces partageant différents biotopes. Les espèces sont tout de même présentes dans la commune.*


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Allonne (60000) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Allonne
Villers sur Thère
le Bois de la Grange
Bongenoult
les Coutumes
le Bois du Fecq
0
2
4 km
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties

Bailleul-sur-Thérain

Oiseaux



Bailleul-sur-Thérain (60930) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Pics

- Pic épeiche — *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar — *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette — *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir — *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert — *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Passereaux

- Rousserolle effarvatte — *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Pipit farlouse — *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant — *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti — *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe — *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre — *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée — *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer — *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant zizi — *Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)
- Bruant jaune — *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux — *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopièthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Alouette lulu *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Lézards, serpents, libellules et demoiselles







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Demoiselles

- Agrion délicat
  Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
- Agrion de Vander Linden
  Erythromma lindenii (Selys, 1840)

Libellules

- Orthétrum brun
  Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)


Lézards

- Lézard des murailles
  Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Serpents

- Vipère péliade
  Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Papillons, criquets, grillons et autres insectes







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Papillons

- Petite Violette — *Boloria dia* (Linnaeus, 1767)
- Fluoré — *Colias alfacariensis* (Ribbe, 1905)
- Argus frêle — *Cupido minimus* (Fuessly, 1775)
- Point de Hongrie — *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)
- Azuré des Cytises — *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)
- Azuré bleu-céleste — *Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775)
- Argus bleu-nacré — *Lysandra coridon* (Poda, 1761)
- Demi-Deuil — *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
- Grande Tortue — *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)

Grillons

- Grillon de sbois — *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)

Criquets


- Gomphocère tacheté — *Myrmeleotettix maculatus* (Thunberg, 1815)
- Œdipode turquoise — *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)
- Decticelle grisâtre — *Platycleis albopunctata* (Goeze, 1778)
- Criquet de la Palène — *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796)
- Decticelle carroyée — *Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)

Coléoptères

- Lucane cerf-volant — *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Flore # 1





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Apiacées

- Bunium noix-de-terre — *Bunium bulbocastanum* (L., 1753)
- Séséli des montagnes — *Seseli montanum* (L., 1753) subsp. *montanum*

Apocynacées

- Dompte-venin — *Vincetoxicum hirundinaria* (Medik., 1790)

Aracées

- Gouet d'Italie — *Arum italicum* (Mill., 1768)

Asparagacées

- Muscari négligé — *Muscari neglectum* (Guss. ex Ten. & Sangiov., 1841)

Astéracées

- Chicorée sauvage — *Cichorium intybus* (L., 1753)

Boraginacées

- Grémil officinal — *Lithospermum officinale* (L., 1753)

Brassicacées

- Arabette poilue — *Arabis hirsuta* (L.) Scop., 1772

Caprifoliacées

Flore-BailleulST

- Scabieuse colombaire — *Scabiosa columbaria* (L., 1753)

Caryophyllacées

- Pétrorhagie prolifère — *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964
- Silène otites — *Silene otites* (L.) Wibel, 1799

Cistacées

- Hélianthème nummulaire — *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., 1768

Cypéracées

- Laîche caryophyllée — *Carex caryophyllea* (Latourr., 1785)
- Laîche digitée — *Carex digitata* (L., 1753)
- Laîche tomenteuse — *Carex tomentosa* (L., 1767)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Flore # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Fabacées

- Genêt des teinturiers — *Genista tinctoria* (L., 1753)
- Luzerne maculée — *Medicago arabica* (L.) Huds., 1762
- Petite luzerne — *Medicago minima* (L., 1754)
- Bugrane fluette — *Ononis pusilla* (L., 1759)

Fagacées

- Chêne pubescent — *Quercus pubescens* (Willd., 1805)

Hypéricacées

- Millepertuis des montagnes — *Hypericum montanum* (L., 1755)

Lamiacées

- Bugle petit-pin — *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb., 1773 subsp. *chamaepitys*
- Germandrée petit-chêne — *Teucrium chamaedrys* (F.Herm.) Rech.f., 1941 subsp. *germanicum*
- Germandrée des montagnes — *Teucrium montanum* (L., 1753)

Orchidées

- Orchis pyramidal — *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817
- Helléborine rouge — *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser, 1809
- Orchis bouc — *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826
- Limodore avorté — *Limodorum abortivum* (L.) Sw., 1799
- Néottie nid-d'oiseau — *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817
- Ophrys araignée — *Ophrys aranifera* (Huds., 1778)
- Ophrys araignée — *Ophrys aranifera* (Huds., 1778) subsp. *aranifera*
- Orchis mâle — *Orchis mascula* (L.) L., 1755
- Orchis militaire — *Orchis militaris* (L., 1753)
- Orchis pourpre — *Orchis purpurea* (Huds., 1762)
- Orchis singe — *Orchis simia* (Lam., 1779)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Flore # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Orobanchacées

- Orobanche blanche *Orobanche alba* (Stephan ex Willd., 1800)
- Orobanche grêle *Orobanche gracilis* (Sm., 1798)
- Orobanche de la picride *Orobanche picridis* (F.W.Schultz, 1830)
- Orobanche de la germandrée *Orobanche teucrii* (Holandre, 1829)
- Rhinanthe crête-de-coq *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, 1777

Poacées

- Hélictochloa des prés *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco, 2011 subsp. *pratensis*
- *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult., 1824 subsp. *macrantha*
- Fléole fausse fléole *Phleum phleoides* (L.) H.Karst., 1880

Renonculacées

- Ancolie commune *Aquilegia vulgaris* (L., 1753) subsp. *vulgaris*
- Hellébore fétide *Helleborus foetidus* (L., 1753)
- Anémone pulsatille *Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768)

Rosacées

- Pommier sauvage *Malus sylvestris* (Mill., 1768)
- Potentille printanière *Potentilla verna* (L., 1753)
- Poirier commun *Pyrus communis* (L.) Ehrh., 1780 subsp. *pyraster*
- Sorbier alisier *Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017

Santalacées

- Thésion couché *Thesium humifusum* (DC., 1815)

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Chauve-souris







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris


- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)



Amphibiens

Bailleul-sur-Thérain (60930) - Amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)


Grenouilles

- Rainette verte
  Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
- Grenouille de Lessona
  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
- Grenouille rieuse
  Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
- Grenouille agile
  Rana dalmatina (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)


Tritons


- Triton palmé
  Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
- Triton crêté
  Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Bailleul-sur-Thérain (60930) - Habitats naturels et semi-naturels






Limites administratives
- Limite communale

Infrastructures de transport
- Routes principales
- Routes régionales
- Autres trypes de routes

Habitats naturels et semi-naturels
- Habitat aquatique sur substrat acide
- Habitat aquatique sur substrat basique
- Habitat cultivé
- Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Habitat minéral sur substrat acide
- Habitat minéral sur substrat basique
- Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
- Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
- Zones bâties


Hermes


Oiseaux



Hermes (60370) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Rapaces nocturnes

- Hibou moyen-duc *Asio otus* (Linnaeus, 1758)
- Chouette hulotte *Strix aluco* (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Bruant zizi *Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)

Hermes (60370) - Reptiles et amphibiens





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Serpents et lézards

- Orvet fragile
  Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
- Lézard des souches
  Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)
- Couleuvre à collier
  Natrix helvetica (Lacepède, 1789)

Crapauds et grenouilles


- Crapaud commun
  Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
- Grenouille agile
  Rana dalmatina (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)

Amphi-Hermes

- Triton palmé
  Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
- Salamandre tachetée
  Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
- Triton crêté
  Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Hermes (60370) - Papillons et criquets





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Papillons

- Petit Mars changeant
  Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Petite Violette
  Boloria dia (Linnaeus, 1767)
- Point de Hongrie
  Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
- Miroir
  Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
- Grande Tortue
  Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)


Criquets

- Œdipode turquoise
  Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)



Hermes (60370) - Libellules et autres insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Libellules

- Cordulégastre annelé
  Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)


Coléoptères


- Carabe des arbres
  Carabus intricatus (Linnaeus, 1761)
- Lucane cerf-volant
  Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Papillons de nuit

- Écaille fermière
  Arctia villica (Linnaeus, 1758)
- Grand Paon de nuit
  Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hermes (60370) - Flore # 1





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amaryllidacées

- Ail maraîcher — *Allium oleraceum* (L., 1753)
- Ail des ours — *Allium ursinum* (L., 1753)
- Nivéole de printemps — *Leucojum vernum* (L., 1753)

Apocynacées

- Dompte-venin — *Vincetoxicum hirundinaria* (Medik., 1790)

Asparagacées

- Sceau-de-Salomon odorant — *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906
- Fragon piquant — *Ruscus aculeatus* (L., 1753)

Astéracées

- Chicorée sauvage — *Cichorium intybus* (L., 1753)

Boraginacées

- Grémil pourpre bleu — *Buglossoides purpurocaerulea* (L.) I.M.Johnst., 1954
- Grémil officinal — *Lithospermum officinale* (L., 1753)

Brassicacées

- Arabette hérissée — *Arabis hirsuta* (L.) Scop., 1772

Caprifoliacées

- Scabieuse colombaire — *Scabiosa columbaria* (L., 1753)

Caryophyllacées


- Digitale jaune — *Digitalis lutea* (L., 1753)
- Digitale pourpre — *Digitalis purpurea* (L., 1753)
- Digitale pourpre — *Digitalis purpurea* (L., 1753) var. *purpurea*

Cypéracées

- Laîche digitée — *Carex digitata* (L., 1753)
- Laîche pâlissante — *Carex pallescens* (L., 1753)
- Laîche à pilules — *Carex pilulifera* (L., 1753) subsp. *pilulifera*
- Laîche maigre — *Carex strigosa* (Huds., 1778)

Hermes (60370) - Flore # 2









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Fabacées

- Astragale à feuilles de Réglisse *Astragalus glycyphyllos* (L., 1753)
- Luzerne maculée *Medicago arabica* (L.) Huds., 1762

Fagacées

- Chêne pubescent *Quercus pubescens* (Willd., 1805)

Hypéricacées

- Millepertuis des montagnes *Hypericum montanum* (L., 1755)

Joncacées

- Luzule de Forster *Luzula forsteri* (Sm.) DC., 1806
- Luzule multiflore *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811
- Luzule multiflore *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej., 1811 subsp.*multiflora*

Lamiacées

- Mélitte à feuilles de mélisse *Melitis melissophyllum* (L., 1753)
- Mélitte à feuilles de mélisse *Melitis melissophyllum* (L., 1753 subsp.) *melissophyllum*

Lythracées


- Salicaire pourpier *Lythrum portula* (L.) D.A.Webb, 1967

Mousses, hépatiques et anthocérotes

- *Calypogeia muelleriana* (Schiffn.) Müll.Frib., 1901
- *Campylium stellatum* (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
- *Conocephalum conicum* (L.) Dumort., 1822
- *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt., 1869
- *Encalypta streptocarpa* (Hedw., 1801)
- *Tortula subulata* (Hedw., 1801)

Hermes (60370) - Flore # 3









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Orchidées

- Orchis pyramidal — *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817 var. *pyramidalis*
- Orchis de Fuchs — *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, 1962
- Orchis bouc — *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826
- Néottie nid-d'oiseau — *Neottia nidus-avis* (L.) Rich., 1817
- Néottie ovale — *Neottia ovata* (L.) Bluff & Fingerh., 1837
- Ophrys abeille — *Ophrys apifera* (Huds., 1762)
- Orchis pourpre — *Orchis purpurea* (Huds., 1762)

Orobanchacées

- Euphraise raide — *Euphrasia stricta* (D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809)
- Orobanche de la picride — *Orobanche picridis-hieraciolds* (Holandre, 1829)

Poacées

- Fétuque hétérophylle — *Festuca heterophylla* (Lam., 1779)
- Mélique penchée — *Melica nutans* (L., 1753)

Renonculacées

- Ancolie commune — *Aquilegia vulgaris* (L., 1753) subsp. *vulgaris*
- Populage des marais — *Caltha palustris* (L., 1753)
- Hellébore fétide — *Helleborus foetidus* (L., 1753)
- Isopyre faux pigamon — *Isopyrum thalictroides* (L., 1753)

Rosacées

- Pommier sauvage — *Malus sylvestris* (Mill., 1768)
- Sorbier alisier — *Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017

Scrofulariacées

- Molène blattaire — *Verbascum blattaria* (L., 1753)

Thymélacées


- Daphné lauréole — *Daphne laureola* (L., 1753)

Ulmacées

- Orme lisse — *Ulmus laevis* (Pall., 1784)

Hermes (60370) - Chauves-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris


- Sérotine commun
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein
  Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées
  Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
  Murin de Brandt
  Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
  Murin d'Alcathoe
  Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)
- Oreillard roux
  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
- Grand rhinolophe
  Rhinolophus ferrumequinum(Schreber, 1774)



Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Habitats naturels et semi-naturels



Oiseaux

Rochy-Condé (60510) - Oiseaux # 1





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Autour des palombes *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
- Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- Faucon hobereau *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)
- Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
- Bondrée apivore *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)

Rapaces nocturnes

- Chouette effraie *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Échassiers

- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux d'eau

- Martin-pêcheur *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)

Autres

- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Rochy-Condé (60510) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Rochy-Condé (60510) - Autres espèces patrimoniales





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Libellules et demoiselles

- Aeschne affine — *Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)
- Agrion délicat — *Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789)
- Cordulégastre annelé — *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)
- Gomphe à forceps — *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758)
- Orthétrum bleuissant — *Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798)

Poissons

- Anguille européenne — *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758)
- Vandoise — *Leuciscus leuciscus* (Linnaeus, 1758)

Papillons

- Petit Mars changeant — *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Grande Tortue — *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)

Serpents

- Couleuvre à collier — *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)


Chauves-souris


- Pipistrelle commune — *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)

Grenouilles

- Grenouille rieuse — *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771)
- Grenouille agile — *Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)
- Grenouille rousse — *Rana temporaria* (Linnaeus, 1758)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales





Rochy-Condé (60510) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Rochy-Condé
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
0
1
2 km
FONDS VERT


Therdonne

Oiseaux



Therdonne (60510) - Oiseaux # 2





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces nocturnes

- Épervier d'Europe
  Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
- Busard Saint-Martin
  Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
- Faucon émerillon
  Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
- Faucon pèlerin
  Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
- Faucon hobereau
  Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
- Milan noir
  Milvus migrans (Boddaert, 1783)
- Bondrée apivore
  Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Rapaces nocturnes

- Hibou des marais
  Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
- Chouette hulotte
  Strix aluco (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie
  Tyto alba (Scopoli, 1769)

Therdonne (60510) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Pics


- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Passereaux

- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Therdonne (60510) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Astéracées

- Chicorée sauvage *Cichorium intybus* (L., 1753)

Caprifoliacées

- Cardère poilue *Dipsacus pilosus* (L., 1753)

Cypéracées

- Laîche faux souchet *Carex pseudocyperus* (L., 1753)

Fabacées

- Luzerne maculée *Medicago arabica* (L.) Huds., 1762

Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes

- Polystic à aiguillons *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799

Haloragacées

- Myriophylle verticillé *Myriophyllum verticillatum* (L., 1753)

Lentibulariacées

- Utriculaire négligée *Utricularia neglecta* (Lehm., 1828)

Orchidées

- Orchis pyramidal *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817 var. *pyramidalis*
- Orchis bouc *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826

Potamogetonacées

- Zannichellie des marais *Zannichellia palustris* (L., 1753) subsp. *palustris*

Primulacées

- Samole de Valérand *Samolus valerandi* (L., 1753)

Rosacées

- Benoîte des ruisseaux *Geum rivale* (L., 1753)
- Samole de Valérand *Samolus valerandi* (L., 1753)

Typhacées

- Rubanier émergé *Sparganium emersum* (Rehmann, 1871) subsp.*emersum*

Autres espèces patrimoniales

Therdonne (60510) - Autres espèces patrimoniales





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin de Daubenton *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Noctule commune *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)

Reptiles

- Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)
- Lézard des murailles *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)


Criquets

- Criquet marginé *Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)


Amphibiens

- Grenouille agile *Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Warluis

Oiseaux



Warluis (60430) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Rousserolle effarvatte — *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs — *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse — *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant — *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti — *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe — *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre — *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée — *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer — *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant zizi — *Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)
- Bruant jaune — *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux — *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse — *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle — *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Gorgebleue à miroir — *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette des ruisseaux — *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Bergeronnette printanière — *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Traquet motteux — *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique — *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis — *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine — *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage — *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Serin cini — *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins — *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde — *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne — *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Warluis (60430) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers


Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Autres oiseaux d'eau

- Martin-pêcheur *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (Linnaeus, 1758)
- Fuligule milouin *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
- Fuligule morillon *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)
- Bernache nonnette *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*(Linnaeus, 1758)
- Canard chipeau *Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)
- Nette rousse *Netta rufina* (Pallas, 1773)
- Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
- Canard souchet *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758)
- Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758)


Warluis (60430) - Papillons, criquets et grillons
Merlemont
Mattencourt
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Warluis
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Papillons
Petit Mars changeant
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Grand Mars changeant
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Collier-de-corail
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Azuré des Cytises
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Argus bleu-nacré
Lysandra coridon (Poda, 1761)
Demi-Deuil
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Criquets et grillons
Caloptène italien
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
Grillon des bois
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Œdipode turquoise
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)
Criquet noir-ébène
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)
Decticelle grisâtre
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
0
1
2 km

Warluis (60430) - Lebellules et demoiselles, amphibiens







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Libellules et demoiselles

Demoiselles

- Aeschne affine — *Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)
- Agrion délicat — *Ceriagrion tenellum* (Villers, 1789)
- Agrion mignon — *Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842)
- Agrion de Vander Linden — *Erythromma lindenii* (Selys, 1840)
- Leste brun — *Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)

Libellules

- Cordulégastre annelé — *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)
- Orthétrum bleuissant — *Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798)

Amphibiens

Crapauds

- Crapaud commun — *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)


Tritons et salamandres


- Triton palmé — *Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)
- Triton ponctué — *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758)
- Salamandre tachetée — *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758)
- Triton crêté — *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768)

Grenouilles


- Grenouille de Lessona — *Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882)
- Grenouille agile — *Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)

Warluis (60430) - Chauves-souris et reptiles







Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels



Richesse spécifique du secteur Thérain aval



Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique de la vallée du Thérain aval



Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) par M. Yves Lacoutière




Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) par M. Loïck Sosten




Boutonnière du Bray

Situé dans la partie sud-est de l'agglomération du Beauvaisis, le secteur de la boutonnière du Bray compte 7 040 habitants et occupe une superficie de 83,5 km² (presque 15 % du territoire intercommunal). Les communes concernées par ce découpage territorial repris du plan local d'urbanisme intercommunal sont les suivantes :

- Auneuil ;
- Auteuil ;
- Aux Marais ;
- Berneuil-en-Bray ;
- Frocourt ;
- Goincourt ;
- Saint-Léger-en-Bray ;
- Saint-Martin-le-Nœud.



Les habitats cultivés représentent un peu moins de la moitié du territoire du secteur avec 40,5 km² environ (48,5 %). Le deuxième mode d'occupation du sol en termes de superficie concerne habitats forestiers qui représentent environ 20 km² (24 %). Ce secteur présente la plus grande superficie d'habitats ouverts parmi tous les secteurs du Beauvaisis avec 15,8 km² (18,9 %). Les surfaces bâties représentent un total de 5,4 km² (6 %), ce qui en fait un des secteurs parmi les moins urbanisés. Enfin, les zones humides couvrent environ 3% de la surface du territoire pour une superficie totale de 2,6 km². 118 mares ont été recensées dans le secteur en 2024, ce qui représente tout de même une bonne part des 500 mares actuellement connues dans le Beauvaisis. Ce secteur se caractérise par paysage beaucoup plus bocager par rapport au reste du territoire en raison de pratiques agricoles tournées davantage vers l'élevage bovin (production laitière et de viande) avec une importante surface de prairies entrecoupées de haies. Cela n'est pas sans incidences sur les communautés végétales et animales qu'on y retrouve.



La présence de nombreuses mares, dont la plupart se situe en contexte prairial, et de multiples petits affluents du Thérain est notamment favorable pour les amphibiens. On retrouve 13 des 14 espèces d'amphibiens dont la présence est avérée dans le Beauvaisis. C'est d'ailleurs le seul secteur où ont été inventoriées les deux espèces d'amphibiens ayant le statut de conservation le plus défavorable à l'échelle locale, à savoir la Rainette verte *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) et le Triton crêté *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768), espèces peu communes toutes deux classés vulnérables en Picardie. Le maintien d'un réseau de mares fonctionnelles et interconnectées - le cas échéant – constitue un enjeux écologique principal pour ce secteur afin de conserver ces deux espèces dont l'état de conservation des populations est considéré « défavorable mauvais » selon les informations de l'Inventaire national du patrimoine naturel.

En revanche, ce secteur est nettement moins concerné par la présence de plan d'eau comparé aux secteurs de Beauvais, du Thérain-Avelon ou de la vallée du Thérain aval. Cela se ressent notamment du point de vue de la communauté d'espèces d'oiseaux. En effet, certaines espèces de petits échassiers limicoles à forts enjeux de conservation ne sont pas retrouvées par rapport aux secteurs susmentionnés. S'il est vrai qu'il s'agit d'espèce occupant davantage le littoral de la Manche, il n'en reste pas moins que certaines zones humides du Beauvaisis accueillent chaque année quelques effectifs. On pense notamment au Courlis cendré *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), l'Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758), la Spatule blanche *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758) ou encore des espèces du genre *Podiceps* (les grèbes), *Anas* (canards) ou *Spatula* (autres types d'oiseaux d'eau échassiers et limicoles). On note par contre l'observation d'un Râle des genêts *Crex crex* (Linnaeus, 1758) dans ce secteur. Fréquentant les prairies de fauche ou les zones marécageuses, il s'agit d'une espèce classée localement « en danger critique d'extinction » pour les populations nicheuses. Cette espèce n'a été recensée dans aucun autre secteur du Beauvaisis. Mais nous rappelons qu'il s'agit là de données opportunistes car aucun inventaire complémentaire d'oiseaux nicheurs n'a y été réalisé. 84 espèces d'oiseaux nicheurs et non nicheurs considérés comme d'intérêt patrimonial y ont été recensés ces 5 dernières années parmi les 145 espèces comptabilisées pour la même période.

La biodiversité des Odonates du secteur semble peu satisfaisante malgré des inventaires complémentaires conduits en 2024. Parmi les 29 espèces d'odonates recensées dans ce secteur entre 2020 et 2025, soit presque la moitié des 61 espèces connues à l'heure actuelle en Picardie[8], 9 sont considérées comme patrimoniales ou présentant un enjeu de conservation avéré dans le Beauvaisis. Des populations du vulnérable Agrion de mercure *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840) semblent se maintenir dans ce secteur. Notons que cette espèce fait partie du Plan National d'Actions en faveur des Odonates puisque les modifications des milieux adjacents constituent encore une menace pour l'espèce (retournement et mise en culture des prairies permanentes, surpâturage, reboisement…). Ces menaces favorisent ainsi la fragmentation des habitats et fragilisent d'une manière générale les populations de cette espèce, très peu mobile.

À propos des mammifères recensés dans cette partie du territoire, on observe peu ou prou la même communauté de Chiroptères que dans les autres secteurs du Beauvaisis mais on note la présence supplémentaire de la rare Barbastelle d'Europe *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774), en danger au niveau local et non signalée jusqu'à maintenant dans les 5 autres secteurs selon les données récoltées. C'est également le cas pour le Petit Rhinolophe *Rhinolophus hipposideros* (Borkhausen, 1797) à la présence très localisée en Picardie. On note le signalement d'un Crossope aquatique *Neomys fodiens* (Pennant, 1771), espèce de micromammifère semi-aquatique à enjeux de conservation puisque considérée comme « quasi-menacée » à l'échelle locale. La découverte en 2025 d'un Crossope aquatique dans une pelote de rejection d'une Chouette effraie vivant à l'écospace de la Mie-au-Roy montre que cette espèce est encore bel et bien présente dans les milieux aquatiques environnant du secteur de Beauvais. Et cela contrairement au Campagnol amphibie *Arvicola sapidus* (Miller, 1908), autre espèce à enjeux de conservation importants à l'échelle locale dans la catégorie « micromammifères semi-aquatiques » et qui semble avoir disparu du Beauvaisis malgré de récentes recherches dans les milieux aquatiques du secteur de Beauvais en 2024. Mais il n'est pas impossible que cette espèce soit recontactée à l'avenir dans d'autres parties du territoire de l'agglomération. De belles surprises concernant cette espèce ne sont donc pas à exclure !

Concernant les reptiles, on retrouve les 3 espèces de serpents[9] dont la présence est avérée en Picardie mais certains lézards n'ont pas été recensés ces 5 dernières années dans ce secteur qui n'a pas fait l'objet d'inventaires complémentaires dans le cadre de l'ABC. 3 espèces sur les 5 qui côtoient actuellement la Picardie ont été recensées, sans observations des deux espèces de Lacertidés que sont le lézard agile *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758) ou le Lézard à deux raies *Lacerta bilineata* (Daudin, 1802). La richesse spécifique des lézards y est donc très certainement sous-estimée.

Du point de vue des Lépidoptères, 12 espèces patrimoniales ont été recensées entre 2020 et 2025 parmi les 46 espèces comptabilisées dans le secteur dont l'observation d'une espèce d'Azuré considérée actuellement éteinte en Picardie : l'Azuré de L'Esparcette *Polyommatus thersites* (Cantener, 1835). Si cette information est à prendre avec beaucoup de recul malgré la validité de la donnée, de potentielles observations à l'avenir pourraient avérer cette présence et faire du Beauvaisis un élément clef pour la sauvegarde de cette espèce au niveau régional !

Seules deux espèces patrimoniales d'Orthoptères ont été recensées dans ce secteur, et cela malgré la conduite d'inventaires complémentaires dans la commune de Saint-Léger-en-Bray. La biodiversité des criquets, grillons et sauterelles du secteur est là encore sous-estimée car tous les milieux intéressants n'ont pas été suivis. Les zones humides du secteur pourraient très bien abriter des individus d'espèces à forts enjeux de conservations comme le vulnérable Conocéphale des roseaux *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), signalé non loin à Rainvillers en 2024 dans le secteur du Thérain-Avelon.

Enfin, en ce qui concerne la flore - dont aucun inventaire complémentaire n'a été effectué pour ce secteur - parmi les 181 espèces qui y ont été recensées figurent 55 espèces patrimoniales.

Les cartes et les tableaux suivants permettent d'identifier et de localiser les espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation pour chacune des communes qui composent le secteur.

[8] Liste rouge des Odonates de Picardie – Picardie Nature (2017)

[2] Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Picardie – Picardie Nature (2017)

Coteaux crayeux et pelouses sèches de la boutonnière du Bray, haut lieu de biodiversité !

Certains coteaux crayeux du secteur accueillent une biodiversité intéressante. C'est notamment le cas de la Butte des Marais, situé dans la commune d'Aux Marais. Ce larris abrite des communautés végétales et animales forts intéressantes et caractéristiques de ce type de milieu secs et bien exposés. Il s'agit d'ailleurs de la zone où la richesse spécifique est parmi la plus élevée du territoire communal. Les larris d'Auteuil n'échappent pas non plus à la règle et sont une composante du site Natura 2000 « FR2200371 Cuesta du Bray », reconnu pour abriter des espèces à enjeux de conservation à différentes échelles territoriales. Le Mont Florentin, situé dans la commune de Berneuil-en-Bray, est un site d'intérêt régional pour la faune et la flore de ces milieux et figure aussi parmi l'un des derniers larris fonctionnels du Pays de Bray. Il s'agit d'une propriété communale préservée et gérée par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Il s'agit également de la maille concentrant le plus d'espèces patrimoniales à l'échelle de la commune.



Vue sur la commune d'Auteuil depuis le larris intégrant le site Natura 2000 « Cuesta du Bray »



Versant nord du Mont Florentin à Berneuil-en-Bray



Anémone pulsatille *Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768), plante des pelouses sèches quasi-menacée en Hauts-de-France

Au bois de Belloy, il y en a pour tous les goûts !

Le secteur de la Boutonnière du Bray est concerné par la présence du Bois de Belloy, reconnue zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, en très grande partie communale et dont la majeure partie occupe le territoire de la commune d'Aux Marais. Ce boisement vallonné abrite une faune très intéressante avec des espèces patrimoniales issues de divers taxons. En plus des espèces typiquement forestières, on y retrouve aussi des espèces de zones humides, présentes au sein même du bois ou à proximité immédiate. Ainsi, des larves de tritons et de Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) ont été aperçues dans certaines ornières laissées par les engins d'exploitation forestière. Il n'est pas rare d'observer ça et là au sein du boisement des vols d'odonates. Un inventaire exhaustif de la faune et de la flore de ce boisement permettrait d'évaluer plus précisément le degré de patrimonialité de cet espace naturel à fort potentiel.



Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) en fin de phase larvaire photographiée dans une ornière du bois de Belloy.



Digitale pourpre *Digitalis purpurea* (L., 1753), espèce floristique d'intérêt patrimonial dans le Beauvaisis présente dans le bois de Belloy.



À l'orée du bois de Belloy, odonates en veux-tu en voilà ! (proverbe de l'ABC du Beauvaisis)

Les cavités de Saint-Martin-le-Nœud, terrain de jeu pour chiroptérologues

Le secteur de la boutonnière du Bray est également concerné par la présence du site Natura 2000 Larris-Millet dans la commune de Saint-Martin-le-Nœud, reconnu pour ses cavités abritant des populations relativement importantes de chauves-souris. Chaque année, des comptages menés par des chiroptérologues et des bénévoles de diverses associations naturalistes locales permettent d'estimer les effectifs des populations qu'on y retrouve et ainsi d'estimer les variations pluriannuelles de ces populations. Il s'agit donc d'un site d'hivernage et d'une station très importante pour le suivi des populations de chauves-souris de la région. Des animations envers le grand public y sont chaque année proposées pour sensibiliser autour de la conservation de ces mammifères protégés et dont la plupart présentent des états de conservation peu satisfaisants à différentes échelles territoriales.



Grand Rhinolophe *Hinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) photographié dans les cavités du site Natura 2000 « Larris-Millet ».



Lac souterrain comme il en existe plusieurs dans les cavités du Larris-Millet.

Tableau 44 - Mammifères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)**	Barbastelle d'Europe	EN	LC	VU	X	Art. 2	An. II & IV	R
***Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)**	Sérotine commune	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Martes martes* (Linnaeus, 1758)**	Martre	NT	LC	LC	X			AC
***Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)**	Murin d'Alcathoe	DD	LC	NT		Art. 2	An. IV	-
***Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Bechstein	VU	NT	VU	X	Art. 2	An. IV	PC
***Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)**	Murin de Daubenton	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	C
***Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)**	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)**	Grand Murin	EN	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)**	Murin à moustaches	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)**	Murin de Brandt	DD	LC	LC		Art. 2	An. IV	-
***Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)**	Murin de Natterer	LC	LC	LC		Art. 2	An. IV	AC
***Neomys fodiens* (Pennant, 1771)**	Crossope aquatique	NT	LC	LC	X	Art. 2		PC
***Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)**	Noctule de Leisler	NT	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	AR
***Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)**	Noctule commune	VU	VU	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)**	Pipistrelle de Kuhl	DD	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	-
***Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)**	Pipistrelle de Nathusius	NT	LC	LC		Art. 2	An. IV	PC
***Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)**	Pipistrelle commune	LC	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	TC
***Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)**	Oreillard roux	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)**	Oreillard gris	DD	LC	NT	X	Art. 2	An. IV	-
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. II & IV	AC
Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. II & IV	AC
***Rhinolophus hipposideros* (Borkhausen, 1797)**	Petit rhinolophe	NT	LC	LC	X	Art. 2	An. II & IV	AC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7]Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 45 – Lépidoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]
***Apatura iris* (Linnaeus, 1758)**	Grand Mars changeant	VU	LC	LC	X	
***Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)**	Collier-de-Corail	LC	LC	LC		
***Boloria dia* (Linnaeus, 1767)**	Petite Violette	NT	LC	LC		
***Colias alfacariensis* (Ribbe, 1905)**	Fluoré	NT	LC	LC	X	
***Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)**	Point de Hongrie	NT	LC	LC		
***Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758)**	Lucine	EN	LC	LC	X	
***Lysandra coridon* (Poda, 1761)**	Argus bleu-nacré	NT	LC	LC		
***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**	Demi-Deuil	LC	LC	LC		
***Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)**	Grande Tortue	NT	LC	LC		
***Polyommatus thersites* (Cantener, 1835)**	Azuré de L'Esparcette	RE	LC	LC		
***Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758)**	Thécla du Prunier	NT	LC	LC	X	
***Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775)**	Hespérie du Chiendent	EN	LC	NT		

[1] Liste rouge des papillons de jour des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, RE : considéré éteint, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 46 - Orthoptères d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Espèce réglementée	Indice de rareté [4]
***Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773)**	Criquet marginé	LC	NE	LC	X		AR
***Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792)**	Grillon des bois	LC	NE	LC			C

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Picardie Nature (2024)
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 47 - Reptiles d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]
***Anguis fragilis* (Linnaeus, 1758)**	Orvet fragile	LC	LC	LC		Art. 3	
***Coronella austriaca* (Laurenti, 1768)**	Coronelle lisse	VU	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
***Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)**	Couleuvre à collier	LC	LC	LC	X	Art. 2	
***Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)**	Lézard des murailles	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV
Vipera berus (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	EN	VU	LC	X	Art. 2	
***Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)**	Lézard vivipare	LC	LC	LC		Art. 3	

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Articles 2 & 3
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)

Tableau 48 - Odonates d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820)**	Aeschne affine	LC	LC	LC	X			AR
***Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X			C
***Calopteryx virgo virgo* (Linnaeus, 1758)**	Caloptéryx vierge	LC	LC	LC	X			C
***Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840)**	Agrion de Mercure	VU	LC	?	X	Art.3	An. II	AR
***Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842)**	Agrion mignon	LC	LC	LC	X			PC
***Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)**	Cordulégastre annelé	NT	LC	LC	X			PC
***Lestes barbarus* (Fabricius, 1798)**	Leste sauvage	NT	LC	LC	X			AR
***Orthetrum brunneum* (Boyer de Fonscolombe, 1837)**	Orthétrum brun	LC	LC	LC	X			PC
***Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)**	Leste brun	LC	LC	LC	X			AC

[1] Liste des espèces d'odonates de Picardie avec statuts de rareté et de menace - mise à jour 06/12/13 (Picardie Nature - https://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/Liste_espece_et_statuts_061213.pdf)
[2] Liste rouge des libellules et demoiselles de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[7] Picardie Nature (2024)

Tableau 49 – Autres insectes d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional	État de conservation métropolitain [1]	État de conservation européen [2]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [3]	Directive Habitats-Faune-Flore [4]	Indice de rareté [5]
***Cerambyx scopolii* (Fuessly, 1775)**	Petit Capricorne	?	NE	LC			PC

[1] Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)
[2] Liste rouge européenne des espèces menacées
[3] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[4] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[5] Picardie Nature (2024)

Tableau 50 - Amphibiens d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Espèce réglementée [5]	Directive Habitats-Faune-Flore [6]	Indice de rareté [7]
***Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768)**	Alyte accoucheur	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)**	Crapaud commun	LC	LC	LC		Art. 3		C
***Hyla arborea* (Linnaeus, 1758)**	Rainette verte	VU	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	PC
***Ichthyosaura alpestris* (Laurenti, 1768)**	Triton alpestre	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Ichthyosaura alpestris alpestris* (Laurenti, 1768)**	Triton alpestre	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Lissotriton helveticus* (Razoumowsky, 1789)**	Triton palmé	LC	LC	LC		Art. 3		AC
***Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758)**	Triton ponctué	NT	NT	LC	X	Art. 3		AC
***Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882)**	Grenouille de Lessona	DD	NT	LC	X	Art. 2	An. IV	?
***Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771)**	Grenouille rieuse	NA	LC	LC		Art. 3	An. V	?
***Rana dalmatina* (Fitzinger *in* Bonaparte, 1838)**	Grenouille agile	LC	LC	LC	X	Art. 2	An. IV	AC
***Rana temporaria* (Linnaeus, 1758)**	Grenouille rousse	LC	LC	?		Art. 4	An. V	C
***Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758)**	Salamandre tachetée	NT	LC	VU	X	Art. 3		PC
***Triturus cristatus* (Laurenti, 1768)**	Triton crêté	VU	NT	LC	X	Art. 2	An II &. IV	PC

[1] Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie (2016)
[2] Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : articles 2, 3 & 4
[6] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : annexes II, IV & V
[7]Clicnat
Indice de Rareté - **TC** : Très Commun, **C** : Commun, **AC** : Assez Commun, **PC** : Peu commun, **AR** : Assez Rare, **R** : Rare, **TR** : Très Rare, **E** : Exceptionnel

Tableau 51 - Flore vasculaire et fougères d'intérêt patrimonial recensées dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025

Espèce		Famille	État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Hauts-de-France et/ou Picardie [4]	Directive Habitat-Faune-Flore [5]	Espèce réglementée [6]
***Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis* (L.) Rich., 1817**	Orchis pyramidal	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Aquilegia vulgaris* (L., 1753)**	Ancolie commune	Renonculacées	LC	LC	DD	X		
***Arum italicum* (Mill., 1768)**	Gouet d'Italie	Aracées	NA	LC	?	X		
***Avenella flexuosa subsp. flexuosa* (L.) Drejer, 1838**	Canche flexueuse	Poacées	LC	NE	?	X		
***Betonica officinalis subsp. officinalis* (L., 1753)**	Bétoine officinale	Lamiacées	LC	LC	LC	X		
***Blechnum spicant* (L.) Roth, 1794**	Blechne en épi	Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes	LC	LC	LC	X		
***Buxus sempervirens* (L., 1753)**	Buis sempervirent	Buxacées	LC	LC	LC	X		
***Callitriche hamulata* (Kütz. ex W.D.J. Koch, 1837)**	Callitriche à crochets	Plantaginacées	LC	LC	?	X		
***Caltha palustris* (L., 1753)**	Populage des marais	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Campanula glomerata* (L., 1753)**	Campanule agglomérée	Campanulacées	LC	LC	?	X		
***Carex acuta* (L., 1753)**	Laîche aiguë	Cypéracées	LC	LC	LC	X		
***Carex caryophyllea* (Latourr., 1785)**	Laîche caryophyllée	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex leporina var. leporina* (L., 1753)**	Laîche patte-de-lièvre	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex pallescens* (L., 1753)**	Laîche pâle	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex pilulifera subsp. pilulifera* (L., 1753)**	Laîche à pilules	Cypéracées	LC	LC	?	X		
***Carex vesicaria* (L., 1753)**	Laîche vésiculeuse	Cypéracées	LC	LC	LC	X		
***Cichorium intybus* (L., 1753)**	Chicorée sauvage	Astéracées	LC	LC	LC	X		
***Colchicum autumnale* (L., 1753)**	Colchique d'automne	Colchicacées	LC	LC	LC	X		
***Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó, 1962**	Orchis de Fuchs	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, 1962**	Orchis tacheté	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Digitalis purpurea* (L., 1753)**	Digitale pourpre	Plantaginacées	LC	LC	LC	X		
***Euphorbia dulcis subsp. incompta* (Ces.) Hyman, 1890**	Euphorbe pourprée	Euphorbiacées	NT	LC	?	X		
***Festuca heterophylla* (Lam., 1779)**	Fétuque hétérophylle	Poacées	LC	LC	LC	X		
***Ficaria verna* (Huds., 1762)**	Ficaire printanière	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Galium palustre* (L., 1753)**	Gaillet des marais	Rubiacées	LC	LC	?	X		
***Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912**	Gentiane d'Allemagne	Gentianacées	NT	LC	?	X		
***Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng., 1826**	Orchis bouc	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Hylotelephium telephium* (L.) H. Ohba, 1977**	Orpin téléphium	Crassulacées	NT	LC	?	X		
***Hypericum pulchrum* (L., 1753)**	Millepertuis élégant	Hypéricacées	LC	LC	?	X		
***Iris foetidissima* (L., 1753)**	Iris fétide	Iridacées	LC	LC	?	X		
***Juncus acutiflorus* (Ehrh. ex Hoffm., 1791)**	Jonc à fleurs aiguës	Joncacées	LC	LC	LC	X		
***Juncus submodulosus* (Schrank, 1789)**	Jonc à fleurs obtuses	Joncacées	LC	LC	LC	X		
***Luzula congesta* (Thuill.) Lej., 1811**	Luzule ramassée	Joncacées	LC	LC	?	X		
***Lychnis flos-cuculi* (L., 1753)**	Lychnide fleur-de-coucou	Caryophyllacées	LC	LC	?	X		
***Lythrum portula* (L.) D.A. Webb, 1967**	Salicaire pourpier	Lythracées	LC	LC	LC	X		
***Medicago arabica* (L.) Huds., 1762**	Luzerne maculée	Fabacées	LC	LC	LC	X		
***Molinia caerulea* (L.) Moench, 1794**	Molinie bleue	Poacées	LC	LC	?	X		
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Myosotis cespiteux	Boraginacées	LC	LC	?	X		
Ophrys insectifera (L., 1753)	Ophrys mouche	Orchidées	LC	LC	LC	X		
***Orchis purpurea* (Huds., 1762)**	Orchis pourpre	Orchidées	LC	LC	LC			
***Ornithogalum umbellatum* (L., 1753)**	Dame-d'onze-heures	Asparagacées	LC	LC	?	X		
***Orobanche coryophyllacea* (Sm., 1798)**	Orobanche du gaillet	Orobanchacées	NT	LC	?	X		
***Parnassia palustris* (L., 1753)**	Parnassie des marais	Celastracées	NT	LC	LC	X		Art.1 P.
***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce, 1906**	Sceau-de-Salomon odorant	Asparagacées	LC	LC	LC	X		
***Potamogeton crispus* (L., 1753)**	Potamot crépu	Potamogétonacées	LC	LC	LC	X		
***Potamogeton natans* (L., 1753)**	Potamot nageant	Potamogétonacées	LC	LC	LC	X		
***Potentilla neglecta* (Baumg., 1816)**	Potentille négligée	Rosacées	LC	LC	?	X		
***Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768)**	Anémone pulsatille	Renonculacées	NT	LC	NT	X		
***Ranunculus peltatus* (Schrank, 1789)**	Renoncule peltée	Renonculacées	LC	LC	LC	X		
***Ribes nigrum* (L., 1753)**	Groseillier noir	Grossulariacées	LC	LC	LC	X		
***Rosa villosa* (L., 1753)**	Rosier pomnier	Rosacées	LC	LC	DD	X		
***Salix atrocinerea* (Brot., 1804)**	Saule gris cendré foncé	Salicacées	LC	LC	LC	X		
Sparganium emersum subsp. emersum (Rehmann, 1871)	Rubanier émergé	Typhacées	LC	LC	LC	X		
***Succisa pratensis* (Moench, 1794)**	Succise des prés	Caprifoliacées	LC	LC	?			
***Veronica scutellata* (L., 1753)**	Véronique à écus	Plantaginacées	LC	LC	LC	X		Art.1 P.

[1] Liste rouge de la flore vasculaire et des bryophytes des Hauts-de-France (2019)
[2] Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
[6] Liste des espèces végétales protégées en région Picardie : Article 1
[6] Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1

Tableau 52 - Avifaune d'intérêt patrimonial recensés dans le secteur « boutonnière du Bray » entre 2020 et 2025


Espèce		État de conservation régional [1]	État de conservation métropolitain [2]	État de conservation européen [3]	Espèce déterminante ZNIEFF Picardie [4]	Directive oiseaux [5]	Espèce réglementée [6]	Tendance des populations nicheuses métropolitaines [7]
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	EN	LC	LC	X		Art. 3 & 6	=
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	LC	LC	LC			Art. 3 & 6	?
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	Rousserole effarvatte	NT	LC	LC			Art. 3	=
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)	Alouette des champs	VU	NT	LC	X		Art. 3	↘
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	NA	LC	NT				↘
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	EN	VU	LC	X		Art. 3	↘
Apus apus (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC	NT	NT	X		Art. 3	?
Ardea alba (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗↘
Asio otus (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC	LC	LC			Art. 3	?
Athene noctua (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche	NT	LC	LC	X		Art. 3	=
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	EN	VU	VU	X		Art. 3	?
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	NT	VU	LC	X		Art. 3	=
Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	LC	NT	LC	X		Art. 3	=
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	EN	EN	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	VU	NT	LC	X	An. I	Art. 3	=
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)	Busard pâle	NA	NA	LC		An. I	Art. 4	NC
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	EN	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Columba oenas Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	LC	LC	LC	X		Art. 3	↗
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)	Rollier d'Europe	NA	NA	LC		An. I	Art. 3	?
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	VU	LC	NT			Art. 3	↘
Crex crex (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	CR	EN	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Cuculus canorus Linnaeus, 1758	Coucou gris	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC	LC	LC			Art. 3	↗
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	NT	VU	LC	X		Art. 3	↘
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Pic noir	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)	Bruant proyer	VU	LC	LC			Art. 3	↘
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)	Bruant zizi	EN	LC	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	EN	EN	LC	X		Art. 3	↘
Falco columbarius (Linnaeus, 1758)	Faucon émerillon	NA	NA	VU		An. I	Art. 3	NC
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	VU	?	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
Fulica atra (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	LC	LC	NT	X		Art. 3	=
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	CR	LC	LC	X		Art. 3	↘
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	CR	CR	VU	X		Art. 3	↘
Hippolais icterina (Vieillot, 1817)	Hypolaïs ictérine	EN	VU	LC	X		Art. 3	?
Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle de cheminée	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776)	Mouette pygmée	NA	NA	LC		An. I	Art. 3	NC
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	NT	NT	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
Locustella naevia (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	VU	NA	LC	X		Art. 3	↘
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	CR	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↘
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle	NT	LC	LC			Art. 3	↘
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	LC	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗

[1] Liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France (2024)
[2] Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)
[3] Liste rouge européenne des espèces menacées
Indice de conservation - LC : en préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger d'extinction CR : en danger critique d'extinction, DD : absence de données, NE : non évalué, NA : non applicable
[4] List of key species in the ZNIEFF inventory (INPN - https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-determinantes/region/22)
[5] Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I
[6] Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Articles 3 et 6
[7] Picardie Nature (2024)


***Milvus migrans* (Boddaert, 1783)**	Milan noir	VU	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)**	Milan royal	CR	VU	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)**	Bergeronnette des ruisseaux	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)**	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Motacilla flava flava* (Linnaeus, 1758)**	Bergeronnette printanière	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Muscicapa striata* (Pallas, 1764)**	Gobemouche gris	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)**	Traquet motteux	CR	NT	LC	X		Art. 3	=
***Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)**	Moineau domestique	VU	LC	LC			Art. 3	↘
***Passer montanus* (Linnaeus, 1758)**	Moineau friquet	CR	EN	LC	X		Art. 3	↘
***Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)**	Perdrix grise	VU	LC	LC				↘
***Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)**	Bondrée apivore	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	=
***Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)**	Grand Cormoran	LC	LC	LC	X		Art. 3	?
***Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)**	Rougequeue à front blanc	NT	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)**	Pouillot de Bonelli	EN	LC	LC	X		Art. 3	↗
***Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)**	Pouillot siffleur	EN	NT	LC	X		Art. 3	=
***Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)**	Pouillot fitis	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Picus viridis* (Linnaeus, 1758)**	Pic vert	LC	LC	LC			Art. 3	↘
***Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)**	Bouvreuil pivoine	VU	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)**	Hirondelle de rivage	VU	LC	LC			Art. 3	?
***Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)**	Tarier des prés	CR	VU	LC	X		Art. 3	↘
***Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)**	Tarier pâtre	NT	NT	LC	X		Art. 3	↘
***Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758)**	Sterne pierregarin	NT	LC	LC	X	An. I	Art. 3	↗
***Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)**	Tourterelle des bois	EN	VU	VU	X		Art. 3	↘
***Strix aluco* (Linnaeus, 1758)**	Chouette hulotte	LC	LC	LC			Art. 3	?
***Sylvia borin* (Boddaert, 1783)**	Fauvette des jardins	VU	NT	LC			Art. 3	↘
***Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)**	Fauvette babillarde	NT	LC	LC			Art. 3	↘
***Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)**	Grèbe castagneux	LC	LC	LC	X		Art. 3	↘
***Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)**	Grive litorne	RE	LC	LC	X		Art. 3	?
***Tyto alba* (Scopoli, 1769)**	Chouette effraie	NT	LC	LC			Art. 3	↘↗
***Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)**	Vanneau huppé	NT	NT	VU	X		Art. 3	?

Auneuil

Oiseaux



Auneuil (60390) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Grands échassiers

- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne noire *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)
- Aigrette garzette *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)

Gallinacés

- Perdrix rouge *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)
- Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Mouette mélanocéphale *Ichthyaetus melanocephalus* (Temminck, 1820)
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Auneuil (60390) - Oiseaux # 3







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Fauvette babillarde *Curruca curruca* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Philomèle rossignol *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Grive litorne *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)
- Cochevis huppé *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)

Auneuil (60390) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Asparagacées

- Sceau-de-Salomon odorant
  Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906

Campanulacées

- Campanule agglomérée
  Campanula glomerata (L., 1753)

Grossulariacées

- Groseillier noir
  Ribes nigrum (L., 1753)


Orchidées

- Orchis pyramidal
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
- Orchis de Fuchs
  Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962
- Orchis pourpre
  Orchis purpurea (Huds., 1762)

Plantaginacées

- Digitale pourpre
  Digitalis purpurea (L., 1753)

Auneuil (60390) - Amphibiens



Mammifères

Auneuil (60390) - Mammifères







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Chauves-souris

- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin de Daubenton *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- - Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817) - Murin de Brandt *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) - Murin d'Alcathoe *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Natterer *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Oreillard roux *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
- Grand Rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)
- Petit Rhinolophe *Rhinolophus hipposideros* (Borkhausen, 1797)


Micromammifères semi-aquatiques

- Crossope aquatique *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)


Auneuil (60390) - Reptiles et insectes



Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Auneuil (60390) - Habitats naturels et semi-naturels




Auteuil

Amphibiens et reptiles



Auteuil (60390) - Flore patrimoniale







Limites administratives et occupation du sol
- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport
- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Caprifoliacées
- Succise des prés
  Succisa pratensis (Moench, 1794)

Colchicacées
- Colchique d'automne
  Colchicum autumnale (L., 1753)

Cypéracées
- Laîche patte-de-lièvre
  Carex leporina (L., 1753) var. *leporina*
- Laîche à pilules
  Carex pilulifera (L., 1753) subsp. *pilulifera*

Fabacées
- Luzerne maculée
  Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Hypéricacées
- Millepertuis élégant
  Hypericum pulchrum (L., 1753)

Joncacées
- Jonc à fleurs obtuses
  Juncus subnodulosus (Schrank, 1789)

Orchidées
- Orchis pyramidal
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 var. *pyramidalis*
- Orchis bouc
  Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
- Orchis pourpre
  Orchis purpurea (Huds., 1762)

Plantaginacées
- Callitriche en hameçon
  Callitriche hamulata (Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837)

Poacées
- Canche flexueuse
  Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 subsp. *flexuosa*

Potamogetonacées
- Potamot crépu
  Potamogeton crispus (L., 1753)

Renonculacées
- Populage des marais
  Caltha palustris (L., 1753)
- Renoncule ficaire
  Ficaria verna (Huds., 1762)


Rubiacées
- Gaillet des marais
  Galium palustre (L., 1753)

Salicacées
- Saule gris cendré foncé
  Salix atrocinerea (Brot., 1804)

Typhacées
- Rubanier émergé
  Sparganium emersum (Rehmann, 1871) subsp.*emersum*

Auteuil (60390) - Insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Papillons

- Petite Violette
  Boloria dia (Linnaeus, 1767)
- Fluoré
  Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)
- Argus bleu-nacré
  Lysandra coridon (Poda, 1761)
- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
- Grande Tortue
  Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
- Hespérie du chiendent
  Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Auteuil (60390) - Mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris


- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin à oreilles échancrées
  Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Noctule de Leisler
  Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
- Noctule commune
  Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
- Oreillard roux
  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
- Oreillard gris
  Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)


Auteuil (60390) - Oiseaux # 1



Auteuil (60390) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Auteuil (60390) - Habitats naturels et semi-naturels




Aux Marais

Oiseaux



Aux Marais (60000) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Pics


- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Échassiers, oiseaux d'eau et autres oiseaux

- Perdrix rouge *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)
- Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (Linnaeus, 1758)
- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Canard chipeau *Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)
- Courlis cendré *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
- Canard souchet *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758)
- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)
- Upupa epops Linnaeus, 1758

Aux Marais (60000) - Oiseaux # 3









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux # 1

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)

Aux Marais (60000) - Oiseaux # 4







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Passereaux # 2

- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)

Aux Marais (60000) - Mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Barbastelle commune *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)
- Sérotine commune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
- Murin de Bechstein *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)
- Murin de Brandt *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)
- Murin d'Alcathoe *Myotis alcathoe* (Helversen & Heller, 2001)
- Murin de Natterer *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)
- Noctule commune *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl *Pipistrellus kuhlii* (Natterer in Kuhl, 1817)
- Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
- Oreillard roux *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
- Oreillard gris *Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829)
- Grand rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum* (Schreber, 1774)

Aux Marais (60000) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Aracées

- Gouet d'Italie
  Arum italicum (Mill., 1768)

Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes

- Struthioptéride en épi
  Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770

Orchidées

- Orchis maculé
  Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962

Plantaginacées


- Digitale pourpre
  Digitalis purpurea (L., 1753)

Renonculacées


- Ancolie commune
  Aquilegia vulgaris (L., 1753)

Amphibiens


Aux Marais (60000) - Amphibiens




Aux Marais (60000) - Reptiles et insectes




Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Amphibiens


Berneuil-en-Bray (60390) - Amphibiens
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Berneuil-en-Bray
Vaux
Mont Florentin
0
1
2 km
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Crapauds (2020 - 2025)
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation
Crapaud commun
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Grenouilles (2020 - 2025)
Grenouille verte
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
Grenouille rousse
Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation
Rainette verte
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Grenouille agile
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)
Tritons (2020 - 2025)
Triton palmé
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation
Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Triton crêté
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Berneuil-en-Bray (60390) - Chauve-souris





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)

Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)




Chauve-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Noctule commune
  Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
- Pipistrelle de Kuhl & Pipistrelle de Nathusius
  Pipistrellus kuhlii(Natterer in Kuhl, 1817) & *Pipistrellus nathusii*(Keyserling & Blasius, 1839)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)

Berneuil-en-Bray (60390) - Flore patrimoniale









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Orchidées

- Orchis pyramidal *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817 var. *pyramidalis*
- Ophrys mouche *Ophrys insectifera* (L., 1753)
- Orchis purpurea *Orchis purpurea* (Huds., 1762)

Poacées

- Canche flexueuse *Avenella flexuosa* (L.) Drejer, 1838 subsp. *flexuosa*

Lamiacées

- Épiaire officinal *Betonica officinalis* (L., 1753) subsp. *officinalis*

Cypéracées

- Laîche patte-de-lièvre *Carex leporina* (L., 1753) var. *leporina*
- Laîche à pilules *Carex pilulifera* (L., 1753) subsp. *pilulifera*

Colchicacées

- Colchique d'automne *Colchicum autumnale* (L., 1753)

Euphorbiacées

- Euphorbe douce *Euphorbia dulcis* (Ces.) Nyman, 1890 subsp. *incompta*

Gentianacées

- Gentiane d'Allemagne *Gentianella germanica* (Willd.) Börner, 1912

Crassulacées

- Hylotelephium gr. telephium

Hypéricacées

- Millepertuis élégant *Hypericum pulchrum* (L., 1753)

Juncacées

- Jonc à fleurs aiguës *Juncus acutiflorus* (Ehrh. ex Hoffm., 1791)
- Jonc à fleurs obtuses *Juncus subnodulosus* (Schrank, 1789)

Lythracées

- Salicaire pourpier *Lythrum portula* (L.) D.A.Webb, 1967

Célastracées

- Parnassie des marais *Parnassia palustris* (L., 1753)

Rosacées


- Potentille négligée *Potentilla neglecta* (Baumg., 1816)
- Rosier velu *Rosa villosa* (L., 1753)

Renonculacées


flore-berneuil

- Anémone pulsatille *Pulsatilla vulgaris* (Mill., 1768)
- Renoncule peltée *Ranunculus peltatus* (Schrank, 1789)

Berneuil-en-Bray (60390) - Oiseaux # 1



Berneuil-en-Bray (60390) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux


- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant zizi *Emberiza cirlus* (Linnaeus, 1766)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
- Hypolais ictérine *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)
- Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)

Oiseaux d'eau

- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

Berneuil-en-Bray (60390) - Papillons, zygènes, criquets, libellules et demoiselles





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

- Grande Tortue
  Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Papillons

- Collier-de-corail
  Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
- Petite Violette
  Boloria dia (Linnaeus, 1767)
- Fluoré
  Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)
- Point de Hongrie
  Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
- Lucine
  Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
- Argus bleu-nacré
  Lysandra coridon (Poda, 1761)
- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Zygènes

- Zygène de la Filipendule
  Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)


Libellules et demoiselles


- Caloptéryx vierge
  Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
- Agrion mignon
  Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
- Leste sauvage
  Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

Criquets

- Criquet marginé
  Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)

Berneuil-en-Bray (60390) - Serpents et lézards





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Serpents

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

- Coronelle lisse
  Coronella austriaca (Laurenti, 1768)


Lézards


- Orvet fragile
  Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

- Lézard des murailles
  Podarcis muralis (Laurenti, 1768)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Berneuil-en-Bray (60390) - Habitats naturels et semi-naturels
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
le Pâtis
Vaux
le Trésor
Mont Florentin
le Muid
les Foicelles
0
1
2 km
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Berneuil-en-Bray
Limites administratives
Limite communale
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres trypes de routes
Habitats naturels et semi-naturels
Habitat aquatique sur substrat acide
Habitat aquatique sur substrat basique
Habitat cultivé
Habitat forestier sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat forestier sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Habitat minéral sur substrat acide
Habitat minéral sur substrat basique
Habitat ouvert sur substrat acide et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat acide et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et humide du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et mésique du domaine tempéré
Habitat ouvert sur substrat basique et sec du domaine tempéré
Zones bâties
FONDS VERT !

Frocourt

Amphibiens



Frocourt (60000) - Mammifères







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)

Frocourt (60000) - Mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes


Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Sérotine commune
  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Pipistrelle commune
  Pipistrellus pipistrellus(Schreber, 1774)

Frocourt (60000) - Reptiles et insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Reptiles

Serpents

- Couleuvre à collier *Natrix helvetica* (Lacepède, 1789)

Lézards

- Lézard des murailles *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)
- Lézard vivipare *Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823)

Insectes

Libellules

- Cordulégastre annelé *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)


Demoiselles

- Caloptéryx vierge *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758)

Papillons

- Demi-Deuil *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
- Thècla du prunier *Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758)

Frocourt (60000) - Oiseaux # 1





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Épervier d'Europe
  Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
- Busard Saint-Martin
  Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
- Milan noir
  Milvus migrans (Boddaert, 1783)


Rapaces nocturnes

- Chouette chevêche
  Athene noctua (Scopoli, 1769)
- Chouette hulotte
  Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux

- Caille des blés
  Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
- Coucou
  Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise
  Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Frocourt (60000) - Oiseaux # 2





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Frocourt (60000) - Habitats naturels et semi-naturels




Goincourt

Oiseaux



Goincourt (60000) - Oiseaux # 2









Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Échassiers

- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
- Aigrette garzette *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)

Autres oiseaux d'eau

- Fuligule milouin *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
- Râle des genêts *Crex crex* (Linnaeus, 1758)
- Foulque macroule *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
- Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

Pics


- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic mar *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Trouterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)
- Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Goincourt (60000) - Oiseaux # 3











Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux

- Rousserolle effarvatte — *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- Alouette des champs — *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse — *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant — *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe — *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre — *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer — *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune — *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des roseaux — *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée — *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur — *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse — *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Locustelle tachetée — *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
- Alouette lulu — *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle — *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette des ruisseaux — *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)
- Bergeronnette printanière — *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Gobemouche gris — *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
- Moineau domestique — *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc — *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Pouillot fitis — *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine — *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre — *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)
- Fauvette des jardins — *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
- Fauvette babillarde — *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
- Grive litorne — *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Goincourt (60000) - Mammifères



Goincourt (60000) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Asparagacées

- Ornithogale en ombelle
  Ornithogalum umbellatum (L., 1753)
- Sceau-de-Salomon odorant
  Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906

Campanulacées

- Campanule agglomérée
  Campanula glomerata (L., 1753)

Iridacées

- Iris fétide
  Iris foetidissima (L., 1753)

Orchidées

- Orchis bouc
  Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826

Goincourt (60000) - Amphibiens, reptiles et insectes





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Amphibiens

Crapauds

- Alyte accoucheur
  Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Tritons

- Triton alpestre
  Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
- Triton crêté
  Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Reptiles

Serpents

- Couleuvre à collier
  Natrix helvetica (Lacepède, 1789)
- Vipère péliade
  Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Lézards

- Lézard vivipare
  Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Insectes

Papillons

- Grand Mars changeant
  Apatura iris (Linnaeus, 1758)
- Argus bleu roi
  Polyommatus thersites (Cantener, 1835)


Demoiselles

- Calopteryx vierge
  Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)


Coléoptères

- Petit Capricorne
  Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales



Goincourt (60000) - Habitats naturels et semi-naturels



Amphibiens


Saint-Léger-en-Bray (60155) - Amphibiens
Atlas de la Biodiversité du Beauvaisis
HAUTS-DE-FRANCE
OISE
Communauté d'agglomération du Beauvaisis
Saint-Léger-en-Bray
le Hédin
le Pré de la Forêt
100
0
1
2 km
Limites administratives et occupation du sol
Limites communales
Zone boisée, forêt fermée
Hydrographie surfacique
Espaces agricoles
Zone bâtie
Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
Chemins et sentiers
Infrastructures de transport
Routes principales
Routes régionales
Autres types de routes
Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)
Grenouilles et crapauds
Amphi-STLEGER
Crapaud commun
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Grenouilles
Rainette verte
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Grenouille de Lessona
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
Grenouille rieuse
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Grenouille agile
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)
Grenouille rousse
Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
Tritons
Tritons
Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris alpestris (Laurenti, 1768)
Triton palmé
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Triton crêté
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Saint-Léger-en-Bray (60155) - Reptiles, insectes et mammifères







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Insectes

Demoiselles

- Calopteryx vierge
  Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
- Agrion de Mercure
  Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Papillons

- Demi-Deuil
  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
- Grande Tortue
  Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Mammifères

Mustélidés

- Martre
  Martes martes (Linnaeus, 1758)

Reptiles

Lézards

- Lézard des murailles
  Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
- Lézard vivipare
  Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Saint-Léger-en-Bray (60155) - Oiseaux # 1





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Rapaces diurnes

- Autour des palombes *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
- Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
- Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771)

Rapaces nocturnes

- Chouette chevêche *Athene noctua* (Scopoli, 1769)
- Chouette hulotte *Strix aluco* (Linnaeus, 1758)
- Chouette effraie *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

Échassiers

- Grande Aigrette *Ardea alba* (Linnaeus, 1758)
- Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)

Pics

- Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- Pic épeichette *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)
- Pic vert *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

Autres oiseaux

- Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- Coucou *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)
- Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)
- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)

Saint-Léger-en-Bray (60155) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Moineau friquet *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)

Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels




Saint-Martin-le-Nœud

Amphibiens



Saint-Martin-le-Nœud (60000) - Mammifères





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Chauves-souris

- Murin de Bechstein
  Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
- Murin de Daubenton
  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
- Murin à oreilles échancrées
  Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
- Grand Murin
  Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
- Murin à moustaches
  Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
  Murin d'Alcathoe
  Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)
  Murin de Brandt
  Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
- Murin de Natterer
  Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
- Grand rhinolophe
  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
- Grand rhinolophe
  Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum (Schreber, 1774)

Saint-Martin-le-Nœud (60000) - Flore patrimoniale





Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie
- Courbes de niveau (isoplèthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport

- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces et sous-espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)

Aracées

- Gouet d'Italie
  Arum italicum (Mill., 1768)

Cypéracées

- Laîche aiguë
  Carex acuta (L., 1753)
- Carex pâle
  Carex pallescens (L., 1753)

Fougères, prêles, lycopodes et autres ptéridophytes

- Struthioptéride en épi
  Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770

Hypéricacées

- Millepertuis élégant
  Hypericum pulchrum (L., 1753)

Joncacées

- Luzule ramassée
  Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811

Orchidées

- Orchis bouc
  Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826


Orobanchacées

- Orobanche du gaillet
  Orobanche caryophyllacea (Sm., 1798)


Poacées

- Canche flexueuse
  Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838
  subsp. *flexuosa*

Saint-Martin-le-Nœud (60000) - Oiseaux # 1



Saint-Martin-le-Nœud (60000) - Oiseaux # 2







Limites administratives et occupation du sol

- Limites communales
- Zone boisée, forêt fermée
- Hydrographie surfacique
- Espaces agricoles
- Zone bâtie

- Courbes de niveau (isopléthe d'altitude)
- Chemins et sentiers

Infrastructures de transport


- Routes principales
- Routes régionales
- Autres types de routes

Espèces patrimoniales ou à enjeux de conservation (2020 - 2025)


Passereaux

- Alouette des champs *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)
- Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
- Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linnaeus, 1758)
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)
- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)
- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)
- Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)


Richesse spécifique de la faune et de la flore patrimoniales




Habitats naturels et semi-naturels



Richesse spécifique de la boutonnière du Bray



Zonages réglementaires et autres sites d'intérêt écologique de la boutonnière du Bray



Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) par M. Stéphane Peineau

